

42184/B/11

PRIESTLEY.

J

1st Set vol II

Prelims wanting



42559

EXPÉRIENCES

ET OBSERVATIONS

SUR DIFFÉRENTES ESPECES

D'AIR.

TOME SECOND.

THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

AND OF THE MEDICAL PROFESSION

IN GREAT BRITAIN





EXPÉRIENCES

E T

OBSERVATIONS

SUR DIFFÉRENTES ESPECES

D' A I R.

TROISIEME PARTIE.

SECTION PREMIERE.

De l'air acide vitriolique.

DÈS le moment où j'eus obtenu l'*acide marin* sous la forme d'air , il me vint en idée qu'il seroit possible de présenter aussi les autres acides sous cette forme curieuse ; c'est-à-dire, dépouillés de l'eau avec laquelle ils avoient toujours

A

été combinés , & qui étoit nécessairement un grand obstacle à la découverte de leur nature & de leurs affinités réelles. Mais outre que je n'étois pas Chymiste par état , je demeurois à la campagne où je n'avois commerce avec aucune personne de cette profession , & je n'étois pas même assez en état d'expliquer ce qui me manquoit. Ces raisons interrompirent plusieurs fois mes recherches sur ce sujet.

Le premier plan que je formai , fut de tâcher de réduire l'acide *vitriolique* sous la forme d'air , m'imaginant qu'il seroit sans doute aisé de le renfermer par le moyen du mercure *. J'écrivis en conséquence à mon ami M. Lane , de me procurer une quantité d'*acide vitriolique volatil* , qui est l'acide vitriolique ordinaire combiné avec le phlogistique ; mais il ne comprit pas bien ma demande , & m'envoya toute autre

* Quant à l'acide nitreux , son affinité avec le mercure est si grande , que je désespérai de parvenir à le renfermer en aucune maniere , ainsi que je l'ai observé dans mon premier Volume , page 354.

chose que ce que j'attendois. Ceci se passa dans le tems où j'étois occupé à suivre mes premières expériences.

L'hiver suivant, je vis M. Lane, qui me dit que si je faisois seulement chauffer quelque matière huileuse ou graisseuse avec de l'huile de vitriol, j'en ferois certainement ce que je demandois : savoir, l'*acide vitriolique volatil* ou *sulphureux*. Je me proposois de suivre cet avis ; mais plusieurs autres engagements me détournèrent de cette poursuite, jusqu'à ce que j'eusse publié mon dernier Traité.

Quelque tems après, je me trouvai en France, avec le Lord Shelburne, chez M. Trudaine, à Montigny, où la magnificence éclairée qui distingue cet illustre Académicien, a rassemblé toutes les machines de physique, toutes les commodités & tous les secours nécessaires pour les expériences & les recherches auxquelles les hôtes nombreux que sa bienveillance y attire, peuvent avoir envie de se livrer. Je rencontrai dans cette agréable retraite, ce Physicien & Chymiste distingué, M. de Montigny, Membre de l'Académie Royale des

4 TROISIEME PARTIE.

Sciences. Je conversai avec lui sur le sujet en question , & il me proposa d'essayer de réduire l'huile de vitriol en vapeurs , en la faisant bouillir sur les charbons dans une phiole fêlée. L'événement n'ayant pas répondu à notre attente , il proposa de la chauffer avec de l'huile de térébenthine. Nous opérâmes en conséquence , & nous produisîmes bientôt une certaine quantité d'une espece d'air renfermée par le mercure. Mais notre récipient ayant été renversé par la promptitude avec laquelle l'air s'éleva , nous n'en pûmes recueillir que le premier produit. Ce n'étoit presque autre chose que l'air commun qui s'étoit trouvé sur la surface de la liqueur , & qui étoit un peu phlogistique , car il ne fut pas beaucoup affecté par un mélange d'air nitreux.

Je n'eus pas occasion de répéter alors cette expérience , & je la perdus de vue jusqu'à mon retour en Angleterre , où je repris cette opération le 26 Novembre 1774. Je commençai avec de l'huile d'olives : & à l'aide d'une sorte de vaisseaux de verre plus commodes (représentés par la fig. a) que je m'étois procurés

SECTION I.

J

pour cette expérience & pour d'autres analogues, je trouvai très-peu de difficulté à poursuivre mes recherches.

Comme je desirer que mon Lecteur puisse profiter de l'expérience que j'ai acquise, je dois l'avertir, s'il est bien aise de répéter mes procédés, de ne pas mettre trop d'huile ou d'autre substance semblable sur l'huile de vitriol, lorsqu'il voudra produire l'air dont il s'agit. Je commençai par employer environ un cinquième d'huile d'olives, ayant laissé dans la phiole un espace que je crus suffisant pour l'effervescence qui pourroit être occasionnée par la production de l'air; mais aussi-tôt que le vaisseau fut échauffé à un certain degré, la production de l'air fut excessivement rapide, & j'eus beau retirer la chandelle que j'y avois appliquée pour l'échauffer, l'effervescence continua d'augmenter au point que la capacité du tube n'étant pas suffisante pour donner passage à tout l'air produit, le bouchon de la phiole sauta, & tout ce qu'elle contenoit fut enlevé par l'explosion.

Après cela, je ne mis dans la phiole qu'une légère couche d'huile d'olives sur

6 TROISIEME PARTIE.

l'esprit de vitriol, & les phénomènes furent les mêmes que dans l'expérience précédente : avec cette différence, que le procédé fut plus maniable ; car en appliquant ou retirant la chandelle, selon qu'il en étoit besoin, j'obtins la quantité d'air que je voulus ; & changeant pendant l'effervescence la phiole d'un vaisseau à un autre, j'en remplis plusieurs de cette nouvelle espece d'air aussi facilement que j'avois coutume de faire avec l'air acide marin ; & tout le procédé étoit aussi agréable & aussi curieux. En effet, cette maniere de tirer de l'air de substances contenues dans de petites phioles, & de recevoir le produit dans le mercure, lorsqu'il est de nature à ne pouvoir pas être renfermé par l'eau, n'a jamais manqué de frapper toutes les personnes à qui je l'ai montrée.

Au moment où je vis que l'acide vitriolique prenoit la forme d'air par l'addition du phlogistique, je conclus que l'acide marin ne doit sa faculté de paroître sous la même forme, qu'au phlogistique qu'il contient naturellement & qui en est inséparable. Je regardai de

plus comme probable qu'une certaine portion de phlogistique est nécessaire à la volatilité & à l'élasticité de toutes les substances quelles qu'elles soient; en sorte que l'air acide marin peut bien n'être pas ce que je croyois auparavant : sçavoir , le *pur acide marin sous la forme d'air*; & quoique par ce moyen on le présente dégagé de l'eau qui à plusieurs égards modifie & restraint son action sur différentes substances , il peut néanmoins être encore combiné avec une portion de phlogistique. Mais puisque tous les corps que nous connoissons sont élastiques à quelque degré, sont du moins capables d'être condensés par le froid & dilatés par la chaleur , il n'est peut-être pas possible de séparer entièrement ce principe d'aucune substance dans la nature; & par conséquent, on peut dire encore, dans un sens assez vrai, que l'air acide marin n'est rien de plus que l'acide marin; le phlogistique qu'il contient étant si peu de chose, qu'on ne sauroit le découvrir par aucun des moyens qui servent d'ordinaire à manifester sa présence.

Avant qu'il s'élève de l'air du mélan-

ge d'une matiere inflammable avec l'huile de vitriol , tout le mélange devient d'une couleur très-noire , & une quantité de cet acide ainsi impregné de phlogistique fournit plusieurs fois plus d'air qu'une égale quantité de l'esprit de sel le plus fort. Mais je n'ai jamais mesuré cette différence avec quelque exactitude.

Lorsque l'air acide vitriolique est produit en grande abondance , le sommet de la phiole dans laquelle sont les matériaux se remplit ordinairement d'une vapeur blanche. Cet air présente aussi la même apparence à mesure qu'il passe par le tube de verre , & il la conserve quelquefois jusques dans le récipient.

L'air acide vitriolique est aussi transparent que l'air acide marin , & paroît n'avoir pas plus d'affinité que lui avec le mercure ; car lorsqu'il est renfermé par ce métal , ses dimensions ne sont sujettes à aucune autre variation que celles que le froid & le chaud y occasionnent , & qui sont les mêmes que si c'étoit de l'air commun , pourvu qu'il n'y ait point d'humidité dans le récipient ni dans le mercure. La ressemblance est si grande

entre ces deux airs acides qu'il étoit naturel que dans la conduite des expériences sur l'air acide vitriolique, j'eusse en vue celles que j'avois faites sur l'air acide marin; & c'est ce dont le Lecteur s'apercevra facilement.

L'eau que j'admis dans l'air acide vitriolique l'abforba à peu-près aussi promptement qu'elle absorbe l'air acide marin, & par cette union elle doit avoir formé l'acide vitriolique volatil ou sulfureux. A la vérité, le résultat de cette combinaison étoit si simple à concevoir, que je ne crus pas nécessaire de m'en assurer par l'expérience.

Ainsi que l'air acide marin, cet air acide vitriolique éteint une chandelle; mais sans que la flamme, à mesure qu'elle s'éteint ou lorsqu'on la rallume, présente dans sa couleur aucun phénomène particulier pareil à celui qu'on observe lorsqu'on fait la même expérience dans l'air acide marin. L'air acide vitriolique est aussi plus pèsant que l'air commun; car une chandelle plongée plusieurs fois de suite dans un vaisseau rempli de cet air, s'y éteignit toujours, & même après que le vaisseau fut resté

une heure entiere ouvert à l'air libre.

La glace se fond à l'instant dans cet air aussi-bien que dans l'air acide marin, & l'eau qui en est imprégnée continue à fondre de nouvelle glace. C'est à cette occasion que j'observai qu'on peut exposer cet air acide au froid, sans qu'il effuie plus de diminution dans son volume que l'air commun n'en éprouve dans les mêmes circonstances. Ce qui me paroît un *criterium* suffisant pour distinguer l'air de la *vapeur*. A un certain degré de chaleur on peut, à la vérité, présenter l'eau même sous forme d'air; mais ce degré de chaleur surpasse de beaucoup la chaleur ordinaire de notre atmosphère. Dans bien des cas, il est des termes qu'on applique très-utilement pour distinguer des corps, qui, examinés sévèrement, se trouveroient rentrer les uns dans les autres, la différence qui est entr'eux se trouvant dans le *dégré* plutôt que dans le *genre*. Mais une *très-grande différence* dans le degré, suffit pour autoriser une différence dans la dénomination.

J'avois trouvé si frappans les phénomènes qui accompagnent le mélange de

l'air alkalin avec l'air acide marin, que je ne fus pas long-tems en possession de l'air acide vitriolique, sans essayer si le même mélange de cette espece d'air acide avec l'air alkalin ne produiroit pas les mêmes phénomènes; & l'événement répondit pleinement à mes espérances. Un beau nuage blanc se forma de même au moment où ces deux especes d'air vinrent en contact; la quantité d'air diminua à mesure que j'introduisis l'air alkalin, & le mercure s'éleva presque au sommet du vaisseau.

J'observai aussi que lorsque je mis l'air alkalin dans l'air acide vitriolique, le nuage blanc s'éleva immédiatement au sommet du vaisseau, comme dans l'expérience faite avec l'air acide marin; ce qui prouve que l'air alkalin est dans l'un & l'autre cas, le plus léger des deux airs. Dans les deux cas aussi, lorsque l'air alkalin a été produit le premier, l'air acide qu'on y admet ensuite forme un nuage qui s'arrête sur le mercure, ne s'étend jamais au-delà d'un très-petit espace, & ne s'élève qu'à mesure que le mercure s'élève. La substance qui se forme par l'union de l'air alkalin avec

l'air acide vitriolique doit être nécessairement le *sel ammoniac vitriolique* ; mais je n'ai point fait d'expériences pour m'en assurer. Ce sel, qui dans ces procédés tapisse mes récipients, est promptement dissous par l'eau, comme dans les expériences que j'avois faites avec l'air acide marin. Il n'en est cependant pas de même, comme on le verra plus bas, du sel qui est formé par la combinaison d'une autre espèce d'air acide avec l'air alkalin.

Le mélange des autres espèces d'air avec l'air acide vitriolique ne produisit aucun phénomène remarquable. Cependant ayant mis une quantité de cet air acide dans une quantité d'air commun, pour observer si le premier ne communiqueroit pas à l'autre une partie de son phlogistique, je n'appercus à la vérité aucune diminution immédiate dans le volume de l'air, comme celle qui arrive lorsqu'on mêle de l'air nitreux avec l'air commun ; mais après qu'ils furent restés ensemble pendant deux jours, & que l'eau introduite dans le mélange eut absorbé l'air acide, l'air commun qui resta parut, à l'épreuve de l'air nitreux.

SECTION I.

avoir souffert une dépravation considérable. L'air acide vitriolique doit donc avoir communiqué dans ce cas une partie de son phlogistique à l'air commun : effet que ne produit point l'air acide marin lorsqu'on le mêle de même avec l'air commun. Je ne sçais pas quelle altération l'air acide vitriolique auroit pu produire dans les autres especes d'air, s'il y étoit resté pendant plus long-tems.

Je laissai pendant quelques heures une quantité de cet air acide mêlée avec de l'air inflammable ; mais lorsque j'y eus introduit de l'eau , je ne m'apperçus pas que la quantité de l'air inflammable fut altérée ; ni qu'il eût perdu la moindre partie de son inflammabilité.

Je mis une fois d'égales quantités d'air acide marin & d'air acide vitriolique dans le même récipient , & j'observai qu'ils se mêlerent sans présenter aucun phénomène sensible ; & lorsque j'y ajoutai de l'air alcalin , le phénomène fut le même que si j'eusse introduit cet air dans un seul des deux premiers ; car le nuage blanc s'éleva à l'instant au sommet du vaisseau. Si j'eusse

examiné, après cette expérience, les *sels* qui adhéroient aux différentes parties de l'intérieur du vaisseau, peut-être aurois-je découvert lequel des deux airs acides est spécifiquement plus pesant que l'autre; mais je soupçonne qu'ils étoient intimement mêlés, & que par conséquent le sel étoit une composition uniforme, tenant le milieu entre le sel ammoniac ordinaire & le sel ammoniac vitriolique.

Ce que j'ai trouvé très-extraordinaire, c'est que l'acide marin qui est réputé le plus foible des trois acides minéraux soit capable, lorsqu'il est sous forme d'air, de déloger & l'acide vitriolique & l'acide nitreux de plusieurs de leurs bases; & que d'un autre côté, l'acide vitriolique qu'on regarde comme le plus fort des trois, présenté avec autant d'avantage en apparence, c'est-à-dire, débarrassé de l'eau avec laquelle il est ordinairement combiné, n'ait pu dans aucune des épreuves que j'en ai faites, déloger aucun des autres acides d'aucune des bases auxquelles ils étoient unis. J'introduisis dans cet air le *nitre*, le *sel*

commun & le *sel ammoniac* ; ils ne l'affecterent ni n'en furent aucunement affectés.

L'*éther vitriolique* absorba l'air acide vitriolique aussi promptement que l'eau peut l'absorber. Cependant l'éther en fut bientôt saturé , & parut ensuite absolument aussi transparent & aussi inflammable qu'auparavant.

Un morceau de *phosphore* resta un jour & deux nuits dans l'air acide vitriolique sans l'affecter d'une manière sensible. Il ne donna point de lumière dans cet air ; mais sa surface supérieure devint noire , & la surface du mercure sur lequel il étoit posé se couvrit d'une espèce d'écume d'un jaune foncé ou noirâtre , comme s'il eût été dissous en partie par l'acide.

Le *fer* est promptement dissous dans l'air acide marin ; mais il n'est point du tout affecté par l'air acide vitriolique , quoique cet acide combiné avec l'eau soit un menstrue si puissant pour ce métal. Mais ce qui rend ce fait moins extraordinaire , c'est que ce même acide lorsqu'il est fortement concentré n'a point d'action sur le fer. Je tins un

nombre de cloux de fer dans l'air acide vitriolique pendant deux jours ; & ni l'air ni les cloux ne furent sensiblement affectés. Ceux-ci ne présentoient aucune apparence de corrosion.

Un morceau de *foie de soufre* absorba totalement dans trois jours une quantité de cette espece d'air, sans éprouver d'altération sensible dans sa couleur ni dans son apparence extérieure.

Le *charbon*, qui dans l'air acide marin forme de l'air inflammable , lorsqu'on l'expose à l'air acide vitriolique l'absorbe tout simplement ; mais avec assez de rapidité , & il acquiert par-là une odeur piquante sans produire aucun autre effet dont j'aie pu m'appercevoir. Je fis absorber à plusieurs morceaux de charbon autant de cet air acide qu'ils purent en prendre ; mais après cela de nouveaux morceaux absorberent le restant ; en sorte que l'air n'avoit été que condensé , pour ainsi dire , sur la surface du charbon. J'ai observé en général le même effet avec l'air alkalin ; je l'ai observé aussi dans quelques expériences avec d'autres especes d'air qui ne peuvent être renfermées que par

le mercure, & j'avoue que je ne le conçois pas avec assez de clarté. Le charbon que j'employai dans cette expérience avoit été très-bien séché, sans quoi on auroit pu soupçonner que l'humidité adhérente au charbon avoit absorbé l'air.

L'air acide vitriolique dissout le *camphre* assez promptement, & le réduit en une liqueur transparente. Lorsqu'on y introduit de l'eau, le camphre reprend sa forme solide naturelle; mais je trouve qu'il acquiert un goût acide.

J'ai fait mention d'un effet très-remarquable de l'air alkalin sur l'alun, qu'il rend blanc & opaque comme l'alun calciné; mais sans en altérer la figure. Tel est en apparence l'effet de l'air acide vitriolique sur le *borax*. Cette substance absorba une assez grande quantité de cet air dans deux jours. Ce qui resta de l'air éteignit une chandelle; mais cet effet provenoit sans doute d'une petite portion d'air fixe qui avoit été produite en même-tems que l'air acide vitriolique. Je répétai cette expérience, & je laissai le procédé dans le même état

pendant trois jours , après lesquels l'effet fut précisément le même qu'auparavant ; le borax conservoit sa forme extérieure ; mais il étoit devenu blanc & opaque ; l'air acide s'étoit sans doute saisi de l'eau qui entre dans sa composition , comme je conjecture que cela arrive à l'égard de l'air alkalin & de l'alun.

On sait que l'acide vitriolique ordinaire est changé en acide vitriolique volatil ou sulphureux par la vapeur du charbon , si le vaisseau dans lequel on le met au feu a quelque fêlure par laquelle la vapeur trouve accès auprès de l'acide. J'eus la curiosité d'essayer si je n'observois pas le même effet en mettant le charbon à chauffer dans l'acide. Je mis en conséquence quelques morceaux de *charbon* dans ma phiole , au lieu de l'huile ou des autres matieres inflammables dont je me servois auparavant ; & y ayant appliqué la flamme d'une chandelle , je trouvai sur le champ que l'air acide vitriolique étoit produit tout aussi-bien que dans le premier procédé , & plus commodément à bien des égards , la pro-

duction de l'air étant plus uniforme ; ce qui obvie au défagréable effet d'une explosion subite.

Il est cependant nécessaire que le charbon ait été très-bien brûlé, de manière qu'il ait perdu tout son air ; sans quoi il y aura un mélange d'air fixe ou d'air inflammable avec l'air acide, sur-tout lorsqu'on appliquera un degré de chaleur considérable pour produire l'air. M'étant souvent servi du charbon pour me procurer de l'air acide vitriolique, à cause de la facilité & de l'uniformité du procédé, j'ai observé plusieurs fois qu'il y avoit un résidu considérable après que cet air avoit été exposé à l'eau, & je trouvai une fois que le résidu troubloit l'eau de chaux : ce qui est un signe certain qu'il contenoit de l'air fixe.

J'essayai de me procurer l'air acide vitriolique par le même procédé, en employant de l'éther au lieu de charbon : environ la moitié du produit fut de l'air permanent & inflammable. L'huile de vitriol devint parfaitement noire dans ce procédé, comme lorsqu'on la fait chauffer avec d'autres matières inflammables. Une autre fois ayant chauffé le

même mélange d'huile de vitriol & d'éther, il n'y eut qu'un quart du produit qui fût inflammable; & si j'eusse continué de me servir du même mélange, le produit auroit probablement été toujours moins inflammable & plus purement acide à chaque expérience.

Ayant observé qu'un grand nombre de substances différentes contenant du phlogistique rendoient l'huile de vitriol capable de fournir un air acide permanent, je soupçonnai que la *chaleur* seule pourroit en faire autant; mais je ne trouvai point que mon soupçon fût fondé. A la vérité, lorsque sans rien mettre avec l'huile de vitriol je la faisois seulement chauffer dans une phiole bouchée avec du *liège*, il y avoit de l'air produit assez promptement; mais le bouchon étoit corrodé, & l'huile de vitriol devenoit aussi noire que si l'on y avoit plongé le bouchon: enforte que c'étoit évidemment de lui qu'étoit venu le phlogistique; cependant il devoit s'être élevé quelque vapeur acide, sans quoi le bouchon n'auroit pas pu être affecté.

Mais lorsque par le moyen de M. Parker, j'eus en ma possession des phioles

de verre avec leurs bouchons de crystal percés & prolongés en forme de tubes , tels qu'ils sont représentés fig. c , je trouvai que l'huile de vitriol que je mis chauffer dedans ne produisoit point d'air quelconque , quoique je fisse éprouver pendant long-tems à une petite phiole autant de chaleur qu'il m'étoit possible , en la tenant entourée de tous côtés par la flamme de deux grands flambeaux. Je ne pus la faire bouillir tout-à-fait par cette chaleur ; mais il en sortoit une vapeur blanche qui circuloit dans le haut du vaisseau , s'élevant à un endroit & se condensant à un autre.

Quoique je n'aie point obtenu d'air de l'huile de vitriol par ce procédé , il y en eut de produit dans le même-tems , d'une maniere à laquelle je m'attendois peu , & qui me fit payer un peu cher la découverte qu'elle occasionna. Désespérant d'obtenir de l'air par une plus longue application des flambeaux , je les retirai ; mais avant que j'eusse dégagé la phiole du vaisseau qui contenoit le mercure , il passa un peu de ce métal par le tube dans l'acide échauffé. A l'instant tout le vaisseau fut rempli d'une vapeur

blanche épaisse ; il y eut une prodigieuse quantité d'air produit qui brisa le tube en mille pieces , (je suppose que la chaleur subite qui s'excita produisit cet effet) & une partie de l'acide échauffé s'étant répandue sur ma main me brûla si terriblement que j'en porte encore les marques. L'intérieur de la phiole fut incrusté d'une substance saline blanchâtre , & il en sortit une odeur extrêmement suffocante.

Cet accident m'apprit ce qu'il est surprenant que je n'eusse pas soupçonné auparavant : sçavoir , que quelques *métaux* communiquent leur phlogistique à l'huile de vitriol échauffée , la convertissent par ce moyen en un air élastique permanent , & produisent ainsi le même effet que l'huile , le charbon , ou toute autre substance inflammable.

Bien loin d'être découragé par l'aventure désagréable dont je viens de parler , je mis le jour suivant un peu de *mercure* avec l'huile de vitriol dans la phiole à bouchon de crystal tubulé ; & long-tems avant qu'elle fût échauffée au point de bouillir , il en sortit de l'air en abondance , lequel étant reçu dans un

vaisseau rempli de mercure , parut être de véritable air acide vitriolique exactement semblable à celui que j'avois obtenu auparavant , capable d'être promptement absorbé par l'eau & d'éteindre une chandelle , de la même manière que l'autre l'avoit fait. Il se forma un sel blanc. Mais ce qui me parut assez remarquable , c'est que l'huile de vitriol , qui dans toutes les expériences précédentes devenoit noire avant de commencer à fournir de l'air , demeura sans couleur & transparente pendant tout ce procédé.

Je répétai ensuite cette expérience avec plusieurs autres métaux ; mais il y eut une variété considérable dans les résultats.

Je mis des morceaux de *fil de fer* dans l'huile de vitriol : il y eut une très-petite quantité d'air produite sans chaleur ; mais cet effet ayant bientôt cessé , j'appliquai la chandelle , & à un degré de chaleur qui me parut au-dessus de celui auquel le mercure dans les mêmes circonstances avoit produit de l'air , il y en eut de produit en grande abondance. Lorsque j'en eus recueilli environ trois

mesures, j'y admis de l'eau, & elle en absorba sur le champ les quatre cinquiemes ou environ. Le restant étoit inflammable & présentoit une flamme très-rouge.

Si l'huile de vitriol eût été plus concentrée, ou si j'eusse continué le procédé plus long-tems, la proportion de l'air acide à l'air inflammable auroit été plus grande. L'huile de vitriol, dans cette expérience, devint très-opaque & prit une couleur grise foncée. Le fer qui avoit été soumis à ce procédé, & que j'avois mis de côté sans aucune vue, fut couvert en peu de jours d'une croûte blanchâtre; & après que je l'en eus dépouillé, il se couvrit encore de la même matiere. Cette croûte est très-différente de la rouille du fer dans d'autres circonstances.

Environ un tiers du produit d'air que donna le zinc étoit acide; le reste étoit inflammable. Il étoit évident que l'acide vitriolique agissoit fortement sur le zinc avant l'application de la chandelle, car l'air s'en élevoit continuellement en petites bulles. L'huile de vitriol que j'avois employée dans ce procédé, déposa, après un long espace de tems, une matiere
blanche:

blanche : je suppose que c'étoit les fleurs de zinc.

Le cuivre, traité de la même manière, à peu-près au même degré de chaleur que le mercure, donna de l'air très-libéralement, & la production d'air continua moyennant l'application d'un très-petit degré de chaleur de plus. Le produit entier fut de l'air acide vitriolique, & il n'y en eut point d'inflammable; l'huile de vitriol resta long-tems trouble, & déposa enfin une matière brunâtre.

L'argent dissous de même présenta le même résultat : l'air fut entièrement acide sans mélange d'air inflammable; l'huile de vitriol prit une sorte de couleur orangée, & ne déposa rien.

A un très-grand degré de chaleur, le plomb donna un peu d'air qui étoit entièrement acide, & n'en contenoit point d'inflammable.

L'or dans la même expérience ne donna point d'air du tout; mais l'huile de vitriol prit la même couleur orangée qu'avec l'argent.

La platine traitée de la même façon ne donna non-plus aucun produit sensible. J'avois reçu du Docteur Irving celle

que j'employai, & elle étoit exactement dépouillée du fer qu'elle contient naturellement.

Dans la plupart de ces procédés, l'air semble sortir des substances dès l'instant qu'on y applique la chaleur : quelquefois même sans chaleur ; & ce premier produit d'air forme des bulles qui subsistent quelque tems à la surface de la liqueur. Mais il paroît que ce n'est rien de plus que l'air commun qui adhéroit à la surface de ces substances, ou qui étoit renfermé dans les petites cavités que présente cette surface lorsqu'elle se trouve raboteuse ; car cette production apparente d'air cesse bientôt, & il n'y en a pas davantage de produit si l'on n'applique un degré de chaleur beaucoup plus considérable. Lorsque le véritable air acide commence à s'élever, les bulles qu'il forme crevent à l'instant comme les bulles d'air dans l'esprit de vin, & il n'y a pas la moindre apparence d'écume à la surface de l'huile de vitriol.

Comme le soufre se forme par l'union du phlogistique avec l'huile de vitriol extrêmement concentrée & très-échauffée, je m'imaginai qu'en chauffant dans

l'air acide vitriolique des substances contenant du phlogistique , je ne manquerois pas de produire du soufre. Je fis cette épreuve avec du charbon ; mais je n'en obtins pas l'effet que je m'étois promis. La chaleur d'une lentille, que j'appliquai sur le charbon dans cet air acide , lui fit seulement rendre ce qu'il en avoit absorbé, ou ce qui s'étoit condensé sur sa surface , conformément à ce que j'ai observé plus haut. L'air qui ne fut point absorbé après cette opération étoit en partie de l'air fixe & en partie de l'air inflammable ; l'un & l'autre provenant du charbon.

Cependant , il y a eu souvent quelque apparence de production de soufre , après le mélange de l'air alkalin avec l'air acide vitriolique ; car l'intérieur du tube étoit couvert d'une matiere parfaitement jaune. Mais cette couleur s'évanouit avec le tems , & il ne reste rien qu'une substance saline blanche. La première fois que j'observai cette couleur jaune , j'avois obtenu l'air acide vitriolique par le moyen de l'éther ; mais j'observai dans la suite le même effet , quoique l'air eût été produit par le moyen

du charbon; & d'une maniere encore plus remarquable, avec le même air produit par le cuivre. Pourquoi cette couleur n'est-elle pas permanente? C'est ce que je ne conçois pas.

SECTION II.

De l'air acide végétal.

LA méthode de présenter quelques-uns des acides sous la forme d'air une fois trouvée, rien n'étoit plus aisé que d'étendre ce procédé sur tous les autres. Je n'avois qu'à prendre l'acide sous sa forme liquide, c'est-à-dire, combiné avec l'eau, & en chasser l'air par la chaleur; ou bien je n'avois qu'à trouver quelque substance solide dans laquelle il fût combiné, le déloger par quelque acide plus fort, & recevoir dans le mercure l'air produit par ce procédé.

Pour me procurer l'*air acide végétal*, je me pourvus chez le Docteur Higgins d'une quantité d'acide de vinaigre concentré extrêmement fort, dont je tirai

fort aisément, par le moyen de la chaleur, & avec l'appareil représenté dans le premier volume, *fig. 8*, autant d'air que d'une égale quantité d'esprit de sel. Je trouvai cependant, qu'à moins que l'appareil ne fût muni d'un petit récipient pour intercepter la liqueur que l'ébullition pouvoit faire monter hors du vaisseau, je ne pouvois obtenir cet air acide exempt d'humidité, si ce n'est dans les premiers instans du procédé. Mais avec cette précaution, je l'ai eu aussi parfaitement sec que je pouvois le souhaiter.

Cet air acide végétal éteint la flamme d'une chandelle, exactement de même que l'air acide vitriolique; c'est-à-dire, sans que la flamme prenne aucune couleur particulière, soit en s'éteignant, soit lorsqu'on la rallume.

Je mis de l'air alkalin dans l'air acide végétal: le nuage blanc qu'on observe dans les mélanges de cette nature se forma à l'instant, & s'éleva tout à la fois au sommet du vaisseau, comme lorsqu'on emploie les autres airs acides. Les parois du vaisseau dans lequel je fis ce mélange se teignirent en jaune, comme dans le même procédé fait avec

30 TROISIEME PARTIE.

l'air acide vitriolique. Ce fait m'embarrasse d'autant plus, que je ne sache pas qu'on ait jamais observé la formation d'un pareil soufre (si toutefois cette substance est du soufre) sans le concours de l'acide vitriolique. Je m'imaginai d'abord que cette couleur tiroit son origine des ingrédiens qui servent à la production de l'air alkalin. Mais ayant mis tout de suite une autre portion du même air alkalin dans de l'air acide marin, je trouvai que le sel qui s'en forma étoit parfaitement blanc, sans la moindre teinte de jaune.

On a vu que les affinités des acides marin & vitriolique sous la forme d'air sont très-différentes de celles qu'ils ont, lorsqu'ils sont combinés comme à l'ordinaire avec l'eau. Mais dans toutes les épreuves que j'ai faites, l'acide végétal, même sous cette forme d'air qui est la plus avantageuse, paroît être plus faible qu'aucun des trois acides minéraux, exactement de même qu'on auroit pu le conclure d'après ce qu'on connoissoit jusqu'ici de sa nature & de ses propriétés. Car cet air acide végétal n'a été capable de décomposer aucune des sub-

stances dans la composition desquelles il entre quelqu'un des acides minéraux. Il n'a fait aucune impression sur le *soufre*, ni sur le *salpêtre*, ni sur le *sel commun*, ni sur le *sel ammoniac*, ni même sur le *borax*.

Le *charbon* absorbe l'air acide végétal très-promptement, & contracte par-là une odeur extrêmement piquante; mais l'air qui reste paroît n'avoir été altéré en rien, & n'avoir rien emprunté du charbon.

Le *foie de soufre* n'absorbe l'air acide végétal que lentement, & n'est ni décoloré ni dissous par cet air. J'examinai l'air lorsqu'il n'en restoit plus qu'une dixième partie, & je n'y trouvai rien d'inflammable, quoique ce fût le seul effet auquel je m'attendisse.

L'*eau* absorbe l'air acide végétal aussi promptement qu'aucun des autres airs acides. J'ai cherché une fois à déterminer la quantité de cet air que pourroit absorber une quantité donnée d'eau; & à mesurer l'augmentation de poids & de volume que cette eau acquerroit par cette imprégnation, ainsi que je l'avois fait jusqu'à un certain point à l'égard des

airs alkalin & acide marin ; mais l'expérience ne réussit point selon mes desirs , & je ne jugeai pas qu'il valût la peine de la tenter de nouveau.

J'avois mis à ce dessein une petite quantité d'eau dans un tube de verre ; mais je ne l'eus pas plutôt introduit dans l'air acide , à travers le mercure qui le renfermoit , qu'une petite bulle d'air commun , qui étoit à l'extrémité fermée du tube , commença à s'enfler , & continua de même jusqu'à ce qu'elle eût fait sortir toute l'eau du tube. La même chose m'arriva avec un tube dont l'extrémité étoit scellée hermétiquement. J'eus le même résultat avec de l'*esprit de vin* que j'introduisis de la même manière dans cet air acide ; l'effet fut seulement beaucoup plus rapide. Avec l'*huile de térébenthine* , cet effet fut encore plus prompt ; mais il fut beaucoup plus lent avec l'*huile d'olives*.

Cette expérience me fit imaginer que l'air commun recevoit une grande expansion par l'effluve de cet acide végétal , & je me promis en conséquence que si j'introduisois une quantité du même acide en liqueur dans de l'air commun

renfermé par le mercure , elle le dilatoit comme avoit fait l'éther. Mais bien loin que cela fût ainsi , l'air , au bout de quelque tems , parut diminué & éteignit une chandelle ; de forte qu'il devoit avoir été phlogistiqué par l'acide.

Je fis une seconde expérience de ce genre , dont le résultat fut qu'une quantité d'air commun , qui avoit été exposé pendant six semaines à l'effluve d'une petite quantité de l'acide végétal en liqueur , se trouva considérablement viciée. J'avois mis l'acide dans une tasse qui nageoit à la surface de l'eau par laquelle l'air étoit renfermé.

Soupçonnant que l'eau , qui étoit corrompue à un certain point , pouvoit avoir contribué à cette altération de l'air ; j'exposai pendant les cinq dernières semaines une égale quantité d'air commun , dans une jarre de la même capacité , à la même auge d'eau , & à tous égards dans les mêmes circonstances que la première , si ce n'est que je n'y mis point d'acide végétal. L'altération que cet air éprouva fut si peu considérable , que je pus à peine le distinguer de l'air commun ; en sorte qu'il

n'y eut aucun doute que dans l'expérience que je viens de rapporter, l'altération de l'air ne provînt des effluves de l'acide végétal.

L'air acide végétal est assez promptement absorbé par l'*huile d'olives*. Une quantité de cette huile en absorba environ dix fois son volume; & de jaunâtre qu'elle est naturellement, elle devint presque sans couleur comme l'eau; ce qui me parut d'autant plus remarquable, que tous les autres airs acides rendent plus foncée la couleur de toutes les especes d'huiles, jusqu'à les brunir; & leur donnent en même-tems une viscosité approchante de la consistance des résines; au lieu que cette huile, dans l'expérience dont je parle, devint plutôt moins gluante qu'auparavant. Elle approchoit un peu de la limpidité de l'eau, ou pour mieux dire, elle ressembloit davantage à une huile essentielle.



SECTION III.

De l'air déphlogistiqué, & de la constitution de l'atmosphère.

CETTE Section mettra dans un nouveau jour la vérité d'une remarque que j'ai faite plus d'une fois dans mes écrits sur la Physique, & qu'on ne faudroit trop répéter, puisqu'elle tend à encourager les recherches : c'est qu'on doit plus à ce que nous appelons le *hasard*, c'est-à-dire, philosophiquement parlant, à l'observation des *effets dont les causes sont inconnues*, qu'à aucun *desssein* prémédité, ou à aucune *théorie* imaginée d'avance pour diriger les travaux. On ne s'apperçoit point de cette vérité dans les Ouvrages de Physique écrits *synthétiquement*. Mais elle paroîtroit sans doute d'une manière très-frappante, dans les Ouvrages des Physiciens les plus célèbres par leur pénétration, s'ils écrivoient *analytiquement* & avec sincérité.

Pour ma part, je reconnoîtrai avec franchise, qu'en commençant les expériences rapportées dans cette Section, j'étois si éloigné d'avoir formé aucune hypothese qui pût me conduire aux découvertes que j'ai faites en suivant ces expériences, que si quelqu'un eût pu me prédire ces découvertes, je ne les aurois pas crues probables. Et lorsque les faits décisifs se présenterent enfin à ma connoissance, ce ne fut que très-lentement, & après avoir longtemps hésité que je cédai à l'évidence; & cependant lorsque je reviens à considérer cette matiere, & que je compare mes dernieres découvertes touchant la constitution de l'atmosphère avec les premieres, je vois entr'elles la connexion la plus intime & la plus facile à saisir; en sorte que j'admire comment je n'ai pas été conduit immédiatement des unes aux autres. Si cela n'est pas arrivé, je l'attribue à la force du préjugé qui, à notre insçu, fait illusion non-seulement à notre *jugement* proprement dit; mais encore à nos sens: car nous pouvons tenir si fortement une maxime pour véritable, que l'évidence

la plus claire pour nos sens ne détruise pas entièrement nos opinions, & ait même souvent de la peine à les modifier. Plus un homme a d'esprit, plus il est fortement attaché à ses erreurs : son esprit ne servant qu'à le tromper, en lui donnant des moyens d'éluder la force de la vérité.

Il y a, je crois, peu de maximes en Physique, mieux établies dans tous les esprits que celle-ci : que l'air *atmosphérique*, (abstraction faite des diverses matières étrangères qu'on a toujours supposées dissoutes & mêlées dans cet air); est une *substance élémentaire simple*, indestructible & inaltérable, du moins autant que l'on suppose que l'est l'élément de l'eau. Je m'assurai cependant bientôt, dans le cours de mes recherches, que l'air de l'atmosphère n'est pas une substance inaltérable; puisque le phlogistique dont il se charge par la combustion des corps, par la respiration des animaux, & par différens procédés chimiques, l'altère & le déprave au point de le rendre totalement incapable de servir à l'inflammation des corps, à la respiration des animaux, & aux au-

tres usages auxquels il est propre. Je découvris aussi que l'agitation dans l'eau , le procédé de la végétation , & probablement d'autres procédés naturels le rétablissent dans sa pureté primitive , en le dépouillant du phlogistique superflu. Mais j'avoue que je n'avois aucune idée de la possibilité d'aller plus loin dans cette carrière , & d'arriver au point d'obtenir une espece d'air plus pure que le meilleur air commun. Il est vrai que j'aurois pu naturellement m'imaginer que tel seroit un air qui contiendrait moins de phlogistique que l'air de l'atmosphère ; mais je n'avois pas d'idée qu'une telle composition fût possible.

On aura vu dans mon premier volume , que mes expériences sur l'air acide marin m'avoient conduit à conclure que l'air commun étoit composé de quelque acide , (j'étois porté naturellement à penser que c'étoit celui sur lequel j'opérais pour lors) & de phlogistique ; parce que l'union de cette vapeur acide & du phlogistique forme l'air inflammable , qui ensuite agité dans l'eau perd son inflammabilité , & devient propre à la respiration. Et quoique je n'eusse jamais

pu le rendre tout-à-fait aussi bon que l'air commun, je jugeois très-probable que la végétation dans des circonstances plus favorables que celles où je pouvois l'appliquer, ou quelque autre procédé naturel, avoit le pouvoir de le rendre plus pur.

C'est sur cette supposition, dont personne ne sauroit nier la probabilité, que je fondeis ma conjecture : que les volcans avoient donné naissance à l'atmosphère de notre planète, en lui fournissant un air permanent, d'abord inflammable, privé ensuite de son inflammabilité par l'agitation dans les eaux, & ultérieurement purifié par la végétation.

Plusieurs des phénomènes connus que présente l'*acide nitreux* auroient pu me conduire à penser qu'il étoit plus propre que l'acide marin à la constitution de l'atmosphère ; mais comme mes pensées avoient pris une autre route, ce n'a été qu'une suite d'observations que je vais rapporter en détail, qui m'a forcé à adopter une autre hypothèse. J'ai été conduit ainsi, par une voie dont je n'avois alors aucune idée, à la solution du grand problème que j'ai toujours eu en

vue , depuis que j'ai découvert que l'air atmosphérique est sujet à l'altération , & que par conséquent il n'est pas une substance élémentaire , mais un *composé*. Voici ce problème : « Quel est ce » composé ? ou qu'est-ce que *la chose* » *que nous respirons* , & comment faut-il » il s'y prendre pour la composer de ses » principes constituans ? »

Lorsque je publiai mon premier volume , je n'étois pas encore muni d'une *lentille ardente* d'une force considérable ; & faute de ce secours , il m'étoit impossible de faire bien des expériences que j'avois projetées , & qui dans la spéculation sembloient promettre beaucoup. J'avois bien un *miroir* d'une force suffisante pour mon dessein ; mais telle est la nature de cet instrument , qu'on ne peut appliquer son foyer qu'à des substances capables d'être suspendues , ou d'être placées sur un support très-délié. On ne peut absolument le diriger sur aucune substance en *poudre* , ni même , si ce n'est très-difficilement , sur telle substance qu'on veuille placer dans un vaisseau rempli de mercure : ce qui me paroît la méthode la plus exacte.

d'extraire de l'air d'un grand nombre de substances diverses , comme je l'ai expliqué dans l'Introduction de ce volume. Mais dans la suite, m'étant procuré une lentille de douze pouces de diamètre, & dont le foyer est à la distance de vingt pouces, je me mis avec ardeur à examiner, par le secours de cette lentille, quelle espece d'air pouvoient fournir plusieurs substances diverses, tant naturelles que factices, en les mettant dans les vaisseaux représentés fig. *a*, que je remplis de mercure, & que je tins renversés dans des bassins remplis de ce métal. M. Warltire, habile Chymiste, & professeur de Physique, se trouvant dans ce tems à Calne; je lui expliquai mes vues, & il me fournit beaucoup de substances que je n'aurois pu me procurer par une autre voie.

Avec cet appareil, après nombre d'autres expériences dont on trouvera le détail en son lieu : le premier Août 1774, je tâchai de tirer de l'air du *mercure calciné * per se*, & je trouvai sur le

* C'est ce qu'on appelle improprement *mercure précipité per se*.

champ que par le moyen de ma lentille j'en chassois l'air très - promptement. Ayant ramassé de cet air environ trois ou quatre fois le volume de mes matériaux, j'y admis de l'eau, & je trouvais qu'elle ne l'absorboit point; mais ce qui me surprit plus que je ne puis l'exprimer, c'est qu'une chandelle brûla dans cet air avec une flamme d'une vigueur remarquable, fort semblable à cette flamme aggrandie, avec laquelle une chandelle brûle dans l'air nitreux exposé au fer ou au foie de soufre (vol. I. pag. 281). Mais comme je n'avois jamais observé de phénomène pareil dans aucune autre espece d'air que cette modification particulière de l'air nitreux; & sachant qu'il n'entre point d'acide nitreux dans la préparation du *mercure calciné*, je fus entièrement hors d'état d'expliquer ce phénomène.

Dans ce cas aussi, quoique je n'aie pas donné alors une attention suffisante à cette circonstance, la flamme de la chandelle, outre qu'elle étoit plus grande, avoit plus d'éclat & de chaleur que dans l'espece d'air nitreux dont j'ai parlé. Un morceau de bois embrasé y étince-

loit exactement comme du papier trempé dans une dissolution de nitre , & s'y consuma très-promptement : expérience que je n'avois jamais pensé à faire avec l'air nitreux.

En même-tems que je fis l'expérience que je viens de rapporter , je tirai du *précipité rouge* ordinaire une quantité d'air qui avoit la même propriété ; & cette substance étant produite par une dissolution de mercure dans l'esprit de nitre , je conclus que cette propriété particulière , semblable à celle de la modification d'air nitreux dont j'ai parlé , dépendoit de quelque chose qui lui étoit communiqué par l'acide nitreux ; & puisqu'on fait le *mercure calciné* , en exposant du mercure à un certain degré de chaleur , de manière que l'air commun ait un libre accès autour de lui ; je conclus pareillement que cette substance , à ce degré de chaleur , avoit reçu quelque chose de *nitreux* de l'atmosphère.

Trouvant cependant ce fait beaucoup plus extraordinaire qu'il n'auroit dû me le paroître , je conservai quelque soupçon que le mercure calciné , sur lequel j'avois fait mes expériences , ayant été

acheté à une boutique ordinaire, pouvoit dans le fait n'être rien de plus que le précipité rouge ; quoique pour peu que j'eusse été praticien en Chymie, je n'eusse pu concevoir un pareil soupçon. Mais je fis part de mon doute à M. Warltire, & il me fournit du mercure calciné qu'il avoit gardé pour modele de cette préparation, & dont il m'assura qu'il pouvoit garantir la composition. Je traitai celui-ci comme le premier, & en continuant seulement plus long-tems l'application de la chaleur, j'en tirai beaucoup plus d'air que de l'autre.

Cette expérience auroit pu satisfaire un sceptique modéré. Mais cependant me trouvant à Paris au mois d'Octobre suivant, & sachant qu'il y a de très-habiles Chymistes dans cette ville, je ne manquai pas l'occasion de me procurer, par le moyen de mon ami M. Magellan, une once de mercure calciné préparé par M. Cadet, & dont il n'étoit pas possible de suspecter la bonté. Dans le même-tems, je fis part plusieurs fois de la surprise que me caufoit l'air que j'avois tiré de cette préparation à MM. Lavoisier, Leroi, & autres Phy-

ficiens qui m'honorèrent de leur attention dans cette ville, & qui, j'ose dire, ne peuvent manquer de se rappeler cette circonstance.

Je n'avois alors aucun soupçon que l'air que j'avois tiré du mercure calciné fût même salubre, tant j'étois éloigné de savoir ce que j'avois réellement découvert. Je tenois pour certain que ce n'étoit rien de plus qu'une espèce d'air pareil à celui en lequel j'avois transformé l'air nitreux par les procédés que j'ai rapportés; & l'on a vu que bien qu'une chandelle brûle dans cet air, quelquefois tout-à-fait naturellement, & quelquefois avec une flamme aggrandie, il demeure cependant parfaitement nuisible.

Dans le même-tems où j'avois obtenu l'air en question du mercure calciné & du précipité rouge, j'avois tiré la même espèce d'air du *minium*. Dans cette expérience, la partie du *minium* sur laquelle je fis tomber le foyer de la lentille devint jaune. Un tiers de l'air fut promptement absorbé par l'eau; mais une chandelle brûla très-fortement & avec pétilllement dans le résidu.

J'avois observé auparavant que le mi-

nium contient de l'air fixe ; je l'en avois extrait par la chaleur d'une chandelle , & je l'avois trouvé très-pur. Voyez le premier volume page 251. Je m'imagine que pour chasser toute autre espece d'air , il faut plus de chaleur que je n'en employois alors.

Cette expérience avec le *minium* me confirma davantage dans mon idée , que le *mercure calciné* doit emprunter de l'atmosphère la propriété de fournir cette espece d'air : le procédé de cette préparation étant semblable à celui par lequel on fait le *minium*. Comme je ne fais jamais un secret d'aucune de mes observations , je fis part de cette expérience , aussi-bien que de celles sur le *mercure calciné* & sur le *précipité rouge*, à toutes mes connoissances à Paris & ailleurs. Je ne soupçonnois pas alors où devoient me conduire ces faits remarquables.

D'abord après mon retour en Angleterre , je me mis à travailler sur le *mercure calciné*, que j'avois eu de chez M. Cadet ; & à un degré de chaleur très-moderé , je tirai d'environ un quart d'once que j'en employai une mesure

d'air qui ne fut pas promptement absorbé, ni par la substance même dont il étoit sorti (car je les laissai long-tems ensemble avant de transvaser l'air dans un autre vaisseau), ni par l'eau dans laquelle je le laissai séjourner pendant un tems considérable avant de le soumettre à aucune expérience.

Une chandelle brûla dans cet air, comme je m'y attendois, avec une flamme vive; mais ce que j'observai de nouveau ce jour-là 19 Novembre, & qui ne me surpris pas moins que le fait que j'avois découvert auparavant, ce fut que tandis qu'une agitation de peu de momens dans l'eau, suffit pour priver l'air nitreux modifié de sa propriété d'entretenir la flamme d'une chandelle, il n'y eut aucun changement sensible dans celui-ci après une agitation dix fois plus longue; une chandelle brûloit encore dans cet air avec une flamme forte; & étant mêlé avec l'air commun, il ne le diminua point du tout, au lieu que l'air nitreux modifié produit, comme on a vu, cet effet jusqu'à un certain point.

Mais je fus beaucoup plus surpris,

lorsqu'au bout de deux jours , pendant lesquels cet air étoit demeuré en contact avec l'eau (& y avoit perdu environ un vingtieme de son volume) , je l'agitai violemment dans l'eau pendant cinq minutes , ou à peu-près , & je trouvai qu'une chandelle y brûloit encore aussi-bien que dans l'air commun. Le même degré d'agitation auroit , à la vérité , rendu propre à la respiration l'air nitreux phlogistique ; mais cet air auroit certainement éteint une chandelle.

Ces faits me convinquirent pleinement qu'il doit y avoir une différence très-essentielle , entre la constitution de l'air extrait du mercure calciné , & celle de l'air nitreux phlogistique , nonobstant leur ressemblance en quelques particularités. Mais quoique je n'eusse aucun doute que l'air tiré du mercure calciné ne fût propre à la respiration , après avoir été agité dans l'eau , de même que toutes les especes d'air , sans exception , sur lesquelles j'en avois fait l'expérience ; je ne soupçonnois pas encore qu'il fût respirable dès son origine : tant j'étois loin d'avoir aucune idée que cet air fût , comme il l'étoit réellement , beaucoup supérieur ,

supérieur , à cet égard , à l'air de l'atmosphère.

Je restai dans l'ignorance de la nature réelle de cette espece d'air , depuis ce tems (en Novembre) jusqu'au premier Mars de l'année suivante. Dans cet intervalle je m'occupai de mes expériences sur l'air acide vitriolique dont on a vu le détail ci-devant , & sur les différentes modifications de l'air produit par l'esprit de nitre , dont je donnerai le détail ci-dessous. Mais dans le courant de ce mois , non-seulement je déterminai la nature de cette espece d'air , quoique je n'y parvinsse que par degrés ; mais encore je fus conduit par-là à la découverte complete de la constitution de l'air que nous respirons.

Jusqu'à ce 1^{er} Mars 1775 , j'avois si peu de soupçon que l'air tiré du mercure calciné , &c. fût salubre , que je n'avois pas même pensé à y appliquer l'épreuve de l'air nitreux. Mais réfléchissant (comme mon Lecteur s'imaginera sans doute que je dois avoir fait souvent) sur la faculté qu'avoit encore cet air d'entretenir la flamme d'une chandelle , après avoir été long-tems agité

dans l'eau , il me vint enfin en idée d'en faire l'expérience ; & ayant mis une partie d'air nitreux dans deux de cet air , je trouvai non-seulement qu'il étoit diminué , mais qu'il l'étoit tout-à-fait autant que l'air commun , & que la rougeur du mélange étoit égale à celle d'un semblable mélange d'air nitreux & d'air commun.

Je ne doutai plus , après cela , que l'air tiré du mercure calciné , ne fût propre à la respiration , & qu'il n'eût toutes les autres propriétés du véritable air commun ; mais je ne fis pas attention à ce que j'aurois pu observer , si je n'eusse été si pleinement atteint du préjugé qu'il n'y a point d'air meilleur que l'air commun ; c'est que la rougeur étoit réellement plus foncée , & la diminution un peu plus considérable , qu'elles n'auroient été avec de l'air commun.

Bien plus , ce nouveau pas dans la carrière de la vérité , me fit retomber dans l'erreur , en me faisant abandonner l'hypothèse que j'avois d'abord formée : savoir , que le mercure calciné avoit extrait l'esprit de nitre de l'air ; & je conclus pour lors que dans la pré-

paration de cette substance, de même que dans le procédé de la préparation du minium, toutes les parties constituantes de l'air de l'atmosphère étoient absorbées également & dans leur proportion naturelle ; car en même-tems que j'avois fait l'expérience dont je viens de parler sur l'air tiré du mercure calciné, j'avois pareillement observé que l'air extrait du minium étoit de la même nature, c'est-à-dire, qu'après que je lui avois enlevé l'air fixe par le lavage, il étoit diminué par l'air nitreux comme l'air commun. Mais dans le même-tems je fus fort étonné de trouver que l'air tiré du précipité rouge étoit diminué de la même manière, quoique le procédé de la préparation de cette substance soit tout-à-fait différent de celui par lequel on prépare les deux autres. Je ne fis cependant pas beaucoup d'attention à cette circonstance.

Je souhaite que mon Lecteur ne soit pas déjà fatigué de la répétition fréquente du mot *surprise*, & autres termes analogues, dont il faut que je continue encore quelque tems à me servir ; car le jour suivant je fus plus surpris que je

ne l'avois jamais été , en trouvant qu'après que le mélange d'air nitreux & d'air tiré du mercure calciné eut reposé toute la nuit * , une chandelle y brûloit , & même mieux que dans l'air commun.

Je ne puis me rappeler maintenant ce que j'avois en vue en faisant cette épreuve ; mais je fais que je ne m'attendois nullement au succès qu'elle eut. Comme j'avois acquis beaucoup de dextérité à faire des expériences de cette nature , un motif très-léger & très-facile à oublier étoit suffisant pour m'engager à faire celle-là. Si cependant , il ne me fût arrivé d'avoir , à quelque autre dessein , une chandelle allumée devant moi , je n'aurois probablement jamais fait cette épreuve , & toute la suite de mes expériences subséquentes sur cette espece d'air seroit restée dans le néant.

* Ce tems étoit suffisant pour que la diminution fût complète , & par conséquent , si l'air soumis à cette épreuve eût été de l'air commun , il seroit devenu entièrement nuisible , & aussi peu propre à l'entretien de la flamme qu'à la respiration.

N'ayant cependant jusques-là aucune idée de la cause réelle de ce phénomène , je le regardai comme quelque chose de très-extraordinaire ; comme une propriété accessoire qui étoit particulière à l'air extrait de ces substances ; & je parlai toujours de cette espèce d'air à mes connoissances , comme d'un être qui étoit *substantiellement* la même chose que l'air commun. Je me souviens, en particulier, d'avoir dit au Docteur Price, que j'étois parfaitement assuré, quant à moi, que c'étoit de l'air commun, ainsi qu'il paroïssoit par l'épreuve de l'air nitreux ; quoique pour la satisfaction des autres , j'eusse besoin d'une souris, qui rendît la preuve tout-à-fait complète.

Le 8 du même mois , je me procurai une souris , & je la mis dans un vaisseau de verre contenant deux mesures de l'air extrait du mercure calciné. Si c'eût été de l'air commun, une souris comme celle-ci, qui avoit pris tout son accroissement, y auroit vécu environ un quart-d'heure. Cependant ma souris vécut une demi-heure entière dans l'air en question ; & quoiqu'elle parût morte

lorsque je la retirai, elle n'avoit été qu'excessivement refroidie, car étant restée un moment auprès du feu, elle revint & parut n'avoir reçu aucun mal dans cette expérience.

Je fus confirmé par-là dans ma conclusion, que l'air extrait du mercure calciné, &c. étoit *au moins aussi-bon* que l'air commun. Mais je ne conclus pas, avec certitude, qu'il fût *meilleur*, parce que je savois qu'il n'étoit pas impossible qu'une souris vécut demi-heure dans une quantité donnée d'air, où une autre souris ne pourroit vivre qu'un quart-d'heure : tant cette méthode de déterminer la bonté de l'air est inexacte. Et en vérité, je n'y ai jamais eu recours depuis la découverte de cette épreuve très-facile, très-exacte & très-curieuse, que fournit l'air nitreux. Mais dans le cas où j'étois alors, j'avois en vue de publier un détail de mes expériences qui pût satisfaire tout le monde, en ne laissant à desirer aucune des preuves que la nature de la chose pouvoit admettre.

Cette expérience avec la souris, lorsque j'y eus réfléchi quelque tems, me

donna tant de soupçon que l'air dans lequel je l'avois mise étoit meilleur que l'air commun, que je m'avisai, le jour suivant, d'appliquer l'épreuve de l'air nitreux à une petite portion de cette même quantité d'air que la souris avoit respirée pendant si long-tems. Si c'eût été de l'air commun, j'étois assuré qu'il auroit été, à peu de chose près, sinon tout-à-fait, aussi nuisible qu'il est possible, de maniere à n'être point affecté par l'air nitreux. Mais à ma surprise encore, je trouvai qu'il étoit meilleur que l'air commun : car après que je l'eus mêlé avec l'air nitreux, dans la proportion usitée de deux à un, il fut diminué dans la proportion de quatre & demi à trois & demi ; c'est-à-dire, que l'air nitreux le diminua de deux neuviemes, & cela dans un espace de tems très-court ; tandis que je n'avois jamais trouvé que dans le plus long intervalle de tems, l'air commun quelconque eût été réduit de plus d'un cinquieme de son volume par aucune proportion d'air nitreux, ni de plus d'un quart par aucun procédé phlogistique quelconque. M'étant occupé de ce fait extraordinaire dans mon

lit, le lendemain matin j'ajoutai une nouvelle partie d'air nitreux à ce même mélange, & à mon étonnement extrême, je trouvai qu'il fut encore diminué jusqu'à près de la moitié de sa quantité primitive. J'y en mis alors une troisieme partie; elle ne le diminua pas davantage; mais cependant le laissa moindre d'une partie qu'il n'étoit même après que j'en eus retiré la souris.

Etant alors pleinement assuré que cet air, même après que la souris l'avoit respiré pendant une demi-heure, étoit beaucoup meilleur que l'air commun; & en ayant conservé une quantité suffisante pour de nouvelles expériences: savoir, une mesure & demie, j'y mis la souris, & j'observai que non-seulement elle n'éprouva aucun choc en y entrant, ce dont il y auroit eu des signes évidens si l'air n'eût pas été très-salubre; mais encore elle y demeura parfaitement à son aise une autre demi-heure entière, après quoi je la retirai toute vivante & vigoureuse. Ayant mesuré l'air le jour suivant, je le trouvai réduit à deux tiers de mesure; & après cela, autant que je puis m'en souvenir,

(car je trouve seulement dans mon *registre* de ce jour , qu'il fut *considérablement diminué* par l'air nitreux) il étoit à peu-près aussi bon que l'air commun. En effet , il étoit évident que la souris en étant sortie pleine de vigueur , l'air ne pouvoit être devenu très-nuisible.

Pour ma plus grande satisfaction , je me procurai une autre souris , & je la mis dans moins de deux mesures d'air extrait du mercure calciné & d'air extrait du précipité rouge , (j'avois mêlé ces airs ensemble , parce que j'avois trouvé qu'ils étoient de même qualité ;) elle y vécut trois quarts-d'heure ; mais n'ayant pas pris la précaution de mettre le vaisseau dans un endroit chaud , je soupçonne qu'elle mourut de froid ; cependant , comme elle avoit vécu trois fois aussi long-tems qu'elle auroit probablement pu vivre dans la même quantité d'air commun , & comme je n'attendois pas beaucoup d'exactitude de ce genre d'épreuves , je ne crus pas nécessaire de faire encore des expériences avec les souris.

Alors pleinement convaincu de la

bonté supérieure de cette espece d'air ; j'en mesurai le degré de pureté avec autant d'exactitude qu'il me fût possible , par l'épreuve de l'air nitreux. Je commençai par mettre une partie d'air nitreux dans deux de cet air , comme si j'eusse voulu examiner de l'air commun , & j'observai que la diminution fut évidemment plus grande que celle qu'auroit essuyée l'air commun traité de même. Une seconde partie d'air nitreux le réduisit aux deux tiers de sa quantité primitive , & une troisieme le réduisit à la moitié. Soupçonnant que la diminution n'iroit pas beaucoup plus loin , je n'y ajoutai alors qu'une demi-partie d'air nitreux qui le diminua encore , mais peu ; & une autre demi-partie le fit revenir à un peu plus de la moitié de sa quantité primitive ; enforte que dans ce cas , deux parties de cet air reçurent plus de deux parties d'air nitreux , & resterent néanmoins réduites à moins d'une partie. Cinq parties le rendirent assez exactement à ses premieres dimensions.

Dans le même-tems, l'air tiré du *précipité rouge* fut diminué dans la même

proportion que celui du *mercure calciné*. Cinq parties d'air nitreux que j'ajoutai à deux parties de cet air, n'en augmentèrent point les dimensions. L'air commun prend environ la moitié de son volume d'air nitreux, avant de commencer à recevoir de l'addition à ses dimensions par de nouvel air nitreux. Or, puisque l'air dont il s'agit en prit plus de quatre demi-parties, avant qu'il cessât d'être diminué par de nouvel air nitreux, & que même cinq demi-parties de plus ne firent aucune addition à ses dimensions primitives : je conclus qu'il étoit de quatre à cinq fois aussi bon que l'air commun. On verra que j'ai obtenu depuis un air meilleur que celui-là, & même de cinq à six fois aussi bon que le meilleur air commun que j'aie jamais examiné.

Je fus alors pleinement satisfait sur la *nature* de cette nouvelle espèce d'air ; c'est-à-dire, que je conclus qu'elle doit contenir originairement moins de phlogistique que l'air commun, puisqu'elle est capable d'en recevoir davantage de l'air nitreux. L'objet qui se présenta tout de suite à mes recherches fut de

découvrir par quel moyen cet air parvient à être si pur, ou philosophiquement parlant, si *déphlogistiqué* ; & comme le minium donne la même espèce d'air que le mercure calciné, quoique mêlée avec de l'air fixe, je me mis à examiner toutes les préparations de plomb faites par la chaleur à l'air libre, pour voir quelle espèce d'air elles donneroient ; en commençant par la *chaux grise* & finissant par la *litharge*.

Le minium dont je me servis dans cette suite d'expériences donna une quantité considérable d'air déphlogistiqué, & très-peu d'air fixe. J'ai trouvé fréquemment des différences très-remarquables entre divers échantillons de minium, à cet égard, aussi-bien que dans la pureté de l'air qu'ils contiennent ; mais je ne fais à quelle circonstance dans la préparation du minium ou dans la manière de le conserver, tiennent ces différences ; elles peuvent cependant provenir, en grande partie, du plus ou moins de soin qu'on prend pour en extraire l'air fixe. Dans cette expérience, deux parties d'air nitreux, jointes à une partie de cet air, le réduisirent à un

tiers de ce qu'il étoit au commencement, & près de trois fois son volume d'air nitreux firent très-peu d'addition à ses dimensions primitives; de sorte que cet air étoit excessivement pur & meilleur qu'aucun que j'eusse obtenu auparavant.

La préparation appelée *massicot*, (qu'on dit être dans un état moyen entre la chaux grise & le minium) donna aussi une quantité d'air considérable, dont environ la moitié étoit de l'air fixe, & le restant étoit tel, que lorsque j'y eus ajouté une égale quantité d'air nitreux, son volume fut un peu moindre qu'auparavant; en sorte que cet air étoit environ deux fois aussi pur que l'air commun.

J'ai trouvé assez remarquable que parmi les préparations du plomb par la chaleur, celles avant & après le minium & le *massicot* n'aient donné que de l'air fixe. J'observerai aussi en passant, que j'ai tiré une très-petite quantité d'air d'une *mine de plomb*, par le moyen de la lentille; la majeure partie de cet air fut promptement absorbée par l'eau; le res-

te ne fut pas affecté par l'air nitreux , & éteignit la chandelle.

J'obtins par le même procédé très-peu d'air de la *chaux grise du plomb* ; & il étoit précisément de la même qualité que le précédent. La partie de cet air qui ne fût pas affectée par l'air nitreux éteignit une chandelle ; enforte qu'on peut dire que ces deux substances ont donné de l'air fixe , qui contenoit seulement une plus grande portion que de coutume de cette partie qui ne s'unit pas avec l'eau.

La *litharge* (préparation qui succède au minium) donna de l'air assez promptement ; mais ce fut aussi de l'air fixe , & ce que l'eau n'en absorba point ne fut pas affecté par l'air nitreux.

Il reste beaucoup plus à faire que je n'ai eu l'occasion de faire moi-même , pour déterminer de quelles circonstances , dans ces préparations du plomb , dépend la qualité de l'air qu'elles contiennent. Cela ne peut être fait que par quelqu'un qui assistera assidument aux procédés de ces préparations , pour voir de ses propres yeux la manière

dont elles se font , & pour les examiner dans tous leurs différens états. J'ai beaucoup souhaité de tenter moi-même quelque chose en ce genre ; mais j'y ai trouvé de l'impossibilité , relativement à ma situation. Cependant , j'engageai le Docteur Higgins (qui m'a fourni plusieurs préparations que j'aurois eu de la peine à me procurer d'ailleurs) à faire pour moi une quantité de minium , afin que je pusse au moins l'examiner & lorsqu'il est *récemment fait* , & après l'avoir gardé dans différentes circonstances. Mais , si par le secours de cette préparation , je n'ai point fait ce que j'avois en vue , j'ai fait quelque'autre chose de beaucoup plus grande importance.

Ce minium récent avoit un coup d'œil jaunâtre , & il y en avoit quelques morceaux entièrement jaunes. Je l'éprouvai tout de suite de la même manière que j'avois fait les expériences précédentes : savoir , avec la lentille ardente & dans le mercure ; & je trouvais qu'il me donnoit très-peu d'air & avec grande difficulté , exigeant pour cela une chaleur très-intense. Avec une égale

quantité d'air nitreux , une partie de cet air fut réduite à la moitié de son volume primitif , & trois parties & demie le saturerent ; l'air étoit par conséquent très-pur : & la quantité produite étant très-petite , l'état de cette substance paroissoit très-favorable pour déterminer de quelle circonstance dépendoit l'acquisition qu'elle faisoit de cet air.

Mon objet fut alors d'amener ce minium nouvellement fait , qui donnoit très-peu d'air , à cet état dans lequel d'autre minium en avoit donné une grande quantité ; & regardant comme accordé , en conséquence du raisonnement dont j'ai rendu compte ci-dessus , que le minium doit attirer de l'atmosphère quelque espece d'acide pour acquérir cette propriété ; je pris trois demi-onces séparées de ce minium récent , & je les humectai jusqu'à en former une espece de pâte avec chacun des trois acides minéraux : savoir , le vitriolique , le marin , & le nitreux ; & comme mon intention étoit d'en faire l'expérience dans un canon de fusil ; de peur que le fer n'en fût trop affecté , je desséchai

tous ces mélanges jusqu'à ce qu'ils fussent parfaitement durs ; je les pulvérisai & les mis dans mon canon de fusil , rempli jusqu'à la bouche , de cailloux en poudre qui , ainsi que je le savois par expérience , ne donnent que peu ou point d'air lorsqu'on les traite de cette manière. J'avois trouvé aussi que par ce procédé on ne pouvoit obtenir d'une égale quantité de ce même minium tout seul , une quantité d'air suffisante pour être soumise à l'expérience.

Les portions de minium que j'avois humectées avec les acides vitriolique & marin , devinrent blanches ; mais celle que j'avois humectée avec l'acide nitreux , acquit une couleur brune foncée. Les mélanges avec les acides nitreux & marin , se sécherent assez facilement ; mais celui avec l'acide vitriolique ne fut jamais parfaitement sec , & il en demeura une grande partie sous la forme d'une pâte mollassé.

Ni le mélange avec l'acide vitriolique , ni celui avec l'acide marin ne donnerent le moindre vestige d'air dans cette expérience. Mais au moment où

la composition dans laquelle entroit l'acide *nitreux* sentit la chaleur, il commença à y avoir de l'air produit que je reçus dans le mercure. Il y eut environ une mesure d'air tout-à-fait transparent; mais d'abord après, il devint extrêmement rouge, & conjecturant que cette rougeur provenoit de la dissolution du mercure par la vapeur *nitreuse*, je n'en reçus pas plus de deux mesures par le même appareil; & je fis passer dans l'eau tout le restant, qui fut presque d'une pinte. La plus grande partie de ce produit étoit de l'air fixe promptement absorbé par l'eau & éteignant une chandelle. Il y eut cependant un résidu considérable, dans lequel une chandelle brûla avec pétilllement, d'où je conclus que c'étoit de véritable air déphlogistiqué.

Dans cette expérience, j'avois humecté plusieurs fois le minium avec de l'esprit de nitre, & l'avois redesséché à chaque fois. Lorsque je la répétois, je n'humectai qu'une fois le minium avec ce même acide, & j'en obtins, à quelque chose près, une chopine d'air; mais il

étoit presque tout déphlogistiqué, & environ cinq fois aussi pur que l'air commun.

N. B. Tous les acides firent une violente effervescence avec le minium.

Quoiqu'il y eut dans les résultats de ces expériences, une différence que je discuterai ci-dessous, je fus convaincu dès-lors, que c'étoit l'acide nitreux que le minium avoit emprunté de l'air, & que cet acide l'avoit mis en état de donner de l'air déphlogistiqué, conformément à ma première conjecture. Ayant trouvé aussi, comme on le verra dans la section suivante, qu'on obtient la même espèce d'air en humectant avec de l'esprit de nitre, toutes sortes de terres exemptes de phlogistique, & les traitant comme j'avois traité le minium dans l'expérience dont je viens de parler; il ne resta aucun doute dans mon esprit, que l'air *atmosphérique*, ou la chose que nous respirons, *ne soit composé d'acide nitreux & de terre*, avec autant de phlogistique qu'il en faut pour le rendre élastique, & avec ce qu'il en faut de plus pour le faire descendre de son état de pureté parfaite, à la

qualité médiocre qu'il a dans la nature.

Dans cette vue, j'essayai avec succès, les *fleurs de zinc*, la *craie*, la *chaux vive*, la *chaux éteinte*, la *terre à pipe*, les *cailloux*, le *talc de Moscovie*, & autres substances analogues, qui comprennent toutes les sortes de terres essentiellement différentes l'une de l'autre, relativement à leurs propriétés chimiques. Je réserve pour une autre section le détail particulier des procédés avec ces différentes substances; il suffira d'avoir donné dans celle-ci l'histoire de la découverte, & une idée générale de la nature de cet air déphlogistiqué, avec les inductions générales qu'on peut en tirer relativement à la constitution de l'atmosphère.

Ce qui me confirma d'autant plus dans mon idée que l'esprit de nitre & la terre constituent l'air respirable, c'est que, lorsque j'avois traité de la manière rapportée ci - dessus quelque une des matières sur lesquelles j'ai fait cette expérience, & qu'elle avoit donné tout l'air qu'on pouvoit en extraire par ce procédé, si je l'humectois avec de

nouvel esprit de nitre , & si je la traitois de la même manière qu'auparavant , elle donnoit autant d'air déphlogistiqué que la première fois : ce qu'on peut répéter jusqu'à ce que toute la matière terreuse soit épuisée. Il suffira de rapporter un ou deux faits de cette nature tirés de mon registre.

Le 18 d'Avril , je pris les restes du minium récent dont j'avois tiré une grande quantité d'air déphlogistiqué , & en ayant humecté environ trois quarts d'once , pour la seconde fois , avec de l'esprit de nitre , j'en obtins environ une pinte d'air qui , dans sa totalité , étoit près de six fois aussi pur que l'air commun. Cet air fut produit très-rapidement , & le tube de verre par lequel il passa se remplit de vapeurs rouges ; c'étoit à ce que je suppose , l'acide nitreux qui excédoit dans la composition de l'air ; mais qui étoit ensuite absorbé par l'eau dans laquelle je le recevois.

Dans ce procédé , ainsi que dans beaucoup d'autres , mon Lecteur trouvera une grande variété dans la pureté de l'air extrait des mêmes substances ; mais on n'en fera pas étonné , si l'on fait

attention qu'une petite quantité de matiere phlogistique qui se mêle accidentellement avec les ingrédiens nécessaires pour la composition de cet air , le déprave à coup sûr. Et cet effet ne peut manquer d'arriver aussi jusqu'à un certain point , si l'on fait l'expérience dans un canon de fusil , dont j'ai communément fait usage (parce que c'est le procédé le plus facile , & à bien des égards , le plus commode) , toutes les fois qu'il étoit suffisamment exact pour mes vues ; ce qui arrivoit le plus souvent.

La raison de cet effet , c'est que si la production de l'air n'est pas très-rapide , il y aura assez de tems pour que le phlogistique se dégage du fer même & se mêle avec l'air. Effectivement , je n'ai presque jamais manqué de trouver , que lorsque je tâchois de retirer autant d'air qu'il m'étoit possible d'une quantité de matériaux , & que j'en recevois le produit à différentes fois , comme je l'ai toujours fait pour plus grande exactitude , le dernier étoit inférieur en pureté à celui qui étoit venu le premier ; c'étoit même assez souvent de l'air phlogistiqué , c'est-

à-dire , de l'air assez chargé de phlogistique pour être parfaitement nuisible ; & quelquefois , comme le Lecteur verra dans la section suivante , c'étoit même de l'air nitreux.

Par la même raison , il arrivoit fréquemment que lorsque j'appliquois un degré de chaleur considérable , le minium que j'employois dans ces expériences se réduisoit en vrai plomb , dont il étoit souvent très-difficile de dépouiller entièrement le canon du fusil.

La phlogistication dépend aussi en grande partie , des ingrédiens qu'on a employés dans le même canon du fusil , pour des expériences précédentes ; car il n'est pas aisé de nettoyer parfaitement cet instrument de toutes les matieres qu'on y a mises. Et quoiqu'on puisse présumer en général que toute espece d'air sera chassée de ces ingrédiens , si l'on fait rougir le tuyau ; les matieres qui contiennent beaucoup de phlogistique , comme le charbon , &c. ne s'en séparent point , en conséquence de l'application de la chaleur , à moins qu'il n'y ait à portée quelque autre substance avec laquelle il puisse se combiner. Ainsi

donc, quoiqu'on laisse long-tems dans le feu un canon de fusil qui contient de ces petites parcelles de charbon, dont on n'a pu le nettoyer parfaitement : on a beau le faire rougir avec son embouchure toute ouverte ; s'il est d'une longueur considérable, il peut y rester quelque partie du charbon qui ne soit pas consumée, & dont l'effet se fasse sentir dans l'expérience subséquente. J'en ai eu la preuve suivante, qui ne laisse rien à desirer.

J'avois envie de montrer à quelques-uns de mes amis la production actuelle de l'air déphlogistiqué, & n'ayant point d'autre appareil à portée, j'eus recours à mon canon de fusil. Mais je les avertis que comme je m'en étois servi le jour précédent pour tirer de l'air du charbon, dont je l'avois rempli à ce dessein ; il en resteroit probablement encore tant, quoique j'eusse pris toute la peine possible pour le faire sortir, que je ne pouvois pas compter que l'air que j'obtiendrois fût déphlogistiqué ; mais qu'il seroit sans doute d'une qualité inférieure, & peut-être même de l'air nitreux. Y ayant mis en conséquence, un mélange
d'esprit

d'esprit de nitre & de minium (ce minium faisoit partie d'une quantité dont je m'étois souvent servi pour le même dessein) séché & pulvérisé ; je le mis dans le feu , & je reçus l'air dans l'eau.

Le premier produit , qui fut d'environ une chopine , étoit nitreux au point, que deux parties d'air commun & une de cet air n'occupèrent que l'espace d'un peu plus de deux parties ; c'est-à-dire , qu'il étoit presque aussi fortement nitreux que celui que produit la dissolution des métaux dans l'esprit de nitre. La seconde chopine différoit très-peu de l'air commun , & le dernier produit fut encore meilleur , & plus de deux fois aussi bon que l'air commun. Il faut donc , si l'on se propose de faire de l'air déphlogistiqué en grande quantité , avoir un appareil approprié à ce dessein ; & prendre le plus grand soin de tenir les instrumens aussi exempts qu'il est possible de toute matiere phlogistique , qui est le poison de la pureté de l'air , laquelle est toujours en raison inverse du phlogistique qu'il contient.

L'hypothèse établie dans cette Sec-

D

tion , que l'air atmosphérique est composé d'acide nitreux & de terre , s'accorde parfaitement avec les faits relatifs à la production du nitre : car il n'est jamais produit qu'à l'air libre , auquel on expose telles sortes de terres , qu'on fait qui ont de l'affinité avec l'acide nitreux ; en sorte que c'est par leur union que se forme le nitre ordinaire.

Les Chymistes ont supposé jusqu'ici , que cet acide nitreux , par lequel le nitre commun est formé , existe dans l'atmosphère comme une *substance étrangère* , de la même manière que l'eau & un grand nombre d'autres substances , qui y flottent sous la forme d'effluves. Mais puisqu'il n'est aucun lieu où l'on ne puisse faire du nitre , on peut , je pense , supposer avec plus de probabilité , suivant mon hypothèse , que le nitre est formé par une *décomposition réelle de l'air même* : les bases qu'on lui présente ayant , dans ces circonstances , une plus forte affinité avec l'esprit de nitre , que l'espece de terre à laquelle il est uni dans l'atmosphère.

Ma théorie fournit aussi une solution

aisée d'un problème , qui a toujours fort embarrassé les Chymistes. Il est question de savoir ce que devient l'acide nitreux dans la *détonation du nitre*. Maintenant l'opinion générale , & je crois même universelle , est que cet acide est *détruit* , c'est-à-dire , qu'il est véritablement décomposé & résous en ses élémens primordiaux que Stahl supposoit être la terre & l'eau. Quant à moi , je suppose que si les propriétés ordinaires de l'acide comme combiné avec l'eau , disparoissent , c'est seulement en conséquence de sa combinaison avec quelque matière terreuse ou inflammable , avec laquelle il forme quelque une des nombreuses especes d'airs que ce merveilleux acide concourt à former. Il peut donc produire , dans cette circonstance , ou de l'air commun , ou de l'air déphlogistiqué , ou de l'air nitreux , ou quelques-unes des autres especes d'airs dont je donnerai le détail dans une section subséquente. Que ce soit réellement l'acide nitreux , quoique si bien déguisé par son union avec des matières terreuses ou autres , c'est ce qui ne paroîtra pas extraordinaire à quiconque fera attention com-

bien peu l'acide vitriolique est apparent dans le soufre ordinaire.

A l'égard du *mercure calciné* & du *minium*, leur couleur rouge favorise l'hypothèse qui suppose qu'ils ont extrait l'esprit de nitre de l'air.

SECTION IV.

Détail plus circonstancié de quelques procédés pour la production de l'air déphlogistiqué,

JE ne puis promettre beaucoup de plaisir, dans la lecture de cette section, à ceux de mes Lecteurs dont l'objet n'est rien de plus que de prendre une connoissance générale du sujet de cet Ouvrage ; car elle ne consistera, pour la plus grande partie, qu'en un détail aride de procédés pour obtenir l'air déphlogistiqué. Mais comme ils m'ont paru nécessaires pour compléter mes observations sur cette matière, je ne doute pas que les personnes disposées à poursuivre cette recherche, ne retirent quelque avan-

tage de l'attention qu'elles y donneront. J'aurois pu me contenter de présenter une idée générale du résultat de ces expériences ; mais ç'auroit été mêler mes propres *opinions* avec les *faits*, de telle maniere que le Lecteur n'auroit pas été en état de les distinguer ; au lieu que si je me suis trompé dans quelques-unes de mes opinions, le Lecteur ayant sous ses yeux tous les faits sur lesquels elles sont fondées, sera en état de rectifier mes méprises, & d'empêcher l'erreur de se répandre.

Comme j'avois eu des raisons suffisantes pour conclure que l'air respirable est composé d'acide nitreux & de terre, mon objet dans toute cette suite d'expériences fut simplement de trouver *quelle espece de terre* avoit le plus d'aptitude à former cette union particuliere avec l'acide nitreux. Tout considéré, je pense qu'il paroîtra que les *terres métalliques* exemptes de phlogistique, sont les plus propres à cet effet, & après celles-ci, les terres *calcaires* ; mais qu'il y a, dans la production de cette espece d'air, de très-grandes différences qui dépen-

dent des diverses circonstances dans lesquelles on fait les expériences.

J'ai observé que le *minium*, par le moyen de la chaleur sans aucune addition, donne de l'air déphlogistiqué. Pour donner quelque idée des différences qui se trouvent dans les résultats de ce qui, en apparence, est la même préparation, & faire voir l'effet de l'addition de l'esprit de nitre au minium : je dois informer mon Lecteur qu'ayant pesé séparément deux demi-onces de la même partie de minium, j'en mis une sans aucune addition dans le canon de fusil ; & avec un feu très-précipité (ce qui est, en général, un avantage considérable pour la production de l'air), je n'obtins pas plus de trois mesures d'air très-peu meilleur que l'air commun.

J'humectai la seconde demi-once avec de l'esprit de nitre très-affoibli, & lorsqu'elle fut séchée & pilée, je la mis dans le même canon de fusil. J'en obtins, en la traitant de la même façon que la première, environ trois chopines d'air, dont la première portion étoit si déphlogistiquée, que deux parties de cet air &

cinq d'air nitreux n'occupèrent que l'espace de deux parties. De la seconde portion, deux parties ne furent point augmentées par l'addition de sept parties d'air nitreux; c'étoit l'air le plus pur que j'eusse jamais vu. Le dernier produit fut presque tout de pur air fixe, nullement affecté par l'air nitreux, éteignant la chandelle & précipitant la chaux de l'eau de chaux. A la vérité, il tenoit un peu de l'air nitreux; car il diminuoit l'air commun à un foible degré, ce que j'attribue au phlogistique qu'il avoit emprunté du fer.

La *précipitation* avec laquelle on applique le même degré de chaleur occasionne, ainsi que je viens de le dire en passant, (& comme je l'ai observé dans mon premier volume, relativement à l'air inflammable) une différence remarquable dans la quantité du produit de cette espèce d'air. Le fait suivant est à cet égard, d'autant plus digne d'attention, que j'y donnai tout le soin possible. J'obtins d'une once de minium, par une chaleur subite & vive, au-delà de deux pintes d'air, dont une grande partie étoit de l'air fixe, & le reste étoit de

l'air environ deux fois aussi bon que l'air commun ; & immédiatement après , ayant mis une égale quantité de la même partie de minium dans le même canon de fusil , je n'obtins par une chaleur *très - lentement appliquée* , mais poussée violemment à la fin , pas plus de deux mesures d'air , dont une grande partie étoit de l'air fixe , & le reste n'étoit pas aussi bon que l'air commun.

J'avois ouï dire que le minium acqueroit une augmentation de poids par des lavages réitérés dans l'eau. Ayant dessein d'éprouver si le fait étoit vrai , & si le minium ne devoit pas à un semblable moyen sa propriété de donner de l'air déphlogistiqué , je lavai une quantité de cette partie de minium récent dont j'ai parlé , dans de l'eau distillée , & je l'évaporai à siccité ; je répétai quatre fois cette opération ; mais il ne donna pas plus d'air qu'avant d'avoir été mouillé , & il n'augmenta point du tout de poids par ce procédé.

J'ai observé en général que les substances exemptes de phlogistique , qui donnent de l'air fixe par le moyen de la chaleur ou par l'intermede d'un

acide , fournissent plus ou moins d'air déphlogistiqué lorsqu'on les pétrit avec l'esprit de nitre , & qu'on les traite comme ci-dessus ; mais communément cet air est mêlé avec de l'air fixe ; & j'avoue que j'ignore d'où dépend la proportion de ces deux espèces d'air.

À un très-petit degré de chaleur , le *blanc de plomb* , sans aucune addition , donne une très-grande quantité de pur air fixe. Ayant humecté environ une mesure de cette substance avec de l'esprit de nitre , & l'ayant mise dans un vaisseau de verre à bouchon de crystal tubulé ; j'en tirai , à cinq différentes fois , cinq chopines d'air que j'examinai séparément comme à l'ordinaire , & les résultats furent comme il suit :

De la première chopine , il y eut environ dix-neuf vingtièmes , ou vingt-neuf trentièmes d'absorbés par l'eau , & le restant n'affecta l'air commun , ni ne fut affecté par l'air nitreux ; enforte que le premier produit étoit de pur air fixe ; & en ayant égard à la quantité que l'eau dans laquelle je l'avois reçu & laissé , avant de le soumettre à l'examen , avoir dû en absorber , on doit peut-être le re-

garder comme aussi exempt de mélange étranger qu'aucun air fixe que j'eusse jamais obtenu. De la seconde chopine, le résidu que l'eau n'absorba pas, faisoit environ le double du précédent, & parut être de l'air déphlogistiqué; il prit environ une égale quantité d'air nitreux pour se saturer; & conséquemment il étoit à-peu-près deux fois aussi bon que l'air commun. De la troisième chopine, l'eau en absorba autant que de la première; mais le résidu étoit aussi bon que celui de la seconde. De la quatrième, il en resta un quart que l'eau n'absorba point, & qui prit un & trois quarts d'air nitreux pour se saturer. De la cinquième chopine, il en resta la moitié qui ne fût point absorbé; & il fallut plus de deux parties égales d'air nitreux pour la saturer; en sorte que c'étoit de l'air près de quatre fois aussi pur que l'air commun. Enfin une seule mesure, qui vint très-lentement après ces cinq portions, ne fut point du tout absorbée par l'eau: c'étoit de l'air environ trois fois aussi pur que l'air commun, car il fallut un & demi d'air nitreux pour le saturer.

Ayant mis dans un canon de fusil

une quantité de *litharge* humectée avec de l'esprit de nitre , & séchée , j'en obtins une grande quantité d'air , dont environ la moitié étoit de l'air fixe précipitant la chaux de l'eau de chaux : & l'autre moitié étoit fortement nitreuse. Mais avec une lentille ardente , je tirai de l'air déphlogistiqué très-pur , de ce mélange de litharge & d'esprit de nitre placé dans le mercure.

J'avois dessein de soumettre successivement à l'expérience les différentes préparations du plomb ; je pris à cet effet une demi-once de *mine de plomb* , & l'ayant saturée avec de l'esprit de nitre , je la séchai comme ci-dessus ; je la mis dans un canon de fusil que j'achevai de remplir jusqu'à la bouche avec du caillou pulvérisé , & je plaçai des vaisseaux remplis d'eau pour recevoir le produit. Aussi-tôt que ce mélange commença à sentir la chaleur , l'air fut produit avec une si grande rapidité , que de crainte d'accident , je me tins de côté. Tout-à-coup , il se fit avec fracas une explosion violente , par laquelle tout ce qui étoit contenu dans le canon fut rejeté avec grande force ,

mit en pieces les vaisseaux que j'avois préparés pour recevoir l'air, & en dispersa les éclats par tout l'appartement. Enforte que tout l'air que j'avois ramassé, & qui faisoit environ une chopine, fut perdu. Le mélange, avant que je le misse dans le canon, étoit d'une couleur tenant le milieu entre le blanc & le jaune, & avoit beaucoup de l'odeur du soufre : c'étoit dans le fait une composition analogue à la poudre à tirer.

Ayant envie de savoir quelle espece d'air j'avois obtenue par ce procédé, je mis de semblables matériaux dans une phiole de verre que je plaçai dans un creuset avec du sable, & je disposai l'appareil pour recevoir l'air, de maniere qu'il fût hors de la portée de l'explosion. Elle se fit comme auparavant, & l'air fut épargné. C'étoit de l'air nitreux très-fort; il l'étoit presque autant que celui qu'on obtient par la dissolution des métaux.

Je traitai de la même maniere la *chaux grise de plomb*, & j'en obtins environ une chopine d'air, dont la moitié que l'eau absorba promptement étoit assuré-

ment de l'air fixe ; mais le restant étoit fortement nitreux ; & si je ne l'eusse pas beaucoup lavé dans de l'eau , il auroit probablement été aussi fort que celui qu'on tire des métaux.

Les *fleurs de zinc* humectées , comme dans les autres procédés , avec de l'esprit de nitre , & mises dans une phiole de verre à bouchon de crystal tubulé , me donnerent l'air le plus pur que j'aie jamais obtenu. Je désespérai d'abord absolument d'obtenir de l'air par ce procédé ; mais il vint enfin comme un torrent , & il étoit si nébuleux que chaque bulle d'air qui crevoit à la surface de l'eau , après l'avoir traversée , présentoit l'image d'un sac de fleur de farine qui se creve. Le tube par lequel l'air passoit étoit excessivement rouge , & l'intérieur du récipient l'étoit aussi à un certain point , autant qu'on pouvoit s'en appercevoir à travers le nuage épais dont il étoit rempli. J'ai souvent aperçu , dans le procédé sur le minium , cette nébulosité de l'air nouvellement produit ; mais jamais à un degré aussi considérable que dans le cas présent.

La quantité d'air que j'obtins d'envi-

ron une demi-mesure de fleurs de zinc , fut de près de trois chopines ; & il étoit si fort déphlogistiqué , qu'il prit trois fois son volume d'air nitreux avant de recevoir de l'accroissement dans ses dimensions. Lorsqu'il eut reçu seulement deux fois son volume d'air nitreux , il fut réduit à moins d'un cinquieme de sa quantité primitive. Le dernier produit vint très-lentement , & il n'étoit pas tout-à-fait aussi pur. J'avois acheté chez le Docteur Higgins , les fleurs de zinc que j'employai dans cette expérience ; elles formoient , après avoir été humectées avec de l'esprit de nitre , & séchées , une substance très-dure & très-cassante , qui après le procédé s'enfla & brisa la phiole en mille pieces.

De toutes les autres terres métalliques , je ne soumis à l'expérience que *la rouille de fer & l'arsenic blanc* , qui traités comme ci-dessus , & mis dans un canon de fusil , ne donnerent rien que de l'air fixe ou de l'air nitreux ; en sorte que ces chaux contiennent indubitablement beaucoup de phlogistique , au lieu que les fleurs de zinc n'en contiennent peut-être point du tout.

Beaucoup moins de demi-once de rouille de fer humectée avec de l'esprit de nitre , & séchée , me donna environ une pinte d'air , dont le tiers , ou à peu près , étoit de l'air fixe qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux , &c. & le restant étoit nitreux au point , que deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de moins de deux parties.

J'achetai l'*arsenic blanc* chez le Docteur Higgins , qui m'assura qu'il contenoit le moins de phlogistique possible. J'en humectai environ une mesure avec de l'esprit de nitre , & l'ayant mis dans une phiole à bouchon de crystal tubulé , j'en tirai , à un degré de chaleur médiocre , quatre mesures d'air qui étoit aussi fortement nitreux qu'aucun que j'eusse jamais tiré des métaux. J'augmentai la chaleur jusqu'à faire fondre la phiole ; mais je n'obtins pas plus d'air. Le tube étoit excessivement rouge pendant le passage de l'air.

J'ai trouvé que les terres calcaires , après les terres métalliques du plomb & du zinc , sont les plus propres à la production de l'air déphlogistiqué ; mais je

n'ai pas eu occasion d'en éprouver un grand nombre : celle que j'ai trouvée la meilleure est la *craie*. J'en faturai une demi-once avec de l'esprit de nitre affoibli, & l'ayant séchée & mise dans un canon de fusil, j'en obtins plus d'une chopine d'air qui étoit considérablement déphlogistiqué. Je commençai à recevoir le produit dans le mercure : d'où il arriva que l'acide nitreux survenant sous forme de vapeur attaqua le mercure, & produisit de l'air nitreux. Mais une croûte qui se forma sur le mercure empêcha qu'il n'y en eût davantage de dissous, & l'air demeura long-tems rouge.

Une autre mesure de craie traitée de la même façon me donna environ une pinte d'air. La première portion que je recueillis étoit considérablement nitreuse; car deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de deux & demie. La seconde portion étoit déphlogistiquée; en sorte que deux parties de cet air & cinq d'air nitreux, n'occupèrent que l'espace de deux parties. La dernière portion fut moins déphlogistiquée, c'étoit de l'air à peu-près

de moitié meilleur que l'air commun. Dans cette dernière période du procédé, l'air étoit produit avec une rapidité prodigieuse ; le tube de verre par lequel il passoit étoit excessivement rouge, & lorsqu'il s'échappoit de la vapeur en l'air pendant que je changeois les vaisseaux, elle avoit la couleur la plus rouge que j'eusse jamais vue dans des expériences de cette nature.

Je saturai une demi-once d'excellente *chaux vive*, avec de l'esprit de nitre délayé : l'ayant séchée & mise dans un canon de fusil, j'en obtins environ une chopine & demie d'air, dont la première portion étoit si déphlogistiquée, qu'il falloit un égal volume d'air nitreux pour la saturer. La seconde ne fut pas meilleure que l'air commun, & la troisième fut égale à la première. Dans ce procédé la production de l'air fut très-irrégulière ; il venoit quelquefois en grande quantité, & d'autres fois l'eau rentroit dans le tube.

Je répétois cette expérience dans une phiole de verre à bouchon tubulé, & la quantité entière du produit fut si pure, qu'il fallut deux fois son volume d'air

nitreux pour la saturer. L'air fut produit aussi irrégulièrement dans cette expérience que dans la précédente. J'aurois désiré de traiter de la même manière la pierre dont on fait cette chaux, mais je n'en eus pas l'occasion.

La *chaux éteinte à l'air*, humectée avec l'esprit de nitre, & traitée comme ci-dessus dans un canon de fusil, me donna, à un feu poussé très-vivement, près d'une chopine d'air, dont la plus grande partie vint très-rapidement; & il étoit si déphlogistiqué, que pour en saturer deux parties, il fallut cinq parties d'air nitreux. Le dernier produit vint très-lentement, & il étoit nitreux au point que deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de moins de deux; c'est-à-dire qu'il étoit, à très-peu de chose près, parfaitement nitreux.

J'humectai aussi avec de l'esprit de nitre une quantité de *chaux qu'on avoit plongée dans l'eau*, pour faire de l'eau de chaux. Je la mis dans un canon de fusil, & j'en tirai de l'air qui vint très-irrégulièrement, comme ci-dessus. Une portion de cet air, qui s'éleva presque

tout d'un coup, étoit tellement déphlogistiquée, que deux parties de cet air & cinq d'air nitreux occuperent l'espace de deux & demie.

Deux mesures de *marbre* pulvérisé, & traité comme ci-dessus dans un canon de fusil, me fournirent environ trois pintes d'air, dont une très-grande partie étoit de l'air fixe, sur-tout le dernier produit, qui n'étoit presque pas autre chose. Mais vers le commencement du procédé, le résidu étoit un peu meilleur que l'air commun.

Ayant répété cette expérience dans une phiole de verre à bouchon tubulé, je tirai d'une mesure de marbre pulvérisé environ une pinte d'air, dont la plus grande partie étoit si considérablement déphlogistiquée, qu'il fallut près de trois fois son volume d'air nitreux pour la saturer; & même j'avois peine à distinguer le dernier produit du premier. Ce qui resta dans la phiole, après l'expérience, se gonfla & la brisa.

La *magnésie* calcinée & celle qui ne l'est point, traitées dans un canon de fusil, me donnerent une quantité d'air considérable. Celui de la *magnésie* cal-

cinée n'étoit pas beaucoup meilleur que l'air commun , & celui de l'autre étoit plus de deux fois aussi bon. Mais il se peut très-bien que cette différence ne soit pas invariable.

Je crois très-probable, que l'on peut obtenir de l'air déphlogistiqué de toutes les especes de terres en y ajoutant de l'esprit de nitre, sur-tout si elles sont déjà combinées avec l'air fixe ou avec l'air alkalin ; enforte que l'esprit de nitre doive chasser l'un ou l'autre de ces airs , avant de pouvoir s'incorporer avec elles. Parmi les substances de ce genre , outre celles dont j'ai fait mention , j'ai éprouvé le *sel de tartre* & la *cendre de bois*.

Ayant mis dans un canon de fusil demi-once de *sel de tartre* humecté avec de l'esprit de nitre fumant, & desséché, j'en obtins environ une demichopine d'air , dont la plus grande partie étoit de l'air fixe , avec un résidu si déphlogistiqué , qu'il étoit environ trois fois aussi bon que l'air commun. La production de l'air , dans cette expérience , ne fut pas très-rapide , & elle dura longtemps. J'en aurois pu recueillir davantage.

ge; car il s'en échappa une partie pendant que je luttois les vaisseaux.

J'humectai avec de fort esprit de nitre fumant, environ une demi-mesure de *cendre de bois* brûlé avec soin dans une cuiller de fer, & ensuite dans un creuset; & par le procédé du canon de fusil, j'en obtins environ trois chopines d'air, dont une partie étoit de l'air fixe précipitant la chaux de l'eau de chaux, &c. & le reste étoit si pur, qu'il absorba près de trois fois son volume d'air nitreux. Le dernier produit fut très-lent; il n'étoit qu'environ deux fois aussi bon que l'air commun.

Une mesure de *cendre de charbon fossile* brûlé avec tout le soin possible, traitée de la même manière, produisit environ trois pintes d'air, dont un tiers étoit de l'air fixe précipitant la chaux de l'eau de chaux; mais le résidu étoit fortement nitreux, sur-tout vers la fin du procédé. La couleur obscure dont, à ce que je crois, aucune calcination ne peut dépouiller la cendre de charbon fossile, fait assez présumer qu'elle contient en général plus de phlogistique que la cendre de bois.

N. B. On observera que dans ce procédé & dans plusieurs autres , j'ai obtenu de l'air fixe de bien des substances , dans lesquelles il est difficile de supposer qu'il existât avant le procédé. Ce qui fournit une présomption que l'air fixe n'est pas un acide *sui generis* , mais une modification de l'acide nitreux.

L'*argile* est une substance tout-à-fait différente de la terre calcaire ; & je ne crois pas qu'on ait supposé qu'elle contienne aucune espece d'air. Je me fournis chez le Docteur Higgins , d'une quantité d'argile en poudre , de l'espece qu'on appelle *terre à pipes* , & qui , je crois , est la plus pure de toutes. Et l'ayant humectée avec de l'esprit de nitre , j'observai qu'elle ne produisit pas plus de chaleur , ni d'effervescence que si je l'eusse mêlée avec de l'eau.

Lorsqu'elle fut sèche , je la mis dans un canon de fusil , & j'en tirai , par une forte chaleur , environ deux mesures d'air , qui fut assez promptement absorbé par l'eau , qui n'affecta point l'air commun , qui ne fut point affecté par l'air nitreux , & qui éteignit la chandelle ; d'où je conclus que c'étoit de l'air fixe.

Ayant répété cette expérience , j'eus le même produit , & j'observai seulement de plus , que cet air fixe troubla l'eau de chaux ; preuve , à mon avis , la plus sûre de la présence de l'air fixe. Le dernier produit étoit fortement nitreux. M'imaginant que ce produit pouvoit devoir sa qualité au phlogistique du fer , je résolus de répéter l'expérience encore une fois , avec tout le soin possible , dans une phiole de verre à bouchon tubulé.

Je l'exécutai , & j'eus soin de recevoir le produit à huit différentes fois. Les première & seconde portions contenoient une bonne quantité d'air fixe. Le résidu de la première fut un peu diminué par l'air nitreux , à peu-près autant que de l'air commun dans lequel une chandelle a brûlé jusqu'à extinction. Ce résidu pouvoit être composé en partie de l'air commun contenu dans la phiole. Le résidu de la seconde portion diminua un peu l'air commun , enforte que deux parties d'air commun , & une de celui-ci , occuperent l'espace de deux & un tiers. Il fallut trois parties d'air nitreux pour en saturer deux de la troisième portion , enforte que c'étoit de

l'air assez déphlogistiqué. Deux parties de la quatrième portion , & trois d'air nitreux , occuperent l'espace d'une partie & trois quarts. La cinquième portion étoit de la même qualité que la troisième. La sixième exigea deux fois sa quantité d'air nitreux pour se saturer. La septième n'étoit pas tout-à-fait aussi pure que la sixième. Enfin , la huitième n'affecta l'air commun , ni ne fût affectée par l'air nitreux. C'étoit ce que j'appelle *de l'air phlogistiqué*. Quant à l'air nitreux qui se trouva parmi ces produits , il est évident que le phlogistique nécessaire pour le composer provenoit de l'argile , & non pas du vaisseau qui la contenoit , puisqu'il étoit de verre.

Ayant à ma disposition une quantité d'*argile de Stourbridge* ; j'eus la curiosité de la soumettre aux mêmes expériences , pour voir si elle donneroit quelque différence essentielle dans le résultat. Je me servis du canon de fusil , & je reçus l'air en quatre portions. La première fut de l'air fixe qui troubloit l'eau de chaux , & dont l'eau absorba plus de la moitié. La seconde étoit à
peu-près

peu-près aussi bonne que l'air commun ; & la quatrième étoit considérablement nitreuse.

Pour éviter ensuite l'effet du canon de fusil , je mis l'argile dans une phiole à bouchon de crystal tubulé , & l'ayant mise au feu de sable , je reçus l'air , pour plus grande exactitude , en dix portions séparées , d'environ une demi-mesure chacune. La première fut à demi-absorbée par l'eau , & le résidu étoit si nitreux , que deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de deux & demie ; les seconde & troisième portions étoient presque entièrement de l'air fixe , qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux , & qui n'affectoit point du tout l'air commun , ni n'étoit affecté par l'air nitreux. Je n'ai conservé aucun détail de la quatrième. La cinquième portion d'air étoit si déphlogistiquée , que deux parties de cet air & trois d'air nitreux occuperent l'espace de deux & demie. Les sixième & septième produits étoient aussi approchans qu'il est possible de l'air commun. Le neuvième étoit si nitreux , que deux parties d'air commun & une de cet air occu-

perent l'espace de deux & demie; & la dixieme diminua l'air commun à un moindre degré.

Il est évident, par ce procédé, que le phlogistique étoit contenu dans l'argile, dont il s'est dégagé à différentes fois, selon que la chaleur affectoit différentes parties du mélange. Si le produit entier eût été reçu tout ensemble, il auroit été à peu-près dans l'état de l'air commun mêlé avec l'air fixe. Ce qui montre combien il est important de recevoir les produits dans différens vaisseaux, & de les examiner séparément. C'est une pratique à laquelle le Lecteur trouvera qu'il m'a été souvent très-avantageux d'avoir recours.

Je voulois savoir quel seroit l'effet d'une plus grande chaleur sur cette même argile; mais comme on ne peut appliquer un degré de chaleur très-considérable à une substance contenue dans un vaisseau de verre, sans le fondre: lorsque l'expérience précédente fut finie, je retirai l'argile de la phiole, & je la mis dans un canon de fusil; j'en retirai une quantité considérable d'air, dont une partie étoit de l'air fixe qui

précipitoit la chaux de l'eau de chaux , & le restant ressembloit au résidu de l'air fixe ; ou bien c'étoit de l'air commun phlogistiqué , qui éteignoit une chandelle , n'étoit point affecté par l'air nitreux , & n'affectoit pas l'air commun. Je fis la même opération sur la *terre à pipes* qui étoit restée après l'expérience rapportée plus haut , & j'eus à peu près le même résultat. Le premier produit étoit du même degré de pureté que l'air commun , & le suivant fut un peu affecté par l'air nitreux.

Je me procurai une quantité de *gypse* en poudre , & j'en tirai de l'air fixe par le moyen du canon de fusil ; l'ayant ensuite humecté avec de l'esprit de nitre , j'en obtins , par le même procédé , un peu d'air fixe , avec une grande portion d'air nitreux presque aussi fort qu'il puisse l'être. Mais soupçonnant que ce gypse n'étoit pas pur , j'en pris chez le Docteur Higgins un morceau de l'espece dont on fait le plus beau plâtre ; & l'ayant mêlé avec de l'esprit de nitre , j'en tirai une quantité considérable d'air , dont une partie étoit de l'air fixe , & le restant éteignoit une chandelle , n'af-

toit pas l'air commun, & n'étoit point affecté par l'air nitreux. A la fin du procédé, il vint de l'air nitreux, produit, à ce que je présume, par le canon de fusil.

Ayant lieu d'être surpris que cette espece de terre, qui paroissoit très-exempte de phlogistique, ne donnât pas de l'air de meilleure qualité, je répétai cette expérience, en observant de recevoir le produit d'air à différentes fois, comme dans les expériences précédentes, & d'humecter la terre avec de l'esprit de nitre plus fort; & au lieu du canon de fusil, je me servis de la phiole à bouchon de crystal tubulé. La quantité d'air que j'obtins d'une mesure de ce plâtre, par ce procédé, fut d'environ deux mesures que je reçus en quatre différentes portions.

La premiere fut un peu diminuée par l'air nitreux: je suppose que c'étoit, en grande partie, l'air commun qui pouvoit être encore resté dans la phiole. La seconde étoit de l'air nitreux assez fort, provenant peut-être de quelque matiere phlogistique qui s'étoit mêlée acciden-

tellement avec les ingrédiens ; je suis d'autant plus porté à le croire , que les troisieme & quatrieme produits étoient si déphlogistiqués , qu'une partie de chacun des deux , prit cinq parties d'air nitreux pour se saturer ; de telle sorte qu'ils étoient , l'un & l'autre , quatre fois aussi bons que l'air commun.

Après les expériences précédentes , il ne restoit plus à essayer que les *terres cristallines* , & les *talcs* qui en diffèrent essentiellement. Les unes & les autres , lorsque je les traitai de la même manière que les terres dont j'ai déjà parlé , donnerent aussi de l'air déphlogistiqué ; mais en très - petite quantité.

Je pris des *cailloux* communs , tels qu'on les tire du sein de la terre , partie blancs , partie noirs ; je les mis en poudre , je les humectai avec de l'esprit de nitre , comme ci-dessus , & par le moyen du canon de fusil , j'en obtins de l'air fixe , avec une grande portion d'air nitreux. Le produit que je reçus le premier étoit semblable au résidu de l'air fixe ; il éteignoit une chandelle ,

& l'eau ne l'abforboit pas avec promptitude.

Après avoir fait cette expérience, je pris chez le Docteur Higgins des *cailloux calcinés avec soin dans les vaisseaux fermés*, & en ayant mis en poudre une quantité que j'humectai avec de l'esprit de nitre, je la mis dans une phiole de verre à bouchon de crystal tubulé. Je n'y appliquai d'abord que la flamme d'une chandelle, & l'air que j'obtins fut en très-petite quantité; mais il précipita la chaux de l'eau de chaux, & diminua un peu l'air commun.

Je mis ensuite le même appareil au feu de sable, & j'obtins, en tout, autant d'air que deux fois le volume des matériaux. Une partie de cet air précipita la chaux de l'eau de chaux; mais le reste se trouva considérablement meilleur que l'air commun; & le dernier produit étoit si bon que pour en saturer une partie, il fallut deux parties d'air nitreux.

De peur que cet air ne fût provenu de quelque matiere étrangere, mêlée avec la poudre de cailloux, je mis de

nouvel esprit de nitre sur les mêmes matériaux , sans les sortir de la phiole (après que j'eus observé qu'ils ne donnoient plus d'air par le premier procédé), & je replaçai la phiole au même bain de sable. L'air qui s'éleva au commencement de ce second procédé ne fut que peu diminué par l'air nitreux ; mais quant au reste, je n'avois jamais obtenu d'air plus pur. La quantité du produit n'excéda cependant pas le volume des matériaux.

N. B. Dans cette expérience, lorsque les bulles d'air crevoient après avoir passé à travers l'eau, il en sortoit un nuage blanchâtre : de même que dans la production rapide de l'air nitreux, & dans celle de l'air déphlogistiqué tiré des fleurs de zinc, dont j'ai fait mention ci-dessus ; mais c'étoit à un degré beaucoup moindre.

Je répétois le même procédé jusqu'à six fois, remettant de l'esprit de nitre sur les mêmes matériaux, sans les sortir de la phiole ; mais le résultat fut toujours le même. Le premier produit étoit toujours de l'air phlogistiqué ; & après un intervalle, pendant lequel il ne ve-

noit rien que la pure vapeur de l'esprit de nitre , le restant étoit l'air déphlogistiqué dont j'ai parlé ci-dessus.

Pour rendre complete cette suite d'expériences , je mis , en dernier lieu , de fort esprit de nitre dans une phiole remplie de *talc de Moscovie* transparent, tel que celui dont se servent les Opticiens , pour arrêter les objets microscopiques. Dans ce procédé tout réussit de même qu'avec les cailloux calcinés. Le premier produit fut de l'air phlogistiqué , ou de telle qualité qu'il n'affectoit l'air commun ni n'étoit affecté par l'air nitreux. Ensuite vint la pure vapeur de l'esprit de nitre ; & enfin , environ une mesure d'air qui étoit à peu-près cinq fois aussi bon que l'air commun. Les morceaux de talc , qui s'étoient trouvés contigus aux parois de la phiole , parurent un peu blanchis après cette expérience ; mais les autres semblerent n'avoir pas été affectés : ils étoient aussi transparens qu'auparavant , & d'un tissu aussi ferme ; mais en apparence plus flexible : enforte que ces morceaux , lorsqu'on les manioit tous ensemble , avoient le tact des barbes de plume.

Il est assez évident , par ces expériences , que toutes les especes de terres mêlées avec l'esprit de nitre peuvent produire de l'air déphlogistiqué : qu'elles ne diffèrent entr'elles , à cet égard , que du plus au moins , & que l'avantage est du côté des terres métalliques & des terres calcaires.

J'observerai que ce procédé semble fournir une pierre de touche assez exacte, & peut-être la plus exacte qu'on connoisse, de la présence du phlogistique dans les corps. Peut-être le concours d'une certaine portion de phlogistique est-il nécessaire à la production de toute espece d'air ; & probablement , l'acide nitreux contient lui-même toujours assez de phlogistique pour la production de l'air déphlogistiqué ; mais l'air nitreux contient tant de ce principe , que je ne crois pas qu'on puisse obtenir cet air , à moins que les matériaux mêmes ne contiennent une quantité considérable de phlogistique. Ainsi , je n'ai aucun doute que l'*arsenic blanc* , quoiqu'on puisse croire qu'il ne contient point du tout de phlogistique , n'en contienne réellement une grande quantité ; & d'un

autre côté, lorsqu'on obtient de l'air extrêmement déphlogistiqué, c'est, je pense, la preuve la plus satisfaisante que la substance dont on le tire ne contient point de phlogistique.

Je terminerai cette section par un détail de procédés, pour extraire de l'air pur de quelques substances, autres que le *minium* & le *mercure calciné*, sans y ajouter de l'esprit de nitre. Indépendamment du *salpêtre* ordinaire, qui contient, comme on fait, l'acide nitreux même, je n'ai trouvé que deux substances qui aient la propriété dont il est question : savoir, le *sel sédatif*, & le *vitriol Romain calciné légèrement*. J'avois acheté une quantité de ces deux substances chez le Docteur Higgins. J'en tirai l'air dans le mercure, par le moyen d'une lentille ardente.

Le *sel sédatif* n'est pas très-maniable dans ce procédé ; mais je vins à bout, non sans difficulté, d'en extraire une petite quantité d'air, dans lequel une chandelle brûloit comme dans l'air commun, & qui fut diminué autant que celui-ci par l'air nitreux. Une autre fois l'air que je tirai de cette substance ne

fut pas tout-à-fait autant diminué par l'air nitreux que l'air commun.

N. B. La quantité d'air fut toujours très-petite , n'excédant pas le volume des matériaux.

Je ne tirai aussi du *vitriol Romain* qu'une petite quantité d'air. Celui que j'en obtins la première fois fut diminué par l'air nitreux , exactement autant que l'air commun. Je répétai l'expérience, & l'air que j'en tirai alors essuya, de la part de l'air nitreux , une diminution beaucoup plus considérable. Le résultat de ces expériences me surprend d'autant plus , que dans bien des essais que j'ai faits dans les mêmes vues, je n'ai pu tirer d'aucune espèce de *vitriol factice* , calciné ou non calciné, de l'air semblable à celui dont je viens de parler. Il devoit certainement y avoir de l'acide nitreux dans ce vitriol Romain.

Les personnes qui ont lu mon premier volume doivent se rappeler, que je fus excessivement intrigué par les expériences que je fis pour extraire de l'air du *salpêtre* , dans un canon de fusil. Les résultats de ces expériences me parurent très-extraordinaires & bien di-

gnes d'attention , comme capables de conduire à des découvertes considérables. Voyez le premier volume , pages 204 & 205. Cette conjecture n'étoit pas sans fondemens : mais la méthode que j'employois alors pour extraire de l'air de cette substance , n'étoit pas capable de lui faire rendre son véritable produit ; & je n'en avois pas encore imaginé d'autre.

L'air que j'obtins d'abord permit à une chandelle de brûler avec une flamme très - forte , & avec pétillement. Aussi , quoiqu'une année entière de séjour dans l'eau l'eût rendu entièrement nuisible , l'agitation dans l'eau pure le rétablit parfaitement ; de telle sorte qu'une chandelle y brûla de nouveau. Je conjecturois alors que cet air étoit de *l'air nitreux phlogistique* ; mais à présent , je pense que ce devoit être de l'air déphlogistique , quoiqu'il eût été produit par le moyen du canon de fusil , dans lequel l'esprit de nitre en dissolvant le fer étoit très - capable de dépraver l'air ; ainsi que cela m'arriva quelque tems après , lorsque je répétai cette expérience ; car j'en ob-

tins de l'air qui éteignit une chandelle.

Je fus alors très-embarrassé pour expliquer cette différence entre les résultats de ce qui , en apparence , étoit la même expérience. Mais je n'en suis pas surpris maintenant ; je m'imagine que dans le premier cas , l'air fut produit très - rapidement , & que par conséquent l'esprit de nitre n'eut pas le tems d'agir sur le fer : en sorte que le salpêtre donna son produit naturel ; au lieu que dans le dernier cas , un mélange d'air nitreux , provenant de la dissolution du fer par l'acide nitreux dégagé du salpêtre , avoit entièrement dépravé l'air. J'avance ceci avec d'autant plus d'assurance , que j'ai trouvé que le salpêtre chauffé dans un vaisseau de verre donne de l'air déphlogistiqué très - pur : la terre propre du salpêtre & l'esprit de nitre qu'il contient étant apparemment capables de former , par le moyen de la chaleur , cette sorte d'union de ces deux principes qu'exige la constitution de l'air déphlogistiqué. C'est là , je pense , une circonstance assez remarquable.

Il n'est peut-être pas inutile d'observer, que je commençai mes expériences sur le nitre, dans le mercure; mais que l'air produit de cette manière étoit nitreux, à cause de la dissolution du mercure; ainsi qu'il l'avoit été, dans une autre occasion, à cause de la dissolution du fer par l'acide nitreux dégagé dans l'opération. Dans le cours de cette expérience, on voyoit sortir du nitre une vapeur blanche abondante, pareille à celle qui accompagne la production rapide de l'air nitreux tiré des métaux.

Lorsque j'eus recours à mes grands vaisseaux de verre *fig. d.*, j'employai une once de salpêtre pulvérisé; j'achevai de remplir le vaisseau jusqu'à l'orifice avec des cailloux en poudre, & je reçus le produit en neuf portions d'environ trois quarts de mesure chacune. Le premier produit ne fut pas tout-à-fait aussi bon que l'air commun. Le second fut du même degré de pureté que ce même air. Le troisième fut moins pur. Mais le quatrième étoit si déphlogistiqué, qu'une partie de cet air & deux d'air nitreux occu-

perent l'espace d'une partie moins un cinquieme. Le cinquieme produit fut encore meilleur; car une partie de cet air & deux d'air nitreux n'occupèrent que l'espace d'une demi-partie. Le neuvieme fut à peu-près du même degré de pureté; & les autres, à ce que je présume, n'en différoient pas beaucoup.

Ayant dessein de connoître l'espece d'air que produit l'explosion de la poudre à tirer, je mêlai pour cet effet d'égales quantités de soufre & de salpêtre, l'un & l'autre en poudre fine, & je les mis dans un grand vaisseau de verre. L'air fut produit très-rapidement & en abondance, & il étoit si fortement nitreux, que deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de deux & un quart. Or, puisque le produit d'air de l'esprit de nitre & du charbon est le même que celui dont il est question, on ne peut pas douter que l'explosion de la poudre à tirer, qui est composée de ces ingrédiens, ne produise aussi de l'air nitreux: l'esprit de nitre n'étant pas détruit, ou tellement décomposé, que sa nature acide lui soit enlevée; mais entrant seulement

dans la composition de cette espece d'air.

SECTION V.

Observations diverses sur les propriétés de l'air déphlogistiqué.

JE m'y suis pris de plusieurs différentes manieres pour déterminer la pésanteur spécifique de l'air déphlogistiqué, en pesant avec soin les matériaux ; avant & après la production de cet air. Cette méthode n'est point exacte, & j'en ai trouvé de meilleures dans la suite pour parvenir au même but ; mais cependant les expériences qu'elle occasionna peuvent mériter quelque attention.

Je mis dans un canon de fusil deux onces & quatre scrupules de minium ; j'en tirai vingt mesures d'air déphlogistiqué que je reçus dans l'eau ; & le résidu recueilli avec tout le soin que je pus y apporter pesoit une once seize scrupules dix-huit grains : enforte que

vingt mesures d'air devoient peser sept scrupules six grains ; ce qui est hors de toute proportion. Cette méthode doit donc être très-incertaine. D'ailleurs, dans cette supputation, je n'avois ni ne pouvois avoir égard à l'air fixe qui étoit sorti du minium, & qui est l'espece d'air la plus pesante que je connoisse. D'autres fois, en répétant la même expérience, j'ai opéré la réduction du minium.

Une seconde tentative me fit approcher un peu plus de la vérité. Je pesai une once de minium ; je l'humectai avec de l'esprit de nitre fumant, & le séchai. Il pesoit alors une once six scrupules douze grains. Je divisai la quantité entiere en deux portions égales ; j'en mis une dans un canon de fusil, pour en recueillir l'air, & l'autre dans un creuset que j'exposai au même degré de chaleur. La premiere donna de l'air dont il resta vingt-deux mesures, après que l'air fixe en eût été assez bien dégagé par le lavage. Il étoit environ cinq fois aussi bon que l'air commun. L'autre avoit perdu dix-neuf grains de poids ; enforte que les vingt-deux me-

fures d'air auroient pesé dix-neuf grains ; ce qui est certainement beaucoup trop : d'ailleurs , dans cette expérience comme dans la première , on ne pouvoit avoir égard à l'air fixe.

Voyant que ces méthodes manquoient d'exactitude , j'eus recours à celle qu'avoit employée M. Cavendish , pour peser l'air fixe & l'air inflammable. Elle est plus exacte que celle que j'avois employée auparavant vol. 1 , page 313 : c'étoit de remplir un flacon de Florence avec les différentes especes d'air , & de les peser avec le flacon ; parce que le flacon devant être rempli d'eau avant qu'on y mette l'air , on ne peut pas être sûr , quoiqu'on prenne toutes les précautions possibles , que l'eau en ait été également épuisée après chaque expérience. Sans cet inconvénient , il y auroit un avantage considérable dans cette méthode ; c'est qu'on connoîtroit exactement la quantité d'air. Mais quoique , dans la méthode de M. Cavendish , on manque de précision à cet égard , parce qu'on ne peut mesurer avec beaucoup d'exactitude le degré de distension dont la vessie est suscep-

tible ; cette circonstance est plus que contre - balancée par l'avantage de pouvoir changer l'air , en comprimant la vessie , sans la mouiller.

Je pris , en conséquence , un tube de verre d'environ neuf pouces de longueur , & je l'ajustai au col d'une vessie qui , avec le degré de distension que je pouvois lui donner en faisant cette expérience , contenoit cinquante-cinq mesures , ou un scrupule & neuf grains d'air commun. Ce tube étoit attaché de façon que je pouvois l'ôter à volonté. La vessie étant ainsi préparée , je la comprimais soigneusement. Ensuite je la remplissois , en partie , de l'air que je voulois peser ; je la comprimais de nouveau , & enfin je l'en remplissois entierement. Par ce moyen , j'étois assez sûr que l'air qui étoit dans la vessie étoit aussi exempt de mélange qu'il est possible. Je procédai de cette maniere pour peser *l'air déphlogistique* , & dans le même-tems , *l'air nitreux* & *l'air phlogistique* par la *limaille de fer* & le *soufre*. Je regarde ce dernier air , comme la même chose

que l'air phlogistique par tout autre procédé.

La table abrégée qui suit fait voir, d'un coup d'œil, le résultat de toutes ces expériences.

La vessie remplie d'air	<i>scrup.</i>	<i>gr.</i>
phlogistique, pefa	7	15.
nitreux,	7	16
commun,	7	17
déphlogistique,	7	19

Ce résultat s'accorde assez bien avec mes premières observations, quoiqu'elles n'eussent pas été faites avec autant d'exactitude: savoir, que l'air nitreux & l'air diminué par des procédés phlogistiques sont plus légers que l'air commun; & ce qui se rapporte bien avec ces observations, c'est que l'air déphlogistique dans l'expérience dont il s'agit, paroît un peu plus pesant que l'air commun.

En comparant ces observations avec celle de l'extrême légèreté de l'air inflammable déterminée par M. Cavendish, il sembleroit que moins une espèce d'air contient de phlogistique, plus elle est pesante, & *vice versâ*. Mais il n'en

est point du tout ainsi des substances solides ; & ce qui , dans le fait , est défavorable à cette hypothèse , c'est que l'air nitreux n'est pas plus léger que l'air phlogistique ; car sa propriété de phlogistiquer l'air commun paroît prouver qu'il contient une plus grande quantité de phlogistique. Aussi dans les procédés que j'ai rapportés plus haut pour la production de l'air , plus il y a de phlogistique dans les substances humectées avec l'esprit de nitre , plus il est certain que le produit sera de l'air nitreux ; & moins elles contiennent de phlogistique , plus il est certain que le produit sera de l'air pur. Mais je soupçonne qu'il y a de plus une différence dans le *mode* de combinaison du phlogistique avec l'esprit de nitre , dans la constitution de l'air nitreux.

L'air déphlogistique que j'employai dans cette expérience étoit si pur , qu'une partie de cet air & deux d'air nitreux n'occupèrent que l'espace de quatre cinquièmes. Si l'air eût été plus pur , sa pesanteur spécifique auroit sans doute été encore plus grande.

Il est à observer , qu'ayant de peser

l'air déphlogistiqué, il faut laisser passer un tems suffisant, pour qu'il soit entièrement purgé d'air fixe. Et comme cela demande du tems, & ne se fait peut-être jamais complètement, on peut soupçonner que l'excès de pesanteur de cette espece d'air, est dû à un mélange d'air fixe : mais l'air commun contient aussi une grande portion d'air fixe. D'ailleurs, l'air déphlogistiqué sur lequel je fis cette expérience avoit été produit, du moins en très-grande partie, quelques semaines auparavant; & depuis, il étoit resté exposé à l'eau. Il est cependant assez évident que l'air déphlogistiqué s'améliore en séjournant dans l'eau; ce qui vient, probablement, de ce que, dans ces circonstances, il dépose plus d'air fixe.

Ayant fait à la fois une grande provision d'air déphlogistiqué, pour des expériences, je trouvai qu'au bout d'environ dix jours, il étoit devenu cinq fois & demie meilleur que l'air commun, quoiqu'il ne le fut d'abord que quatre fois & demie. Le séjour dans l'eau pure doit être une méthode

plus certaine pour obtenir l'air déphlogistiqué le plus pur, que l'*agitation* dans l'eau; car bien que cette opération mette l'eau en état d'absorber l'air fixe plus promptement, & que par conséquent un peu d'*agitation* soit très-utile au commencement, pour hâter la purification de l'air: l'observation que j'ai faite (vol. 1, pag. 207), sur la dépravation que l'*agitation* dans l'eau la plus pure occasionne, avec le tems, dans l'air commun, peut faire supposer que la même opération déprave aussi l'air déphlogistiqué. J'ai déjà observé, en effet, que lorsque j'eus agité dans l'eau une quantité d'air déphlogistiqué, une chandelle n'y brûloit pas mieux que dans l'air commun, & ne présentait plus cette vive flamme qu'on observe dans cet air, lorsqu'il est d'une plus grande pureté.

Je n'ai pas fait beaucoup d'expériences sur le mélange de l'air déphlogistiqué avec les autres espèces d'air, parce que l'analogie qu'il a avec l'air commun est si grande, que je crois que tout le monde peut prévoir quel seroit le

réfultat de pareilles expériences. Il est cependant très-satisfaisant d'observer avec quelle promptitude & quelle perfection l'air déphlogistiqué se mêle avec l'air phlogistiqué ou dépravé par la respiration, par la putréfaction, &c. Ils se temperent l'un l'autre de telle sorte, que par la quantité & la qualité des deux especes d'air qu'on a employées dans ce mélange, on peut connoître avec exactitude quelle doit être sa pureté. Ainsi donc, si l'on mêle une partie d'air parfaitement nuisible avec une partie d'air qui soit exactement deux fois aussi bon que l'air commun, le mélange sera précisément du même degré de bonté que l'air commun.

En faisant cette expérience, j'ai observé aussi que lorsque le mélange étoit fait, il tenoit exactement la place de deux parties; de sorte qu'il n'y avoit ni accroissement ni diminution de quantité en conséquence du mélange; c'est le contraire de ce qui arrive lorsqu'on mêle l'air nitreux, soit avec l'air commun, soit avec l'air déphlogistiqué.

On peut inférer de-là qu'une quantité

ré d'air très-pur corrigeroit merveilleusement l'air nuisible d'un appartement dans lequel il y auroit grande compagnie , & qui seroit situé de maniere qu'on ne pût en renouveler l'air assez commodément. Par ce moyen , l'air puant & nuisible deviendroît presque à l'instant doux & salubre ; on pourroit apporter cet air en barils dans l'appartement ; ou bien , l'on pourroit construire à portée un laboratoire , pour la production de cet air qu'on feroit passer dans la salle à mesure qu'il seroit produit. Cet air pur ne seroit pas trop cher pour bien des assemblées ; & il ne faudroit pas être fort habile pour exécuter cette idée.

Je conjecturai sans peine que l'air inflammable détonneroit avec plus de violence & avec plus grand bruit , à l'aide de l'air déphlogistiqué , qu'il ne fait avec l'air commun ; mais l'effet surpassa de beaucoup mon attente , & il n'a jamais manqué de surprendre toutes les personnes devant qui j'en ai fait l'épreuve.

L'air inflammable exige environ deux tiers d'air commun pour faire la plus

forte détonation ; & si dans cette expérience on se sert d'une phiole contenant environ une mesure & demie , l'explosion sera si petite qu'on ne pourra l'entendre de plus loin peut-être que de cinquante ou soixante verges. Mais si l'on met un peu plus d'un tiers d'air très-déphlogistiqué , & le reste d'air inflammable dans cette même phiole , le bruit , à en juger par l'oreille , sera au moins quarante ou cinquante fois aussi fort qu'avec l'air commun , & égalera presque celui d'un coup de pistolet.

L'orifice de la phiole dans laquelle on fait cette expérience ne doit pas avoir beaucoup plus d'un quart de pouce de diamètre , & la phiole doit être très-forte , sans quoi elle seroit certainement brisée par l'explosion. La répercussion est très-considérable , & la chaleur que produit l'explosion se fait bien sentir à la main qui tient la phiole. Je me suis amusé quelquefois à porter dans ma poche quelques phioles ainsi chargées d'un mélange d'air inflammable & d'air déphlogistiqué , & bouchées avec des bouchons de liége ou de cristal ; & je ne me suis apperçu d'aucune différence

dans l'explosion , après les avoir gardées long-tems , & les avoir portées à une distance considérable.

C'est une très-belle expérience que de plonger seulement une chandelle allumée dans une jarre remplie d'air déphlogistiqué. La force & la vivacité de la flamme sont frappantes ; & la chaleur qu'elle produit dans ces circonstances est aussi très-grande. Mais cette expérience est plus agréable lorsque l'air n'est qu'un peu plus de deux fois aussi bon que l'air commun ; car lorsqu'il est fortement déphlogistiqué , la chandelle brûle avec pétilllement comme s'il étoit chargé de quelque matiere combustible.

Les explosions très-fortes qui se font dans l'air déphlogistiqué donnent lieu de supposer , que s'il étoit possible de le renfermer avec la poudre à tirer , la dixieme partie de la charge ordinaire de poudre suffiroit dans tous les cas où elle est en usage : car la force d'une explosion , dans cette espece d'air , surpasse de beaucoup tout ce qu'on auroit pu attendre de sa pureté , à n'en juger que par les autres épreuves. Mais je ne

vois pas comment il est possible de l'appliquer à cet usage. Je crois cependant qu'il ne seroit pas difficile d'enfermer de la poudre dans des vessies, où les interstices des grains seroient remplis de cet air au lieu d'air commun ; & les Mineurs pourroient se servir de ces vessies, pour faire sauter des rochers, pour exploiter des mines, &c.

Quoi qu'il en soit, rien ne seroit plus aisé que d'augmenter la force du feu à un degré prodigieux, en y soufflant de cet air déphlogistiqué, au lieu d'air commun. J'ai fait cette épreuve en présence de mon ami, M. Magellan ; en remplissant une vessie de cet air, & le dirigeant par un petit tube de verre sur un morceau de bois allumé. Il seroit très-aisé d'en fournir à un soufflet, par le moyen d'un grand réservoir.

Les Chymistes feroient peut-être de très-grandes choses avec la chaleur prodigieuse que cet air pourroit leur procurer. Je n'eus pas plutôt fait part de la découverte de cette espèce d'air à mon ami, M. Michell, qu'il lui vint en idée, qu'on parviendroit peut-

être à fondre la *platine* par ce moyen.

L'augmentation de force & de vivacité qu'acquiert dans cet air la flamme d'une chandelle peut faire conjecturer qu'il seroit particulièrement salutaire aux poumons, dans certains cas de maladie, lorsque l'air commun ne suffiroit pas pour en évacuer assez promptement l'effluve putride phlogistique. Mais peut-être pouvons-nous inférer aussi de ces expériences, que le pur air déphlogistiqué, quelque utile qu'il pût être comme *remede*, ne nous conviendrait pas autant dans l'état ordinaire de santé. Car tout de même qu'une chandelle se consume beaucoup plus promptement dans l'air déphlogistiqué que dans l'air commun, nous pourrions aussi *vivre*, pour ainsi dire, *trop vite*, & les forces vitales pourroient être trop tôt épuisées dans cette pure espece d'air. Du moins, un Moraliste peut nous dire que l'air qui nous a été accordé par la Nature est aussi bon que nous le méritons.

Mon Lecteur ne sera pas étonné qu'après avoir déterminé la bonté supérieure de l'air déphlogistiqué, par la vie des souris, & par les autres épreu-

ves que j'ai rapportées ci-dessus, j'aie eu la curiosité de le goûter moi-même. J'ai satisfait ma curiosité en le respirant avec un siphon de verre ; & par ce moyen , j'en ai réduit une grande jarre pleine à l'état de l'air commun. La sensation qu'éprouverent mes poumons ne fut pas différente de celle que cause l'air commun. Mais il me sembla ensuite que ma poitrine se trouvoit singulièrement dégagée , & à l'aise pendant quelque tems. Qui peut assurer que dans la suite cet air pur ne deviendra pas un objet de luxe très à la mode ? Il n'y a eu jusqu'ici que deux souris , & moi , qui ayons eu le privilege de le respirer.

L'air de l'atmosphère étoit-il anciennement , ou sera-t-il dans la suite des tems , meilleur ou pire qu'il n'est à présent ? C'est là une spéculation curieuse ; mais je n'ai point de théorie qui puisse me fournir quelque lumière pour la suivre. Les Physiciens à venir pourront, en comparant leurs observations avec les miennes , déterminer aisément si l'air conserve en général le même degré de pureté , ou si , dans un certain espace de tems , il devient plus ou moins

propre à la respiration. Ils pourront voir de plus si les changemens auxquels il peut être sujet sont *réguliers* ou non : & par ce moyen , ils pourront acquérir des *données* pour juger de l'état passé & de l'état futur de l'atmosphère. Mais comme on n'avoit fait avant nous aucune observation de ce genre , tout ce qu'on pourroit avancer maintenant sur ce sujet se réduiroit à des conjectures hasardées. S'il peut nous être permis de former un jugement d'après la longueur de la vie humaine dans les différens siècles , ce qui paroît la seule *donnée* qu'on nous ait laissée sur cet objet , nous pouvons conclure que l'air de l'atmosphère en général a conservé le même degré de pureté pendant bien des siècles. Mais cette *donnée* n'est nullement suffisante pour nous faire parvenir à une exacte solution de ce problème.



SECTION VI.

De l'air tiré de différentes substances par la chaleur seule.

J'AI déjà observé que lorsque je fis mes premières expériences je n'étois pas pourvu d'une *lentille* de force considérable, ce qui m'avoit empêché de compléter bien des expériences, & même d'en commencer beaucoup d'autres que j'avois en vue. Mais bientôt après avoir publié mon premier Volume, ayant fait acquisition d'une lentille suffisamment forte pour mon dessein, la première chose que je fis lorsque je repris mes expériences, ce fut de m'en servir pour m'assurer de l'espece d'air que donneroient certaines substances par le moyen de la chaleur seule, soit *dans le vuide*, soit renfermées dans le mercure. On a vu dans les Sections précédentes, qu'en suivant cette méthode, je fus conduit à la découverte de beaucoup de faits nouveaux & assez importants, pour

mériter d'être rapportés féparément & tout au long.

Je me propofe de renfermer dans cette Section le refte des obfervations que je fis par cette méthode , dans le même-tems où je traitois les mêmes fubftances dans un canon de fufil. Car dans le cours de mes expériences , j'ai fait ufage de l'une & l'autre méthode alternativement , fuivant les différentes circonftances, & les différentes vues que je pouvois avoir.

Je commençai ces expériences dans le mois de Juin 1774 , & une des premières obfervations que je fis , ce fut qu'on peut tirer de l'air inflammable de plufieurs métaux , par la chaleur feule , fans l'intermede d'aucun acide : ce qui n'étoit pas mon opinion lorsque je publiai mes premiers ouvrages. J'avois plutôt penfé , que puifque l'air inflammable étoit produit en quantité , lorsque l'air acide marin décompofoit des fubftances contenant du phlogiftique (comme le foudre , le charbon , &c.) , l'air acide devoit contribuer à fa formation , & entrer dans fa conftitution ; & en conféquence , j'avois conclu uni-

versellement , que l'air inflammable est composé d'air acide & de phlogistique ; & parce qu'on peut priver l'air inflammable de son inflammabilité , & de très-nuisible , le rendre respirable en l'agitant dans l'eau , j'avois poussé mes conjectures jusqu'à penser que l'air de l'atmosphère pouvoit être composé de l'union de l'air acide & du phlogistique , & je ne vois pas comment , avec de pareilles prémisses , on auroit pu s'empêcher de former cette conjecture.

Maintenant même , je ne suis pas absolument certain que cette conclusion fût mauvaise ; car les principes chymiques sont si fort altérés par les combinaisons , qu'il y en a beaucoup qui existent , comme on sait , dans des substances , où l'on pourroit le moins les soupçonner : cependant , à moins qu'il n'y ait un acide dans les métaux , je ne vois pas comment ma première opinion peut se soutenir conjointement avec les faits qu'on verra dans cette Section : savoir , qu'on peut , par la chaleur de la lentille , obtenir de l'air inflammable de plusieurs métaux renfermés par le mer-

cure , fans qu'il soit befoin de diffoudre le métal dans un acide.

Il est cependant évident , d'un autre côté , que l'air inflammable n'est pas composé de pur phlogistique : car j'ai fait voir qu'on peut le priver entièrement de son inflammabilité , & quoiqu'on le diminue de volume par cette opération , il en reste cependant une très-grande portion qui , étant alors dans le même état que l'air dans lequel une chandelle a brûlé jusqu'à extinction , se trouve suffisamment pure pour la respiration. La question est de savoir *quelle est la base de l'air inflammable* , ou quel est le principe chymique auquel le phlogistique est uni dans sa constitution. Cet air , dans le cas dont il s'agit , sembleroit résulter de quelque nouveau mode de combinaison du phlogistique avec la terre du métal. Quoi qu'il en soit , voici les faits.

Ayant mis dans un des vaisseaux de verre , fig. *a* , planche 1 , une quantité de *limaille de fer* soigneusement triée avec l'aimant , j'achevai de remplir le vaisseau avec du mercure , & après l'avoir placé à la renverse dans un bas-

fin rempli de ce fluide, je dirigeai le foyer de la lentille sur la limaille. Il y eut aussi-tôt de l'air produit, qui, à l'examen, parut inflammable, quoique non pas très-fortement. Il ressembloit à l'air inflammable qui a été lavé dans l'eau jusqu'à ce que son inflammabilité soit presque détruite. Je ne pus pas distinguer la couleur de sa flamme lorsque je fis l'explosion, de la manière usitée, en approchant une chandelle. Après l'opération, le fer dont j'avois extrait l'air avoit une odeur extrêmement forte, exactement semblable à celle de l'air inflammable très-fort qu'on tire des métaux par le moyen des acides.

Par le même procédé, j'obtins de l'air de la *limaille de ressorts de montre*, qui sont faits du meilleur acier. Il ne différoit aucunement de l'air inflammable de l'expérience précédente. J'avois soigneusement trié avec l'aimant cette limaille, ainsi que celle de fer; en sorte que je crois qu'elles étoient exemptes de mélange de matière étrangère. Cela exige, à la vérité, le plus grand soin, parce que la moindre particule de bois, ou de quelque autre ma-

tiere végétale ou animale , à peine sensible à l'œil , donnera plus d'air inflammable qu'une quantité considérable de limaille.

N. B. Le lieu sur lequel étoit tombé le foyer de la lentille , fut beaucoup plus noir qu'aucune autre partie de la limaille ; & pendant l'application de la chaleur , une quantité de limaille étoit quelquefois dispersée comme par une explosion qui se faisoit au-dessous de la surface. Je suppose que cela provenoit d'une production subite d'air que donnoient quelques parties de la limaille placées sous les autres ; mais à portée d'éprouver l'effet de la chaleur.

Après avoir ainsi obtenu de l'air du fer , je me mis à faire la même expérience sur d'autres métaux ; & comme ils ont tous plus ou moins d'affinité avec le mercure , je fus obligé d'avoir recours au *vuide*. Mais étant pourvu d'une machine pneumatique de M. Smeaton , je pouvois compter sur un vuide très-exact , enforte qu'il n'y auroit que très-peu d'air commun mêlé avec l'air qui seroit produit. Afin que la limaille des différens métaux fût par-

faitement exempte de mélange , je me procurai des limes neuves parfaitement nettes , & je me servis d'un seul côté de chacune , pour limer chacun des métaux.

Tout étant préparé de la sorte , je fis tomber le foyer de ma lentille sur la limaille de *zinc* , & j'en obtins aussitôt de l'air qui étoit très-fortement inflammable. Le zinc passe pour contenir plus de phlogistique que les autres substances métalliques , & la différence entre l'air inflammable du zinc & celui que j'avois tiré du fer fut aussi très-frappante.

J'obtins de l'air inflammable en abondance de la limaille de *laiton* , ainsi que de celle d'*étain*. Mais l'air de cette dernière étoit très-légerement inflammable , & je n'aurois pu m'appercevoir qu'il le fût du tout , si je n'eusse plongé une chandelle allumée dans un vaisseau rempli de cet air : au lieu que dans les autres cas , je faisois les épreuves en présentant la flamme d'une chandelle à l'orifice étroit d'une phiole remplie de l'air que j'examinois. Je crois que le laiton ne donne de l'air inflammable

qu'à raison du zinc qu'on ajoute au cuivre pour le changer en laiton.

Ainsi, tous les métaux qui donnent de l'air inflammable lorsqu'on les dissout dans les acides, en donnent aussi par la chaleur seule. Je n'eus aucun succès avec les autres métaux.

Le *régule d'antimoine*, chauffé dans le vuide, jeta beaucoup de fumée, & noircit tout l'intérieur de mon récipient; mais l'air que j'en obtins fut bien peu de chose, & éteignit la chandelle.

J'obtins à peine quelque peu d'air du *bismuth* & du *nickel*. Mais dans ces expériences, la chaleur ne fut pas appliquée avec avantage, & le bismuth se fondit bientôt en grosses masses sur lesquelles ma lentille n'avoit aucun effet.

Je ne tirai point d'air du *plomb* ni du *cuivre*. Lorsque j'eus fait tomber le foyer de la lentille sur le premier, le récipient se remplit de fumée. Mais la chaleur ne fut nullement suffisante pour l'expérience avec le cuivre.

Parmi mes premières expériences, j'en ai rapporté une (vol. I. pag. 47 &

48) qui m'embarassa excessivement ainsi que mes amis. La voici : l'air que je tirai de la *craie* , renfermée dans un canon de fusil , étoit inflammable , & sa flamme étoit bleue. Je conjecturai alors que cette propriété venoit du fer ; & les expériences que j'ai faites avec la lentille , ont confirmé cette conjecture ; mais je fus long-tems hors d'état d'expliquer pourquoi la flamme que présentoit cet air étoit *bleue* , puisque l'air inflammable tiré du fer seul n'offre pas la même couleur. Je m'imaginai enfin d'essayer comment brûleroit de l'air inflammable mêlé avec de l'air fixe extrait des substances calcaires par les acides , & je trouvai qu'il présentoit toujours une flamme bleue. Je dois avoir vu ce fait peut-être cent fois , pendant une longue suite d'expériences que j'avois faites sur le mélange d'air fixe & d'air inflammable , dans l'idée que leur union pourroit faire de l'air commun. Mais j'étois encore très-neuf dans ces recherches , & c'est faute d'avoir fait attention à la *couleur de la flamme* , ce qui n'étoit pas l'objet que j'avois alors en vue , que je me suis

trouvé depuis si fort embarrassé. Je suis encore hors d'état de donner la raison de cet effet.

L'air fixe est promptement dégagé de la craie par un acide quel qu'il soit. Mais la *chaleur* seule ne peut l'en chasser qu'en très-petite quantité : cependant, ayant mêlé de la limaille de fer & de la craie, dans le dessein d'imiter les circonstances de l'expérience de la craie dans le canon de fusil, j'obtins de l'air en abondance, & il étoit exactement de la même qualité que celui que j'avois tiré de la craie dans le canon de fusil : inflammable en très-grande partie, & présentant une flamme bleue. J'ai répété la même expérience, elle m'a donné le même résultat.

Aucune des *chaux métalliques* que j'ai soumises à cette expérience ne m'a donné de l'air inflammable ; mais toutes de l'air fixe, & en général, très-abondamment. La *rouille de fer* donna une grande quantité d'air, dont les deux tiers étoient de l'air fixe ; le reste ne fut point affecté par l'air nitreux, & éteignit une chandelle. En sorte que le produit entier parut de l'air fixe, contenant

seulement un peu plus de cette partie qui n'est pas miscible avec l'eau ; ou laissant un résidu plus considérable qu'à l'ordinaire : cependant , une autre fois , la rouille de fer me fournit de l'air fixe qui étoit très-pur , & qui fut presque entièrement absorbé par l'eau. Je ne puis me rappeler les circonstances de cette expérience ; mais il se peut que j'eusse employé moins de chaleur dans le dernier cas que dans le premier.

N. B. La partie de la rouille sur laquelle tomba le foyer de la lentille devint très-noire.

J'ai rapporté dans une des Sections précédentes , que la *chaux grise de plomb* & la *litharge* donnent de l'air fixe , & que le *minium* & les autres préparations de plomb en contiennent aussi une grande quantité.

Je mis du *cinabre préparé avec l'antimoine* , dans le mercure , & j'en obtins un peu d'air , par le moyen de la lentille ardente ; mais non pas assez pour juger de sa qualité. J'en obtins davantage du *vermillon* ordinaire : savoir , environ quarante fois son volume , & c'étoit tout de l'air fixe qui fut prompte-

ment absorbé par l'eau. Cette substance, ainsi que la rouille de fer, devint noire au foyer de la lentille.

Les *sels métalliques*, qui m'ont donné de l'air, m'ont donné de l'air fixe, & je trouve que la plupart des substances salines contiennent cette espèce d'air. Je rapporterai quelques expériences à ce sujet, sans m'attacher à les placer avec ordre.

Le *blanc de plomb* donna de l'air en abondance par la chaleur de la lentille, & c'étoit tout de pur air fixe.

Je ne pus obtenir aucune espèce d'air du *sucré de saturne*, ni du *nitre de plomb*. Le premier se fondit en une substance liquide; le second perdit sa couleur blanche, devint d'un gris obscur, & fut réduit en poudre avec pétilllement.

Toutes les espèces de *vitriol* me donnerent de l'air fixe. J'éprouvai premièrement la *couperose verte* ordinaire, dans le mercure. Elle fut résolue en une grande quantité d'eau; mais l'air produit ne faisoit pas la vingtième partie de son volume. La moitié de cet air fut promptement absorbée par l'eau, & ce qui resta étoit en trop petite quantité

pour être soumis à l'examen. Je répétai cette expérience sur la même couperose *calcinée*, en me servant & du canon de fusil & d'un grand vaisseau de verre rempli de sable ; mais dans les deux cas, le produit fut de l'air fixe. Une demi-once de couperose calcinée donna près d'une chopine d'air.

Lorsque j'eus extrait l'air de la couperose verre calcinée, renfermée dans un vaisseau de verre, je mis les mêmes matériaux dans un canon de fusil ; mais je n'en tirai rien de plus que de l'air fixe mêlé avec de l'air acide, ainsi qu'on pouvoit s'en appercevoir par la réduction prompte qu'éprouvoient les bulles d'air, en passant à travers l'eau.

Ayant soumis à l'expérience dans le mercure le *vitriol bleu*, qui est composé d'acide vitriolique & de cuivre, j'eus le même résultat qu'avec la couperose verte ; l'eau fut produite seulement en moindre quantité.

Le *vitriol blanc*, qui est composé d'acide vitriolique & de zinc, donna dix fois autant d'air que les autres espèces de vitriol. La moitié de cet air fut ab-

forbée par l'eau, & ce qui resta entre-tint la flamme d'une chandelle. Ayant mis dans un vaisseau de verre une quantité de vitriol blanc calciné, j'en tirai, outre l'air fixe, de l'air qui diminuoit un peu l'air commun; mais je conjecture que cette propriété nitreuse provenoit de quelque autre substance accidentellement mêlée avec le vitriol.

Le *nitre mercuriel* donna une grande quantité d'air dans le mercure, & c'étoit de pur air nitreux. Mais peut-être l'acide nitreux s'étant dégagé de cette substance, avoit-il produit l'air nitreux en dissolvant le mercure.

Un *mélange de vitriol Romain & de farine calciné*, que j'avois pris chez le Docteur Higgins, me fournit de l'air, dont la moitié étoit de l'air fixe, & dont le restant ne fut point diminué par l'air nitreux.

Je n'ai jamais pu tirer des *substances salines* quelqu'autre espece d'air que l'air fixe. Je commençai par l'*alun*, & pour la premiere expérience que je fis sur cette substance, je me servis des rayons du soleil dans le mercure; j'en obtins un peu d'air, qui parut être de

l'air fixe , parce qu'il éteignit une chandelle , & fut promptement absorbé par l'eau. Je répétai cette expérience , & j'eus le même résultat. La quantité d'air que je tirai d'un morceau d'alun fut d'environ un tiers de son volume ; mais je pense qu'en continuant plus longtemps l'opération , j'en aurois extrait un peu , mais non pas beaucoup , davantage.

J'observai , à cette occasion , que je ne pouvois calciner qu'une quantité déterminée d'alun dans une quantité donnée d'air , & que lorsque l'air étoit saturé , le seul effet de la chaleur étoit de tenir l'alun dans un état de fluidité ; mais il se calcinoit facilement dans le vuide , & comme les récipients dans lesquels je fis cette calcination devinrent très-humides , il est assez évident que cette opération ne consiste qu'en la simple expulsion de l'eau qui entre dans la crySTALLISATION de ce sel : en sorte que lorsque l'air ambiant ne peut plus recevoir d'eau , cette calcination ne peut aller plus avant. J'observai aussi dans la même occasion , que lorsque je calcinois une quantité d'alun dans une quantité donnée d'air commun , celui-ci n'é-

roit ni diminué ni dépravé le moins du monde par cette opération.

Je tâchai ensuite, avec la lentille, de tirer de l'air de l'*alun calciné*; j'en obtins un peu, & je ne fis pas d'autre observation sur cet air, sinon qu'il ne fût pas diminué par l'air nitreux; mais ayant mis dans un canon de fusil une quantité d'*alun calciné*, j'en obtins une quantité considérable d'air, dont une partie étoit de l'air fixe qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux, & le restant ne différoit point du résidu de l'air fixe; car il éteignoit une chandelle, n'affectoit pas l'air commun, & n'étoit point affecté par l'air nitreux.

D'une demi-once de *tartre vitriolé* que je mis dans un canon de fusil, j'obtins environ une mesure & demie d'air qui étoit principalement de l'air fixe. Le dernier produit diminueoit un peu l'air commun. Mais j'attribue cet effet à quelques restes des matériaux qui avoient servi dans une expérience précédente, & dont le canon n'avoit pas été parfaitement dépouillé.

Le *borax* ne fit que se fondre au foyer de la lentille. Mais le *borax calci-*

né donna à peu-près son volume d'air qui éteignit une chandelle, & ne fut pas diminué par l'air nitreux : enforte qu'il étoit en apparence la même chose que le résidu de l'air fixe ; & ce résidu est à peu-près, sinon tout-à-fait, la même chose que l'air commun phlogistiqué. Ce qui m'engagea à faire cette expérience, ce fut celle que j'avois faite sur le sel sédatif qui est tiré du borax, & dont, ainsi que je l'ai observé plus haut, j'avois tiré de l'air à peu-près aussi bon que l'air commun. J'espérois que cette nouvelle expérience jetteroit quelque lumière sur l'autre ; mais mon espérance fut trompée.

Ayant fait tomber le foyer de la lentille dans le mercure sur un morceau de *sel ammoniac volatil*, j'en chassai dans l'instant une grande quantité d'air ; mais dès que j'eus retiré la chaleur, une grande partie de cet air disparut bientôt, laissant les parois du vaisseau couverts de cristaux déliés, exactement semblables à ceux qui sont produits par un mélange d'air fixe & d'air alkalin. L'eau absorba le restant qui sans doute étoit de l'air fixe.

Entr'autres

Entr'autres substances que j'exposai au foyer de la lentille dans le mercure, j'y mis un morceau de beau *sucré blanc*; il fut promptement fondu & changé en une substance brune, & donna environ deux tiers de son volume d'air, dont un tiers fut promptement absorbé par l'eau, & le restant éteignit une chandelle. Je répétai cette expérience avec de la cassonade brune, & j'eus le même résultat, avec cette différence, qu'elle produisit plus d'air, à proportion de son volume, que le *sucré blanc*.

Je n'obtins point d'air du tout du *sel commun* renfermé dans le mercure.

Il y a eu, parmi les Physiciens, beaucoup d'opinions différentes touchant la qualité de l'air qui est réellement contenu dans la craie. L'opinion du Docteur Black est que c'est proprement de l'air fixe. D'autres ont pensé que l'acide dont on se sert pour déloger l'air de la craie entre réellement dans la composition de cet air, & conséquemment, que l'air fixe qu'on obtient par le moyen de différens acides a des propriétés différentes. Un Physicien Italien, qui m'a fait l'honneur de m'écrire sur ce sujet,

m'a informé qu'il a découvert, que l'air chassé de la craie par la chaleur est d'une autre nature que celui qu'on en retire par le moyen des acides; & il dit sur-tout que le premier ne rend pas l'eau acidule. Quant à moi, je dois convenir que je n'ai pas examiné à fond cette matiere, & j'ai penché tantôt pour une opinion, tantôt pour une autre. Quelquefois j'ai pensé que l'air fixe est un *acide primitif*, & conséquemment un être uniforme, invariable, de quelque substance, & par quelque procédé qu'on l'obtienne. D'autres fois, par des raisons que je rapporterai dans une des Sections suivantes, j'ai été porté à croire que son acidité dérive de quelque autre acide, & sur-tout de l'acide nitreux.

Maintenant, je ne puis dire que je sois tout-à-fait décidé sur cette question; mais j'avoue que j'ai beaucoup de penchant pour l'opinion du Docteur Black, & que toutes mes expériences sur la craie sont en sa faveur: car bien que je n'aie pu obtenir que très-peu d'air de la craie pure, soit dans le mercure, soit dans le vuide, c'étoit

toujours de l'air fixe ; quoique le résidu fût quelquefois plus considérable que je ne l'ai trouvé lorsque l'air est produit par la dissolution de la craie dans un acide. Une fois cependant , je tirai par la chaleur , dans le mercure , une petite quantité d'air fixe très-pur , de la craie , & il y en eut presque autant d'absorbé par l'eau que lorsqu'on l'a retiré par le moyen d'un acide.

Il faut cependant remarquer que la chaleur ne peut faire sortir que très-peu d'air de la craie. Le soleil étant presque à sa plus grande hauteur, le 28 Juillet , j'ai tenu pendant plus de demi-heure une très-petite quantité de craie au foyer de ma lentille , qui , ainsi que je l'ai déjà dit , est de douze pouces de diamètre , & de vingt pouces de distance focale ; mais malgré cette longue exposition à un degré de chaleur si intense , il parut donner autant d'air fixe lorsque je le jettai dans un vaisseau d'eau acidulée avec de l'huile de vitriol , qu'une égale quantité de craie qui n'avoit point éprouvé de chaleur. Je n'en jugeai cependant que par l'effervescence visible , & je ne cherchai pas à mesurer le pro-

duit d'air , pour déterminer avec exactitude l'effet de ces différentes circonstances. J'ai tenu aussi de la craie dans un creuset à la plus forte chaleur d'une forge , pendant plus d'un quart-d'heure , sans qu'elle ait souffert la moindre altération ; mais je crois qu'il peut y avoir de grandes différences à cet égard , dans la constitution de différens échantillons de craie.

Je mis une quantité de craie dans un grand vaisseau de verre , fig. *d* , que je tins dans un feu de sable aussi ardent qu'il pouvoit l'être sans fondre le verre. Cette craie produisit environ son volume d'air. Je l'examinai à des intervalles très-courts , & je trouvai toujours qu'il précipitoit la chaux de l'eau de chaux , & que le résidu que l'eau n'absorboit point , éteignoit une chandelle. Ce sont là , à ce qu'il paroît , les épreuves les plus sûres pour reconnoître le véritable air fixe.



SECTION VII.

De l'air produit par la dissolution des substances végétales dans l'esprit de nitre.

LES expériences dont je rendrai compte dans cette Section, ont été occasionnées en partie, par une apperçue de M. Bewley, qu'on peut voir dans la lettre imprimée à la fin de mon premier volume; mais plus immédiatement par une expérience que j'eus le plaisir de voir à Paris, dans le laboratoire de M. Lavoisier, mon excellent compagnon de travail dans ces recherches, & à qui le monde savant a de très-grandes obligations.

M. Bewley dit, qu'il avoit toujours regardé comme accordé, que le fluide élastique qui se dégage dans la préparation de l'éther nitreux sans distillation étoit de l'air fixe; mais qu'après avoir lu mes premiers ouvrages relatifs à l'air, il avoit trouvé par l'examen,

que ce fluide élastique avoit les propriétés générales de l'air nitreux.

Chez M. Lavoisier, je vis avec grande surprise, la production rapide de près deux gallons (*) d'air par un mélange d'esprit de nitre & d'esprit de vin échauffé avec un réchaut de charbon. Ce Physicien ingénieux tira cet air du récipient avec une pompe, & appliqua une chandelle allumée à l'orifice du tube par lequel il le faisoit sortir; cet air prit feu, & présenta une flamme bleue; faisant jouer alors la pompe avec vigueur, il fit étendre le jet de flamme bleue à une distance considérable. Je fus très-frappé de cette expérience, & je me promis d'y faire une attention particulière, & de la suivre lorsque je serois de retour en Angleterre.

Ma première idée fut que cet air étoit la même chose que l'air nitreux phlogistique, que j'avois obtenu en exposant des morceaux de fer, ou du foie de soufre, à l'air nitreux. Je supposois que le phlogistique de l'esprit de vin se dégageoit

* Un gallon contient environ quatre pintes.

dans ce procédé, & s'incorporoit avec l'acide nitreux de la même manière que le phlogistique qui se dégage des autres substances. Ces espèces d'airs différoient cependant en ce point, que dans l'expérience de M. Lavoisier la flamme étoit bleue, tandis que dans les miennes elle n'avoit pas cette couleur. Mais cette circonstance sembloit n'être pas de grande importance, & dans le fait, je ne puis dire que j'aie maintenant sur cet objet une idée essentiellement différente de celle que j'avois alors. Mais depuis, en suivant cette expérience, j'ai eu occasion d'observer dans la production de l'air, par le moyen de l'esprit de nitre, des différences beaucoup plus grandes que je ne m'y attendois auparavant.

Il faut convenir que l'acide nitreux est d'une nature très-merveilleuse. Plus je le considère, plus il excite mon admiration, & plus le sujet me paroît inépuisable. Je puis me flatter d'avoir fait d'assez grands pas dans la recherche de cet être, & je me propose de l'examiner encore; mais j'avoue que j'ai très-

peu d'espoir de le voir entièrement expliqué.

On verra en général dans la suite de ces expériences, que si la substance solide ou fluide avec laquelle on chauffe l'esprit de nitre, contient beaucoup de phlogistique, l'air qu'on en retirera sera de l'air nitreux, ou aura la propriété de diminuer l'air commun à un degré considérable, & dans presque tous les cas il y aura un mélange d'air fixe. Si la substance est inflammable, l'air sera communément tel que je l'ai vu chez M. Lavoisier, inflammable, & présentant une flamme bleue. Mais cette inflammabilité est d'une espèce très-délicate, semblable à celle de l'air nitreux phlogistique; car on en prive facilement cet air en le lavant dans l'eau.

Je prévois que le détail particulier de ces expériences, quoique très-remarquables par elles-mêmes, paroîtra ennuyeux à quelques personnes; mais il sera très-utile à ceux qui voudront suivre ces expériences, sur-tout à cause des avis que je donnerai dans l'occasion, pour prévenir les accidens désagréables.

qui peuvent en arriver. Tous les Chymistes savent combien il est dangereux de mêler l'esprit de nitre avec des matières inflammables : j'en connoissois les effets pour les avoir vus dans un cours de Chymie il y a plusieurs années ; mais étant obligé de faire ces mélanges d'une manière très-différente , je ne pouvois en prévenir les dangers , sans diverses précautions que l'expérience seule a pu m'apprendre.

A l'imitation de l'expérience que j'avois vue chez M. Lavoisier , je commençai par l'*esprit de vin* , que je mêlai avec l'esprit de nitre de la manière prescrite en Chymie dans le procédé pour faire l'éther nitreux. Je mis environ un tiers d'esprit de nitre pour deux tiers d'esprit de vin dans des phioles comme *e*, vol. I. pl. 1. Je les mêlai peu à peu , & ayant chauffé ce mélange avec la flamme d'une chandelle , je reçus l'air dans l'eau. Lorsque j'en eus obtenu une quantité considérable , je l'examinai & je trouvai qu'il s'enflammoit & présentoit une jolie flamme bleue ou verdâtre , à peu-près la même , autant que je pouvois m'en souvenir , que celle que

j'avois vue chez M. Lavoisier ; enforte que je ne doutai nullement que mon procédé, quoique différent du sien en quelque chose , n'eût répondu parfaitement à mes vues.

En considérant cette flamme avec attention , je jugeai qu'elle ressembloit beaucoup à celle que présente un mélange d'environ un tiers d'air inflammable , & deux tiers d'air nitreux ; & je conclus que mon air étoit probablement composé de ces deux-là , & que l'acide nitreux formoit de l'air nitreux en se saisissant du phlogistique de l'esprit de vin , tandis qu'il restoit assez de phlogistique surabondant pour rendre l'air en partie inflammable.

Dans le procédé de l'éther nitreux, on recommande de verser l'esprit de nitre sur l'esprit de vin , & nullement l'esprit de vin sur l'esprit de nitre ; mais quoique cette dernière méthode puisse ne pas être avantageuse pour faire l'éther nitreux , elle me réussit très-bien pour la production de l'air , & ce fut un changement très-utile dans ce procédé. Il est cependant nécessaire , que les personnes qui ne sont pas très-versées dans

ces fortes d'opérations se tiennent sur leurs gardes, lorsqu'elles voudront faire ces expériences.

Il faut que l'esprit de nitre soit très-affoibli, & la quantité de la matiere inflammable en liqueur si petite, qu'elle suffise précisément à en couvrir la surface; autrement le mélange, qui ne présente d'abord aucun phénomène allarmant, deviendra en peu de tems très-noir en commençant par sa surface. La phiole se remplira ensuite de vapeurs rouges, l'air sera produit en un torrent prodigieux, & à moins que le tube qui le transmet ne soit de grandeur suffisante, & que le vaisseau dans lequel on a fait le mélange ne soit très-fort, tout sautera avec violence. Je n'en ai vu que trop d'exemples, & quelquefois même lorsque je me croyois assez expérimenté pour avoir pris toutes les précautions nécessaires. D'ailleurs, toutes les matieres huileuses deviennent extrêmement visqueuses lorsqu'on les mêle avec l'esprit de nitre, & cette matiere visqueuse entrant dans le tube le bouche, & devient une nouvelle cause d'ex-

plosion. Mais pour revenir aux expériences :

Ayant versé dans une phiole de verre à bouchon de crystal tubulé très-peu d'esprit de vin sur une quantité d'esprit de nitre affoibli, j'obtins sur le champ une grande quantité d'air. Une chandelle que j'y plongeai s'éteignit ; mais en s'éteignant, sa flamme parut entourée d'une légère flamme bleue ou verte, à peu-près comme dans l'air nitreux. Presque la moitié de ce produit d'air fut promptement absorbé par l'eau, & précipita la chaux de l'eau de chaux ; & je ne doute pas que dans les expériences suivantes, aussi-bien que dans celle-ci, une grande portion de l'air produit de cette manière ne fût de l'air fixe. Le restant étoit de l'air nitreux presque aussi fort qu'il puisse l'être.

Il m'arriva de faire quelques expériences de plus sur l'air que produit de cette manière l'*huile de térébenthine*, & parmi ces expériences il y en a d'assez remarquables. Lorsque j'employois dans ce procédé l'esprit de nitre le plus fort, il étoit très-difficile d'obtenir beau-

coup d'air , parce que l'effervescence étoit trop subite. Mais j'en ai recueilli facilement une grande quantité, en me servant d'esprit de nitre étendu dans une égale quantité d'eau. Une fois cependant , après que j'eus chauffé le mélange assez fortement, j'eus beau retirer la chandelle, l'air continua d'être produit avec une rapidité qui s'accrut toujours pendant environ une minute; il vint après cela tout-à-fait comme un torrent; toute l'huile de térébenthine fut rejetée de la phiole, & il n'y resta que l'esprit de nitre. La même chose arriva dans les autres mélanges analogues à celui-là. Ainsi donc, lorsqu'il est nécessaire d'appliquer la chaleur, il faut le faire peu-à-peu & avec précaution, & éviter que l'air ne soit jamais produit très-rapidement, à moins que l'objet qu'on se propose dans l'expérience ne le requiere, & qu'en conséquence la personne qui opere ne se tienne sur ses gardes.

Lorsque je recevois cet air dans l'eau, il éteignoit une chandelle, & ne diminueoit pas l'air commun. Lorsqu'il étoit reçu dans le mercure, il éteignoit aussi

une chandelle ; mais à mesure qu'elle s'éteignoit dans cet air pour la troisième ou quatrième fois , elle étoit entourée d'une flamme bleuâtre aussi grande que celle de la chandelle ; & une fois pendant que je recevois l'air dans l'eau , ayant appliqué par hazard plus de chaleur que je ne voulois , il y eut une production d'air très-subite ; & une chandelle brûla avec une flamme agrandie , quoique non pas très-considérablement , dans cet air que j'examinai sur le champ. Cela prouve néanmoins que dans ce procédé , aussi-bien que dans celui par lequel on fait l'air nitreux phlogistique , la propriété d'entretenir agrandie la flamme d'une chandelle , dépend en grande partie du *temps* auquel on en fait l'épreuve après que l'air est produit , & de quelques autres circonstances délicates.

Une quantité de cet air que je reçus dans l'eau fut environ à moitié absorbée dans l'espace d'une nuit. Agité dans l'eau , cet air ne fut absorbé ni aussi promptement que l'air fixe , ni avec autant de difficulté que l'air nitreux ; mais comme un *medium* entre les deux. Lors-

que cet air fut réduit à un huitieme de son volume primitif, il fut diminué par l'air nitreux. Mais cela arrive à toutes les especes d'air qu'on peut soumettre à cette expérience & à l'air nitreux lui-même, comme je l'ai observé dans mon premier volume.

Lorsque je fis les expériences dont je viens de parler, avec l'huile de térébenthine, je n'avois point d'eau de chaux sous ma main; & par conséquent je ne jugeai qu'une partie du produit étoit de l'air fixe que par la maniere dont l'eau l'abforboit. Mais quelque peu fûre que soit cette épreuve, une personne très-exercée dans les expériences de ce genre fera en état de l'appliquer avec une certitude suffisante dans la plûpart des cas. Cependant ayant répété cette expérience lorsque je me fus procuré les phioles de verre à bouchon de crystal tubulé, je trouvai que la plus grande partie de cet air étoit sans contredit de l'air fixe qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux, aussi-bien que tout autre air fixe; & que le restant étoit fortement nitreux. J'essayai aussi dans le même-tems de recevoir

l'air dans le mercure. Il s'éleva beaucoup de vapeurs de l'esprit de nitre, qui, dissolvant le mercure, rendirent le produit d'air presque entièrement nitreux.

Une fois, m'étant servi d'une phiole à bouchon de crystal pour la production de cet air, j'observai qu'après la première période du procédé, pendant laquelle je n'avois point appliqué de chaleur, & j'avois obtenu un produit d'air, l'eau reflua dans la phiole. D'après cela, j'appliquai la flamme d'une chandelle au mélange ainsi étendu d'eau; & ayant obtenu un second produit d'air, je les examinai séparément. Tous deux contenoient une grande portion d'air fixe qui précipitoit très-bien la chaux de l'eau de chaux; & lorsque j'en eus séparé l'air fixe par le lavage, ils diminuèrent l'un & l'autre l'air commun; mais le premier ne le diminua pas autant que le dernier: deux parties d'air commun & une de ce dernier, occupèrent l'espace d'un peu plus de deux parties.

Pour juger de la quantité d'acide que pouvoit contenir cet air tiré de l'esprit de nitre & de l'huile de térébenthine,

j'y introduisis de l'air alkalin ; il se forma à l'instant un nuage blanc qui s'éleva au sommet du vaisseau ; mais il n'étoit pas à beaucoup près aussi dense que celui qu'on produit en mêlant de l'air alkalin avec quelque'un des airs acides. Et bien loin que la quantité des deux airs disparût, il en resta jusqu'à la moitié. Cependant tout l'intérieur du tube fut couvert d'une substance saline que je n'examinai point ; mais je supposai que c'étoit du *nitre ammoniacal*. Ayant eu la curiosité de plonger dans l'air restant de ce mélange une chandelle allumée qui se trouvoit sous ma main , je trouvai qu'il étoit inflammable, même jusqu'à faire une explosion considérable , mais non pas tout-à-fait aussi forte que celle qu'avoit faite une quantité d'air nitreux phlogistique , dont j'ai fait mention dans mon premier vol. p. 283.

Quelque tems après je répétai cette expérience : environ un quart du mélange de l'air dont il s'agit avec l'air alkalin disparut à mesure qu'ils se mêlerent. La moitié du restant fut absorbée par l'eau ; & une chandelle brûla

avec une belle flamme agrandie dans ce second résidu qui , par sa rougeur , lorsqu'il fut exposé à l'air libre , parut être considérablement nitreux.

Dans ces deux cas , l'air alkalin doit avoir fourni à l'air nitreux le phlogistique , comme le fer & le foie de soufre le lui avoient fourni dans les autres occasions , & par ce moyen l'avoir mis en état de faire brûler une chandelle de la même maniere. Car les deux airs , qui composoient celui dont il s'agit , & qui étoient l'air fixe & l'air nitreux , ne sont inflammables ni séparément ni ensemble. Ce qu'il y a cependant à remarquer , c'est que si je mêlois d'égales quantités d'air nitreux & d'air alkalin , & si j'examinois tout de suite le mélange , l'air nitreux paroïssoit n'avoir pas été du tout affecté par l'air alkalin ; il n'étoit pas inflammable au moindre degré. Je m'étois imaginé que de cette maniere aussi l'air alkalin auroit pu phlogistiquer l'air nitreux ; mais il paroît qu'il n'en est rien.

L'air que donnent toutes les *huiles essentielles* par le moyen de l'esprit de nitre a , je crois , les mêmes propriétés.

que celui qu'on obtient avec l'huile de térébenthine. J'en éprouvai une autre (j'ai oublié quelle c'étoit) dans une phiole à bouchon de crystal ; & l'air qui en provint précipita la chaux de l'eau de chaux ; éteignit une chandelle , & diminua un peu l'air commun.

L'éther, tant vitriolique que nitreux , chauffé dans l'esprit de nitre , donne la même espece d'air que les huiles essentielles ou que l'esprit de vin : favoir, en partie de l'air fixe , & en partie de l'air nitreux phlogistique ; & il faut user des mêmes précautions en conduisant cette expérience ; car les phénomènes qui l'accompagnent ne cèdent point en violence à ceux que j'ai décrits au commencement de cette section : c'est pourquoi je suis d'avis d'employer une très-petite quantité d'éther , & de la verser sur l'esprit de nitre.

Cependant la première fois que je fis cette expérience , j'imitai le procédé qu'on suit pour faire l'éther nitreux. Je versai l'esprit de nitre sur l'éther vitriolique , comme j'avois fait aussi dans les commencemens avec l'esprit de vin ; & faisant chauffer le mélange , je reçus

l'air qu'il donna en abondance , dans le mercure. Cet air ne fit point de nuage quand j'y mêlai de l'air alkalin ; il brûla exactement comme la vapeur de l'éther même. Mais la force de l'ébullition ayant fait passer dans le mercure une partie du mélange , l'air qui avoit été produit fut rapidement absorbé.

Ayant des raisons suffisantes pour désapprouver ce procédé , j'eus recours à l'autre , & je trouvai que si je versois peu d'éther sur de l'esprit de nitre très-affoibli , l'expérience étoit beaucoup plus maniable , & l'air étoit produit en quantité suffisante. L'eau absorboit promptement cet air. J'y mis de l'air alkalin : un nuage très-léger s'éleva au sommet du vaisseau ; mais cela n'occasionna point de diminution sensible dans la quantité d'air. Une chandelle plongée dans cet air s'y éteignit plusieurs fois ; mais toujours avec une belle flamme bleue , beaucoup plus grande que sa flamme naturelle. Vers la fin de l'expérience , l'air dans l'intérieur du vaisseau devint rouge , signe certain qu'il étoit considérablement nitreux. En répétant toute cette expérience lorsque je me

fus procuré les phioles à bouchons de crystal tubulés , je m'assurai de la maniere la plus satisfaisante qu'une partie de ce produit d'air étoit de l'air fixe : car il précipitoit la chaux de l'eau de chaux ; & que le restant étoit de l'air nitreux presque aussi fort qu'il puisse être , à en juger par sa propriété de diminuer l'air commun.

La même expérience réussit avec l'*éther nitreux* , de même à tous égards qu'avec l'*éther vitriolique*. J'en fis l'épreuve parce qu'on auroit pu s'attendre qu'il y auroit quelque différence dans le résultat , attendu que l'*éther nitreux* est un produit de ce même esprit de nitre avec lequel je le mêlois dans ce procédé.

L'esprit de nitre chauffé avec l'*huile d'olives* donne la même espece d'air qu'avec les huiles essentielles , &c. mais le procédé est excessivement embarrassant à cause de la tenacité de l'huile , & il n'est pas beaucoup plus maniable lorsqu'on ne met que très-peu d'huile sur une grande quantité d'esprit de nitre affoibli. L'air que j'obtins de cette ma-

niere précipita la chaux de l'eau de chaux.

Ce fut avec grande difficulté que j'obtins une très-petite quantité d'air de l'esprit de nitre & du *suif*, dans une phiole à bouchon de crystal, parce que l'eau se précipitoit dans la phiole après chaque jet d'air. Cet air précipitoit la chaux de l'eau de chaux.

Le résultat de cette expérience fut le même avec la *cire* qu'avec le *suif*. Ayant mis un petit morceau de cire sur une quantité d'esprit de nitre assez fort, j'obtins de l'air qui troubla l'eau de chaux; mais je n'en eus pas assez pour déterminer ses autres propriétés. Ce procédé fut aussi difficile que le précédent, à cause de l'irruption de l'eau dans la phiole après chaque jet d'air.

J'eus la curiosité d'essayer si par le même procédé quelques-unes des *gommes*, &c. me fourniroient de l'air; & je trouvai que le résultat principal fut le même que celui des expériences précédentes.

La *gomme arabique* se dissout aisément dans l'acide nitreux, & à mesure que

la dissolution se fait, il en sort une grande quantité d'air, & l'expérience est très-agréable à la vue; mais lorsque l'acide est près d'être saturé, il devient visqueux, & le vaisseau se remplit d'écume. Partie du produit étoit de l'air fixe qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux, & qui étoit promptement absorbé par l'eau: le restant étoit de l'air nitreux presque aussi fort qu'il puisse l'être.

Le résultat fut le même avec la *gomme copale*, à cela près que cette substance ne s'enfonçoit pas dans l'esprit de nitre, comme avoit fait la gomme arabique.

Le *camphre* avec l'esprit de nitre affoibli donna de l'air nitreux très-fort; Mais il exigea pour cet effet un degré de chaleur considérable. Une assez grande portion du camphre qui s'étoit liquescée, & qui nâgeoit à la surface de l'esprit de nitre, monta par le tube, & reprit sa forme naturelle dans l'eau. Je n'examinai pas si quelque partie du produit étoit de l'air fixe.

L'*ambre* traité avec l'esprit de nitre me donna de l'air qui précipita la chaux

de l'eau de chaux. Mais il étoit en trop petite quantité pour que je pusse le soumettre à d'autres épreuves. Dans la suite, j'en obtins une plus grande quantité d'un plus grand nombre de petits morceaux d'ambre, que je chauffai avec de l'esprit de nitre foible, dans une phiole à bouchon de crystal. Environ un tiers de ce produit étoit de l'air fixe qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux, & qui étoit promptement absorbé par l'eau. Une chandelle brûla avec une flamme agrandie & verdâtre dans le résidu qui diminua aussi l'air commun, de maniere que deux parties d'air commun & une de celui dont je parle occuperent l'espace de deux & un quart.

N. B. Dans cette expérience, la plupart des morceaux d'ambre devinrent entièrement noirs, tandis que les autres conserverent leur couleur naturelle.

Dans le cours de ces expériences, un morceau de *cire à cacheter* tomba dans la phiole, & j'observai qu'il en sortit de l'air très-abondamment. Sur cela, je mis un morceau de *cire à cacheter* dans la phiole avec de l'esprit de nitre, & je reçus l'air à différentes reprises. Celui
qui

qui vint le premier étoit nitreux au plus haut degré. Mais ayant appliqué une plus grande chaleur, j'occasionnai une production copieuse d'une espèce d'air très-trouble, qui cependant devint transparent tout de suite, & qui affecta à peine l'air commun. Il fut ensuite assez promptement absorbé par l'eau; & quoiqu'il eut éteint d'abord une chandelle, dès qu'il eut été lavé dans l'eau, une chandelle brûla dans cet air avec une flamme bleue. A la vérité lorsque la chandelle s'y étoit éteinte, la flamme avoit pris cette couleur. On verra que la même expérience est analogue pour sa marche, avec celles que j'ai faites sur d'autres *substances solides* contenant du phlogistique, & que je vais rapporter ici, quoique plusieurs d'entr'elles eussent été faites avant celle dont je viens de parler.

Ayant trouvé que le *charbon* se dissolvoit dans l'huile de vitriol, & donnoit par ce moyen un air acide vitriolique, j'eus la curiosité d'essayer de le dissoudre dans l'esprit de nitre, & de voir quel seroit l'effet de cette tentative. J'étois peu avancé pour lors

dans les expériences dont je viens de rendre compte sur les substances huileuses & gommeuses, & je ne favois à quel résultat je devois m'attendre. Je commençai par recevoir le produit dans le mercure, comme j'avois reçu celui de l'acide vitriolique. Mais tout ce qui s'éleva de cette manière ne fut que la vapeur acide nitreuse, qui se saisissant du mercure produisit de l'air nitreux.

Après cela, je reçus le produit dans l'eau, & je trouvai que c'étoit de véritable air nitreux presque aussi fort qu'on puisse le tirer des métaux. Je fus fort surpris de ce résultat dans ce tems-là, parce que je m'étois imaginé qu'on ne pouvoit obtenir l'air nitreux que par la dissolution des métaux dans l'esprit de nitre; & je considérai cette propriété comme un trait de ressemblance de plus entre les métaux & le charbon, outre ceux que j'avois remarqués auparavant; on peut en voir le détail dans un mémoire, qui a déjà paru dans les Transactions Philosophiques de la Société Royale de Londres, & que j'ai inféré à la fin de ce volume. Mais d'abord après cette expérience, je tirai

de l'air nitreux également fort, de plusieurs autres substances dures ; telles que le *bois sec* de différente espèce, &c. mais dans ces procédés, le *dégré de chaleur* qu'on applique, & d'autres circonstances font varier excessivement la qualité de l'air. Ce sujet mérite d'être approfondi. Pour y contribuer, je vais rapporter les principaux faits de ce genre qui se sont offerts à mon observation.

Ayant versé sur du *charbon en poudre* environ un quart de mesure d'esprit de nitre fumant, mêlé avec une égale quantité d'eau, & y ayant appliqué la flamme d'une chandelle, je recueillis une grande jarre pleine d'air, faisant en tout vingt-huit mesures. Lorsqu'environ la moitié de cette quantité d'air eut été produite, il fut impossible d'appliquer plus de chaleur sans que l'esprit de nitre montât dans la jarre. Lorsque toute la liqueur, qui avoit pris une couleur noire foncée, fut montée, l'application d'une forte chaleur produisit le dernier quart de la quantité d'air. L'air de ce produit entier que je ne reçus pas en différentes portions ;

étoit fortement nitreux , car deux parties d'air commun & une de celui dont je parle n'occupèrent que l'espace de deux parties.

Ce fut en voyant cet air produit dans des circonstances différentes : savoir , avant qu'aucune portion d'acide ne montât , & après qu'il en fut monté , que je reconnus l'importance de prendre l'air à différentes fois , suivant le changement des circonstances de sa production. C'est une idée que j'ai suivie dans la suite avec grand avantage , comme le Lecteur l'a déjà vu , & le verra encore dans le cours de mes expériences.

Je répétois dans cette vue le même procédé ; j'examinai le premier produit d'air qui s'éleva pendant que la chaleur étoit très-moderée , & je trouvai que c'étoit de l'air nitreux presque aussi fort que celui qu'on obtient par le moyen des métaux. Vers la fin , j'augmentai la chaleur , & je produisis alors de l'air très-trouble dont je recueillis une quantité prodigieuse ; quelquefois cependant l'air étoit tout-à-fait transparent , & ensuite il étoit trouble de nou-

veau : ce qui arriva plusieurs fois. Je tâchai de recevoir séparément l'air trouble & l'air transparent, & j'y réussis assez bien ; mais je les trouvai tous deux de la même qualité , éteignant une chandelle , & ne diminuant que très-peu l'air commun ; car deux parties d'air commun & une de celui dont il s'agit occupoient l'espace d'un peu moins de trois.

Je me servois alors des phioles représentées fig. *a* , avec des bouchons ordinaires ; mais voyant que ces bouchons étoient toujours beaucoup corrodés dans ces expériences , je pensai qu'il seroit à propos de déterminer l'effet de l'esprit de nitre sur le *liège* , afin d'avoir égard autant qu'il le falloit à cette circonstance , dans les expériences à venir. Je versai en conséquence une quantité d'esprit de nitre sur quelques morceaux de liège , & l'ayant traité de la manière que j'ai rapportée ci-dessus , je trouvai que le produit d'air répondoit très-exactement à celui que j'avois obtenu du charbon. Avec un degré modéré de chaleur , l'air étoit fortement nitreux , & avec une grande chaleur , l'air étoit

trouble & beaucoup moins nitreux. Je ne fus pas peu surpris que le liège produisît de l'air nitreux , car cela détruiroit mon systême « que le charbon ne produisoit cet air qu'en vertu d'une propriété commune au charbon & aux métaux ». Mais je trouvai bientôt que je pouvois obtenir de véritable air nitreux d'un grand nombre d'autres *substances dures* ; je n'avois pas découvert encore qu'on peut le tirer de certaines substances liquides.

Il y eut un rapport assez frappant entre une expérience que je fis avec de vieux bois de chêne sec , & celle que j'avois faite avec le charbon , enforte que l'une peut répandre un peu de jour sur l'autre.

Je mis environ une demi-mesure de rapure de *vieux chêne sec* dans une des phioles , fig. *a* , dont j'ai parlé , & je versai par-dessus environ autant d'esprit de nitre étendu de moitié d'eau qu'il en falloit pour bien humecter cette rapure. Il y eut de l'air produit à l'instant sans l'application de la chaleur. Je reçus cet air conjointement avec une petite quantité qui fut produite par la chaleur de la flamme d'une chandelle , que je

tenois à côté de la phiole , à environ un quart de pouce de distance. Je plaçai ensuite la chandelle plus près , & je reçus l'air en cinq différentes portions : l'avant-dernière lorsque la flamme touchoit le côté de la phiole , & la dernière lorsque la chandelle fut placée immédiatement au-dessous , & après qu'il parut qu'il ne restoit plus d'humidité dans la phiole. Le premier produit étoit de la nature de l'air nitreux ; les deux suivans étoient beaucoup plus nitreux , & presque aussi fortement qu'il se puisse ; mais les deux derniers l'étoient à peine. Une chandelle s'éteignit dans cet air , & la flamme présenta une couleur bleuâtre comme si on l'eût mise dans un mélange d'air inflammable , d'air nitreux & d'air fixe. Il me parut qu'une partie de ce produit étoit de l'air fixe , parce qu'il fut promptement absorbé par l'eau ; mais je n'y appliquai pas l'épreuve de l'eau de chaux.

Voyant cette différence étonnante dans les produits d'air qu'on obtient de l'esprit de nitre , en y ajoutant soit différentes substances , soit la même dans différentes circonstances , je m'imaginai

qu'il seroit possible de distinguer par ce moyen les substances qui sont *nutritives*, de celles qui ne le sont pas; & mon imagination me portoit même à penser qu'il seroit possible de déterminer, par la qualité & la quantité de l'air que produisent différentes substances, la *quantité de nourriture* que ces mêmes substances pourroient fournir. Mais les expériences n'ont nullement répondu à des espérances aussi peu fondées. Je trouvai cependant ce que je n'attendois pas : savoir, une différence très-remarquable entre l'air produit par le moyen de plusieurs sortes de *substances animales*, & celui qu'on obtient par le moyen des *végétaux*; car le premier n'avoit communément qu'à un foible degré la propriété nitreuse, au lieu que le dernier, quoiqu'on se fût servi de végétaux nutritifs pour le former, étoit semblable à l'air que j'avois obtenu par le moyen du bois ou du charbon. Les faits que j'observai me surprirent beaucoup, & je ne puis donner à mon Lecteur aucun fil qui puisse le conduire dans ce labyrinthe.

Les substances végétales que j'éprou-

vai furent la *farine de bled*, l'*orge* & la *drêche*. Elles donnerent toutes de l'air nitreux dans la premiere période du procédé, & ensuite, (si le procédé étoit continué long - tems & avec une forte chaleur) de l'air de la même qualité que le dernier produit du charbon. J'avois soupçonné que la qualité nitreuse pouvoit provenir du liége qui bouchoit la phiole ; mais je fus assuré qu'il venoit de la substance qu'elle contenoit, lorsqu'au lieu d'une phiole bouchée avec du liége comme auparavant, je me servis d'une de celles représentées fig. *b*, qui sont, comme je l'ai dit, de l'invention de M. Vaughan. Ayant mis l'orge & l'esprit de nitre dans une de ces phioles, je la fis chauffer dans un vaisseau plein d'eau placé sur le feu, & je la couvris avec une jarre de verre pleine d'eau pour recevoir l'air. Celui que j'obtins de cette maniere étoit encore fortement nitreux, quoiqu'il ne pût venir que de l'esprit de nitre & de l'orge.

Comme je fis attention à quelques circonstances accessoi res dans l'expérience où j'employai la *drêche*, il ne s'en

peut-être pas inutile d'en rapporter les particularités. Ayant mis sur un scrupule de drêche ce qu'il falloit d'esprit de nitre affoibli pour le couvrir, je le fis bouillir, & j'en retirai deux jarres pleines d'air, contenant chacune près de trente mesures ; j'aurois pu en ramasser davantage. Celui qui vint le premier, & qui étoit transparent, diminua l'air commun presque autant qu'auroit pu faire l'air nitreux le plus fort. L'air qui vint le dernier, & qui étoit trouble, diminuoit à peine l'air commun, & fut promptement absorbé par l'eau. Avant que je l'eusse agité dans l'eau, il éteignoit une chandelle ; mais lorsqu'il fut réduit à environ un quart de sa quantité primitive, une chandelle brûla dans cet air avec une flamme bleue qui sembloit lécher celle de la chandelle.

N. B. Vers la fin de ce procédé, une partie des matériaux contenus dans la phiole fut réduite en charbon.



SECTION VIII.

De l'air produit par la dissolution des substances animales dans l'esprit de nitre.

JE ne prétends point être en état de rendre raison de la différence qui se trouve entre les produits d'air qu'on obtient par le moyen des substances *animales*, & ceux que fournissent les *végétaux*; mais si l'on compare les expériences que je vais rapporter dans cette Section avec celles qu'on vient de lire dans la précédente, on verra que cette différence existe, & qu'elle est en général très-considérable.

On a vu que les substances végétales dissoutes dans l'esprit de nitre donnent, indépendamment de l'air fixe, une quantité d'air nitreux, qui souvent est aussi fort que celui qu'on obtient par la dissolution des métaux dans le même acide; & cela arrive aussi-bien quand l'esprit de nitre est très-concentré, que

quand il est très-affoibli. Au contraire, les substances animales en général, traitées de la même manière, donnent à peu près la même quantité d'air fixe, dont le résidu n'est que peu ou point du tout nitreux, si ce n'est dans quelques occasions où l'esprit de nitre est très-fort; & ce résidu est une espèce d'air, qui n'affectant l'air commun, ni n'étant affecté par l'air nitreux, & éteignant une chandelle, peut s'appeler proprement de *l'air phlogistique*. A la vérité, lorsque par le moyen d'une forte chaleur vers la fin du procédé, la production de l'air est très-rapide, & qu'il est rempli de nuages, on le trouve légèrement inflammable, ainsi que l'air retiré des substances végétales dans les mêmes circonstances; & il présente une flamme verdâtre ou bleuâtre, qui semble lécher celle de la chandelle dont on se sert pour y mettre le feu.

Comme il y a dans les résultats de ces procédés une variété considérable, qui dépend sans doute de plusieurs circonstances dont je n'ai pu découvrir l'influence, j'ai eu soin de noter tout ce qui dans ces procédés m'a paru de-

voir être de quelque importance ; mais malgré ce soin , il est très-possible que j'aie omis des choses dont je ne connoissois pas la valeur , & par conséquent ceux qui voudront reprendre d'après moi ces expériences , pourront bien ne pas trouver précisément les mêmes résultats que moi. Cet inconvénient aura lieu fréquemment dans des recherches expérimentales aussi nouvelles que le sont celles-ci ; & comme aucun soin humain n'a encore été suffisant pour le prévenir , j'espère que les bons esprits y auront égard , & ne m'en sauront pas mauvais gré.

Quoi qu'il en soit , je ne puis m'empêcher de me flatter que ces expériences , si elles étoient bien suivies , seroient un moyen de répandre quelques lumières sur les deux procédés naturels de la *végétation* & de l'*animalisation* , puisqu'elles présentent une différence nouvelle & frappante entre les substances formées par ces procédés. Par cette raison , je les recommanderois volontiers à l'attention particulière des Chymistes & des Médecins. Voici les expériences

mêmes à peu-près dans l'ordre que je les ai faites.

Je mis de l'esprit de nitre avec une égale quantité d'eau sur quelques morceaux de viande de *bœuf*, que j'avois desséchés jusqu'à ce qu'ils fussent parfaitement durs, sans cependant les brûler. Je reçus le premier produit d'air qui s'éleva sans que j'eusse appliqué la chaleur, & qui fut très-considérable. Je reçus ensuite celui qui s'éleva lorsque j'eus placé la flamme d'une chandelle à environ un quart de pouce de la phiole ; mais ni l'un ni l'autre n'affecta l'air commun d'une manière sensible. Ils furent tous deux assez promptement absorbés par l'eau, & éteignirent une chandelle. Je m'attendois que cet air, ainsi que celui du bois sec, seroit de l'air nitreux.

J'avois fait cette expérience avec la partie charnue d'un *muscle* ; je pris un *tendon* du col d'un veau, parce que sa texture plus solide me fit imaginer que l'air qu'il fourniroit approcheroit davantage de celui du bois. Mais l'air qui en provint ne diminua l'air commun, ni

ne fût diminué par l'air nitreux ; il ne fût pas promptement absorbé par l'eau , & il éteignit une chandelle. C'étoit , à ce qu'il parut , assez exactement la même chose que l'air commun phlogistique.

Je pensai qu'il pourroit y avoir quelque différence à cet égard , entre l'air produit par le moyen de la chair *blanche* , & celui que fournit la chair *noire* des animaux ; mais en ayant fait l'expérience avec la poitrine & avec la cuisse d'un coq d'Inde , je n'y en trouvai aucune. L'air que donnerent ces substances ressembloit exactement à l'air que j'avois tiré du tendon de veau , si ce n'est qu'il fut plus promptement absorbé par l'eau. J'en agitai une quantité dans l'eau pendant cinq minutes ; il y en eut un quart d'absorbé ; mais le restant éteignoit encore une chandelle , & ne différoit de ce qu'il étoit auparavant, qu'en ce qu'il fut alors diminué par l'air nitreux comme toutes les autres espèces d'air qu'on a agitées dans l'eau. Lorsque toute la chair fut dissoute , l'application de la flamme d'une chandelle excita encore une production abondante d'air , qui

vint très-trouble au commencement ; mais il n'étoit pas d'une qualité sensiblement différente de celle de l'air que j'avois d'abord recueilli , & qui étoit transparent.

Je répétois cette expérience , elle me donna le même résultat , & j'observai que l'opacité de l'air dépendoit du *dégré de chaleur* auquel il se dégageoit ; car après avoir obtenu une grande quantité d'air trouble , je diminuai la chaleur , & aussitôt l'air fut transparent comme au commencement ; j'augmentai la chaleur , & l'air fut trouble de nouveau.

N'ayant point tiré d'air de l'espece nitrée en employant la chair d'un *quadrupède* , & celle d'une *volaille* , je voulus essayer quel seroit le produit de la chair des *poissons* , des *insectes* , & des animaux *dépourvus de sang*.

J'obtins une grande quantité d'air de la chair de *saumon* exactement desséchée , & dissoute dans l'esprit de nitre , sans chaleur d'abord , jusqu'à ce que la chair fût presque entièrement dissoute. Après cela , environ un quart de mesure de cette dissolution donna en-

core plus d'une pinte d'air. A la fin, cette liqueur, qui étoit assez claire, devint subitement opaque, & ce fut dans cet état qu'elle donna la plus grande abondance d'air; & elle continua d'en donner jusqu'à ce que, toute l'humidité étant évaporée, elle devînt un charbon sec. Pendant qu'elle étoit claire, une forte chaleur, que j'occasionnois en appliquant la flamme d'une chandelle contre la phiole, rendoit tout de suite l'air trouble, sur-tout vers la fin du procédé, immédiatement avant que la liqueur devînt opaque. Cependant l'air qui étoit alors dans l'intérieur de la phiole ne paroissoit point trouble, on n'y voyoit que les vapeurs rouges de l'esprit de nitre; mais lorsque la liqueur devint opaque, la phiole se remplit de vapeurs blanches très-épaisses.

L'air dans toutes les périodes de cette expérience étoit en partie fixe; car il précipitoit la chaux de l'eau de chaux. Dans le milieu du procédé le résidu étoit nitreux; mais seulement à un degré très-léger. Vers la fin il n'avoit point d'effet sensible sur l'air commun, & à

la fin il brûloit avec une flamme bleue ; qui sembloit lécher celle de la chandelle, & qui duroit un tems considérable après que j'avois retiré la chandelle. L'air qui étoit monté immédiatement avant le dernier produit éteignit une chandelle, dont la flamme dans cet instant parut simplement entourée d'une autre flamme légère, & de couleur bleue.

Ayant répété cette expérience, je ne trouvai rien de nitreux, ni dans le premier produit d'air avant que la chair fût dissoute, ni dans les suivans ; & à cette fois, j'eus un soin particulier de n'employer aucune partie de la chair qui fût devenue noire ou très-brune dans la dessication, parce que j'avois quelque soupçon que la propriété nitreuse de l'air, dans l'expérience précédente, provenoit des portions de la chair qui s'étoient trouvées réduites en une espèce de charbon.

La chair du saumon ayant beaucoup de couleur & de goût, je jugeai qu'il ne seroit pas hors de propos de répéter la même expérience avec quelque autre espèce de poisson dont la chair fût blanche & sans goût. Je pris en consé-

quence de la *chair de perche* ; & l'ayant dissoute dans l'esprit de nitre , j'obtins une grande quantité d'air dont aucune portion n'étoit nitreuse , mais dont une partie considérable étoit de l'air fixe , qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux. La plus grande partie de cet air s'éleva après que la chair fut dissoute , & à la fin , lorsque j'augmentai la chaleur , l'air s'élevoit trouble ; mais il ne différoit pas sensiblement de celui qui s'étoit élevé au commencement , si ce n'est en ce qu'une chandelle qu'il éteignit présenta une flamme d'un verd léger , à l'instant de son extinction.

Un gros *ver* traité de la même manière donna de l'air , qui étoit fixe en partie , car il troubla l'eau de chaux. Le résidu éteignit une chandelle , & parut légèrement nitreux : ce qui venoit peut-être de quelque matière qui étoit restée dans l'estomac du ver ; car j'en avois seulement exprimé avec mon doigt ce qu'il contenoit.

L'air que produisirent quelques *guêpes* dissoutes dans l'esprit de nitre étoit en partie de l'air fixe , & le résidu étoit nitreux au point que deux parties d'air

commun , & une de cet air , occuperent l'espace de deux & demie. Je plongeai dans cet air une chandelle allumée , il présenta une flamme verdâtre qui sembloit lécher celle de la chandelle.

J'eus ensuite la curiosité d'essayer quelle espece d'air on pourroit tirer des *excroissances insensibles du corps animal* , comme *cornes* , *poils* , *plumes* , &c. qui végétant au dehors du corps , semblent au premier coup d'œil , constituer une sorte d'état intermédiaire entre les substances végétales & les substances animales. Mais il me parut qu'elles tiennent plus de la nature animale que de la nature végétale : du moins à en juger par l'espece d'air que m'avoient fourni jusques-là ces substances.

Des *poils* avec de l'esprit de nitre me donnerent une quantité d'air dont partie étoit fixe , précipitant la chaux de l'eau de chaux ; & ce que l'eau n'absorbap pas , & qui faisoit environ les deux tiers du total , étoit nitreux à un foible degré.

Une *plume de corneille* me fournit de l'air de même qualité que celui que

m'avoient donné les poils dans l'expérience précédente. Cette plume étoit noire; les poils dont je m'étois servi étoient noirs aussi en partie: cela me fit penser qu'il étoit possible que la propriété nitreuse de l'air provint du phlogistique qui produisoit cette couleur, & je répétois cette expérience avec une *plume blanche*; mais le résultat fut le même: ou plutôt, l'air fut plus nitreux dans ce cas que dans le premier. Deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de deux & demie. Il paroîtra probable, par les expériences qui se trouvent à la fin de cette Section, que si j'eusse employé de l'esprit de nitre très-foible, ce produit auroit été moins nitreux.

Je me procurai de l'air avec facilité, en dissolvant de la *corne* dans l'esprit de nitre. Une partie de cet air étoit de l'air fixe, qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux; mais il en resta une très-grande partie que l'eau n'absorba point. Il n'y eut rien de sensiblement nitreux dans ce résidu. Le produit d'air qui s'étoit élevé le premier éteignoit une chandelle sans aucun phénomène particulier; mais

dans celui qui étoit venu le dernier ; elle brûloit avec une belle flamme bleue qui sembloit lécher la sienne.

J'avois cru que l'intérieur d'une *écaille d'huître*, ou d'une *nacre*, pourroit donner, outre l'air fixe, une quantité d'air phlogistique, pareil à celui qui avoit été produit dans les expériences précédentes ; mais lorsque je fis dissoudre ces substances dans l'esprit de nitre, elles donnerent l'une & l'autre de l'air fixe très-pur, dont le résidu n'étoit pas plus considérable que celui de l'air fixe qu'on obtient en dissolvant de la craie dans l'huile de vitriol.

Je mis des morceaux d'*ivoire* dans de l'esprit de nitre que je fis chauffer ; la dissolution se fit d'une manière très-agréable à voir, & elle produisit une grande quantité d'air qui, dans toutes les périodes du procédé, précipita la chaux de l'eau de chaux ; le résidu n'étoit pas nitreux, & il éteignit une chandelle sans que la flamme prît de couleur particulière.

Pour éprouver la différence qui se trouve entre une substance dans son état naturel, & la même substance après

qu'elle a été réduite en charbon par le feu, je fis dissoudre du *charbon d'ivoire* dans l'esprit de nitre, & je trouvai qu'il donnoit quantité d'air, dont la plus grande partie étoit fixe, & dont le résidu étoit considérablement nitreux. Lorsque la production de l'air étoit très-rapide, l'intérieur de la phiole se remplissoit d'une vapeur blanche. J'avois tenu cet ivoire rouge embrasé pendant environ une heure dans du sable.

Quoique les *œufs* ne doivent point être rangés parmi les substances dont je viens de faire mention, comme ils sont le produit d'un animal sans en faire proprement partie, je rapporterai ici les expériences auxquelles je les ai soumis. Le *blanc* & le *jaune* d'un œuf, que j'essayai séparément, dissous dans l'esprit de nitre fournirent une quantité d'air considérable; il n'y eut point de différence sensible entre eux. Dans ces deux cas, partie de l'air étoit fixe, précipitant la chaux de l'eau de chaux, & le résidu étoit nitreux au point que deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de deux & demie.

Il me vint en idée que d'autres parties de l'animal, & les diverses *secrétions* animales donneroient peut-être une espèce d'air différente de celle que les muscles avoient fournie, & d'après le peu que j'ai fait à ce sujet, je ne puis m'empêcher de penser que ces expériences méritent d'être poussées plus loin.

Le *crassamentum* du sang avec l'esprit de nitre me donna une grande abondance d'air dont partie étoit fixe, mais qui n'avoit rien de nitreux. A la fin, l'air étoit trouble; &, comme c'est l'ordinaire dans ce cas, il y en avoit une plus grande portion de fixe. Vers la fin aussi, lorsque le sang fut complètement dissous, la production de l'air fut irrégulière; car après un intervalle d'environ un quart de minute, il y avoit une interruption subite d'à-peu-près un quart de mesure d'air. Mais entre ces intervalles, la production étoit uniforme.

L'esprit de nitre versé sur le *serum* du sang le réduit sur le champ en un *coagulum* blanc. Cette substance donna moins d'air que la plupart des autres substances que j'avois soumises au même

même procédé. Partie de l'air étoit fixe , précipitant la chaux de l'eau de chaux. Le résidu n'étoit pas nitreux , & il éteignoit une chandelle fans aucun phénomène particulier.

Le *lait* fut aussi coagulé sur le champ par de fort esprit de nitre que j'y mêlai. Il donna de l'air dont un tiers étoit fixe , précipitant la chaux de l'eau de chaux , & le restant étoit nitreux au point que deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de deux & demie.

Du *fromage* , qui étoit assez vieux , me fournit de l'air , dont une grande partie étoit fixe , & le restant étoit considérablement nitreux.

Le *jus de mouton* avec de fort esprit de nitre ne donna que peu d'air , peut-être vingt fois son volume ; c'étoit en partie de l'air fixe , & le résidu n'étoit pas sensiblement *nitreux*.

On a vu , dans une des Sections précédentes , que toutes les *matieres huileuses* de nature végétale donnent de l'air nitreux en très-grande abondance , & que la production de cet air est extrêmement rapide ; enforte qu'il faut beau-

coup de précaution dans la conduite des expériences. D'après cela je commençai avec les mêmes précautions mes tentatives pour obtenir de l'air du *sain-doux* ; mais je trouvai que ces précautions étoient tout-à-fait inutiles ; car cette substance n'est que peu affectée par l'esprit de nitre très-fort & très-chaud, sur la surface duquel elle demeure fluide, & ne donne que peu d'air : savoir, à peu-près quatre fois son volume. Cet air étoit en partie de l'air fixe, qui précipitoit la chaux de l'eau de chaux, & le restant étoit nitreux au point que deux parties d'air commun & une de cet air occupoient l'espace de moins de deux parties ; c'est-à-dire, qu'il étoit presque aussi fortement nitreux que celui qu'on tire des métaux.

Il est à remarquer que de toutes les substances animales que j'ai soumises à cette expérience, celle qui semble être la plus éloignée de la nature végétale, s'en approche le plus relativement à l'air qu'elle fournit lorsqu'on la dissout dans l'esprit de nitre. C'est la *substance médullaire du cerveau*.

Une portion de *cervelle de mouton*

dissoute dans de fort esprit de nitre me donna une quantité d'air dont environ la moitié étoit fixe, précipitant la chaux de l'eau de chaux, & le restant étoit si nitreux que deux parties d'air commun, & une de celui dont il s'agit, occupèrent l'espace de deux & un quart. Lorsque la cervelle fut complètement dissoute, ayant appliqué une forte chaleur, je fis élever de l'air très-trouble, dans lequel une chandelle brûla avec une flamme verdâtre, qui sembloit lécher celle de la chandelle.

Je répétais cette expérience avec une portion de la même cervelle *bouillie*, & j'eus le même résultat; mais je ne continuai pas le procédé si long-tems. Le résidu de cet air, après que j'en eus retiré l'air fixe par le lavage, étoit si nitreux, que deux parties d'air commun & une de cet air occupèrent l'espace de deux & un cinquième: ce fut du moins ce que j'éprouvai avec la dernière des trois portions d'air que je recueillis. La première & la seconde n'étoient pas si fortement nitreuses, & cependant je suis persuadé que les trois portions étoient entièrement composées du

produit de la dissolution ; car la phiole & le tube étoient remplis de bulles en forme d'écume, avant que je commençasse à retenir l'air.

Après que j'eus fait ces expériences, il me vint en idée qu'il se pouvoit que cette différence dans les produits d'air, que fournissoient les substances végétales & animales, provînt de quelque différence dans l'esprit de nitre ; mais quoique j'aie trouvé que le plus ou le moins de concentration de l'acide occasionne une différence réelle dans l'air ; la principale dépend des substances mêmes qu'on emploie, ainsi qu'on le verra dans les expériences suivantes.

Un morceau de *mouton bouilli*, dissous dans de l'esprit de nitre très-fort, donna de l'air qui étoit en partie fixe, avec un résidu si nitreux que deux parties d'air commun & une de cet air occuperent l'espace de deux & un tiers. Ayant dissous un morceau de la même chair dans le même esprit de nitre affoibli par une égale quantité d'eau distillée, j'obtins de l'air qui n'étoit pas la moitié aussi nitreux que celui de l'ex-

périence précédente. J'eus le même résultat lorsque je fis la même expérience avec un *blanc d'œuf*, qui me donna de l'air beaucoup moins nitreux, lorsque je le fis dissoudre dans l'esprit de nitre affoibli, que lorsque j'employai de très-fort esprit de nitre, comme dans le premier cas.

Voulant m'assurer si le résultat ne seroit pas le même avec les substances *végétales*, je pris quelques morceaux de *vieux bois de chêne très-sec*, & je les fis dissoudre dans de l'esprit de nitre extrêmement foible. Je fis aussi produire l'air très-rapidement par le moyen de la chaleur. (Le Lecteur aura observé que dans cette circonstance, l'air est en général moins nitreux; du moins quand cela se passe vers la fin de l'expérience.) Mais lorsque j'en eus séparé l'air fixe par le lavage, le résidu fut presque aussi fortement nitreux que l'air nitreux le plus fort qui soit produit par la dissolution des métaux.



SECTION IX.

*Expériences diverses , relatives au nitre ,
à l'acide nitreux , & à l'air nitreux.*

J'AI recommandé plus d'une fois l'étude de l'*acide nitreux* , & de ses diverses combinaisons , parce qu'elle me sembloit promettre un fonds de découvertes précieuses , capables de porter nos vues bien avant dans la constitution de la nature ; & je me flatte qu'on trouvera que mes propres expériences sur ce sujet , contenues dans cet Ouvrage , ont suffisamment vérifié mon idée. Mais je regarde ce vaste champ de recherches comme à peine ouvert , & je suis bien persuadé qu'il reste encore beaucoup plus à faire que je n'ai fait ; & si l'on considère avec quelle facilité cette riche mine a été exploitée jusqu'ici , je pense qu'on peut présumer avec raison , qu'elle récompensera encore largement l'industrie active qui la fouillera.

Plusieurs grands Chymistes ont été de l'opinion qu'il n'y a qu'un *acide pri-*

mitif ; que tous les différens acides que nous connoissons n'en sont que des modifications , ou des combinaisons différentes ; & que *l'acide nitreux* en particulier , diffère des autres en ce qu'il est uni plus intimement au phlogistique.

Le célèbre Stahl dit positivement qu'en distillant du fer dans l'acide marin , il avoit produit de l'acide nitreux. M. Woulfe m'a informé qu'il a fait la même chose par un procédé différent de celui de Stahl , & qu'il a converti aussi l'acide nitreux en acide marin : ce qui , je crois , n'avoit jamais été fait avant lui.

Je regarde cela comme une découverte capitale , & lorsque cet excellent Chymiste jugera à propos de publier ses procédés , je ne doute pas qu'il ne contribue beaucoup à l'avancement des connoissances naturelles.

Le rapport qui se trouve entre l'acide nitreux & le phlogistique est , je l'avoue , un grand mystère pour moi. Il est très-évident que cet acide contient toujours du phlogistique , & cependant telle est son avidité pour en avoir da-

avantage, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'il l'enleve à la plupart des autres substances. Je présume que c'est par le moyen de cette propriété, que beaucoup de substances dans lesquelles il entre de l'acide nitreux peuvent brûler sans le secours de l'air commun; & je soupçonne maintenant que c'est par la même propriété que l'air commun lui-même, qui est composé, comme je crois l'avoir prouvé, d'acide nitreux & de terre, est capable d'entretenir la flamme, & de soutenir la vie animale.

J'ai cependant des preuves suffisantes que l'acide nitreux, soit lorsqu'il est combiné comme à l'ordinaire avec l'eau, soit lorsqu'on le présente sous forme de vapeur ou d'air, est si chargé de phlogistique, qu'il est capable de phlogistiquer, & l'air commun & l'air nitreux, si on les y expose. C'est-là, je pense, un fait assez extraordinaire; du moins il me l'a paru d'autant plus, que j'attendois un effet tout contraire des expériences que j'ai faites sur cet acide; car je m'étois imaginé que puisque l'acide nitreux constitue la plus

pure de toutes les especes d'air, l'air commun n'avoit besoin que d'une plus grande portion de cet acide pour devenir de l'air déphlogistiqué ; & d'après cette idée, j'étois dans l'espérance de trouver un procédé par lequel je pourrois non-seulement rétablir dans sa pureté primitive l'air vicié, mais augmenter même la pureté de l'air commun. Cette tentative est de telle nature que je suis loin de croire qu'on doive désespérer d'y réussir, quoique la méthode que j'ai prise pour y parvenir, loin de répondre à mes vues, ait produit un effet tout opposé.

Parmi les expériences que j'avois faites au hasard pour rétablir l'air vicié, j'ai rapporté (vol. I. page 97,) que je l'avois exposé, sans aucun effet, à la vapeur de l'esprit de nitre fumant ; mais ce n'étoit que dans la température de l'atmosphère, pendant un espace de tems assez court, & l'esprit de nitre étoit en petite quantité. Je regardai donc cette expérience comme insuffisante pour l'objet que je m'étois proposé ; & lorsque je fus pourvu de phioles à bouchons de crystal, j'introduisis le tube

d'une de ces phioles, dans laquelle j'avois mis de fort esprit de nitre, sous le bord d'une petite jarre remplie d'air qui avoit été vicié par la putréfaction, environ un an auparavant. Je fis bouillir la phiole, & j'obligeai par ce moyen les vapeurs échauffées à s'élever dans la jarre, & à se mêler avec l'air. Je continuai cette opération pendant long-tems, & jusqu'à ce que presque tout l'acide parût s'être exhalé; mais je ne pus m'appercevoir qu'elle eût produit dans l'air aucune altération sensible. Il ne fut pas plus diminué par l'air nitreux qu'auparavant.

Le même jour que je fis l'expérience dont je viens de rendre compte, il me vint en idée que j'avois en ce moment même une très-belle occasion pour déterminer l'effet de la vapeur de l'esprit de nitre sur l'air commun, au moyen d'une quantité de fort esprit de nitre fumant, que j'avois pris au magasin général des Apothicaires. Il étoit renfermé dans une grande phiole qui n'en étoit remplie qu'au quart, & qui n'avoit pas été ouverte depuis six mois; enforte que tout l'air renfermé, qui tenoit les trois

quarts de la capacité de la phiole , avoit été exposé à la vapeur de l'esprit de nitre pendant tout ce tems.

Si j'eusse voulu laisser perdre l'esprit de nitre , j'aurois pu transvaser cet air dans un autre vaisseau , sans aucun mélange d'air de l'atmosphère ; mais n'étant pas de cet avis , je versai la liqueur dans une autre phiole , au moyen de quoi il me resta , dans la première , un mélange dont trois quarts étoient de l'air de la phiole , & l'autre quart étoit de l'air commun , pour lequel j'avois une compensation à faire. Ayant soumis ce mélange à l'épreuve de l'air nitreux , je trouvai que deux parties de cet air & une d'air nitreux occupoient l'espace de deux & demie. Une chandelle s'éteignit dans cet air. L'esprit de nitre devoit donc avoir communiqué du phlogistique à l'air qui avoit été exposé à son action , & l'avoir phlogistiqué au point de le rendre presque entièrement nuisible : comme on peut le conclure sans peine , en ayant égard au mélange d'air atmosphérique salubre qui avoit eu lieu dans cette expérience.

Ce n'est point comme *acide* que la

vapeur nitreuse produit cet effet sur l'air commun ; & je m'en assurai dans le même-tems , en faisant la même expérience sur l'air d'une phiole qui avoit contenu de l'esprit de sel le plus fort , & à ce que je crois , pendant plus long-tems ; car cet air étoit à tous égards aussi bon que l'air commun. Cet esprit de sel étoit très-fumant , je l'avois tiré du magasin général des Apothicaires.

Dans la suite , lorsque j'eus trouvé le moyen de parfumer différentes especes d'air avec la vapeur de l'esprit de nitre , par un procédé singulier dont je parlerai plus bas , je trouvai qu'elle ne produisoit aucun effet sur l'air commun ; je crois que c'est parce que dans ce cas elle contenoit très-peu de phlogistique ; mais je ne fis pas cette expérience de la maniere la plus avantageuse.

Le résultat de l'expérience dont j'ai parlé ci - d'vant , ne m'avoit pas causé plus de surprise que je n'en eus en trouvant que le nitre fondu vicie l'air qu'on y expose. Ce qui me donna l'idée de faire cette expérience , c'est que le nitre , lorsqu'il est liquéfié par la chaleur , produit de l'air. Voyant cela , j'eus la curio-

sité d'éprouver si en restant exposé à l'air commun, il recouvroit l'air qu'il avoit perdu, & d'observer en même-tems l'effet que cette exposition produiroit sur l'air commun, afin de juger de ce que le nitre, dans ces circonstances, pouvoit en emprunter. Je trouvai que l'air commun est un peu vicié dans ce procédé; mais la *preuve* que j'en eus fut accompagnée de circonstances que je n'avois jamais observées auparavant, & dont je ne saurois bien rendre raison. Les faits furent comme il suit.

Je fis fondre environ une once de salpêtre dans un creuset, & je l'y laissai jusqu'à ce qu'il parût avoir perdu tout l'air qu'il pouvoit contenir. Je le plaçai tout de suite sous un récipient renversé sur l'eau; il se figea aussi-tôt. Le lendemain matin j'examinai l'air dans lequel il étoit resté, & je trouvai que cet air n'étoit plus aussi bon que l'air commun: il fut diminué environ un vingtième de moins qu'une égale quantité d'air commun que j'éprouvai en même-tems, & avec le même air nitreux. Je répétai cette épreuve plusieurs fois, le résultat fut toujours le même.

Mais ce qu'il y eut de remarquable , c'est qu'après que ces mélanges eurent reposé un jour & une nuit , ils approcherent davantage de l'égalité. J'ai observé ce fait plus d'une fois , & il me surprend beaucoup. Il sembleroit que l'air auquel le nitre avoit été exposé n'étoit pas absolument aussi vicié que son mélange avec l'air nitreux le montrait d'abord ; mais que sa constitution étoit altérée de maniere qu'il falloit plus de tems qu'auparavant , pour que le phlogistique de l'air nitreux pût agir sur lui.

Je fis fondre ensuite du salpêtre dans une phiole de verre , & le vaisseau ayant été cassé par l'expansion du nitre dans le refroidissement , j'exposai le nitre à une quantité d'air commun renfermée par l'eau , de telle sorte que cet air avoit accès au nitre de tous les côtés ; au lieu que dans l'expérience précédente , il n'avoit été contigu qu'à sa surface. Au bout d'une semaine ou environ , j'examinai cet air , & je trouvai qu'immédiatement après l'épreuve avec l'air nitreux , il étoit beaucoup plus mauvais que l'air commun. Deux parties

de l'air dont je parle & une d'air nitreux ne furent réduites qu'à deux , tandis que dans le même-tems un mélange d'air commun , & du même air nitreux dont je venois de me servir , fut diminué autant que de coutume. Je ne pouffai pas cette expérience plus loin avec cet air ; mais je la suivis avec une autre quantité d'air commun que j'avois laissé pareillement exposé environ une semaine à du salpêtre fondu , & dans les mêmes circonstances.

Deux parties de cet air , & une d'air nitreux , occuperent d'abord l'espace d'un peu plus de deux parties. Mais la diminution continua de s'approcher du degré de celle d'un mélange correspondant fait en même-tems avec l'air commun ; de sorte qu'au bout de quatre jours la différence fut très-petite entre ces deux mélanges. Je ne fais si après un tems plus long , ils auroient été réduits précisément aux mêmes dimensions. Mes expériences n'ont pas été plus loin sur cette matiere , & je n'ai nullement approfondi ce fait singulier.

J'ai dit dans mon premier volume ,

que je ne doutois pas de la possibilité de présenter l'acide nitreux sous forme d'air, & de le soumettre à des expériences capables de conduire à d'importantes découvertes, pourvu qu'on pût trouver quelque substance fluide propre à le renfermer. (Vol. I. pag. 354.) J'ai fait depuis plusieurs tentatives pour le dépouiller de l'eau avec laquelle il est ordinairement combiné; mais quoique favorisé par quelques circonstances inattendues, j'ai été bien loin de réussir selon mes desirs.

Cet acide est capable d'exister sous cette forme sèche. Je m'en assurai bientôt en essayant d'en tirer de l'air par le même procédé qui m'avoit servi à retirer l'air acide marin de l'esprit de sel: savoir, en chauffant l'acide dans une phiole, & recevant l'air dans le mercure; car quoique la vapeur acide attaquât bientôt le mercure, comme la jarre qui la recevoit étoit étroite, la croûte saline qu'elle formoit à la surface du mercure empêchoit l'action ultérieure de l'acide sur cette substance, & me donnoit le tems d'introduire de l'eau dans l'air que j'avois produit, & de m'assurer par

l'absorption de cet air, que c'étoit un véritable *air acide*, ayant avec l'eau une affinité semblable à celle des autres airs acides.

Dans la première expérience que je fis à ce sujet, la rougeur de l'air ne parut pas tout de suite; mais au bout de quelque tems, lorsqu'il fut à présumer que la vapeur nitreuse avoit produit de l'air nitreux en dissolvant le mercure. Je suppose que la rougeur qui parut alors étoit l'effet du mélange de cet air nitreux nouvellement produit, avec la portion d'air commun qui avoit été contenue dans la partie supérieure de la phiole, & que la vapeur acide en avoit chassée. Je laissai passer une heure avant d'introduire de l'eau dans cet air, & même alors il fut diminué sensiblement, parce que le mercure n'avoit pu se saisir de la totalité de l'air acide. La dernière fois que je fis cette expérience, après que j'eus produit environ deux mesures d'air, j'y introduisis de l'eau aussi promptement qu'il me fût possible, & ce liquide absorba un tiers du total.

Lorsque j'ai rapporté les procédés pour tirer de l'air déphlogistiqué du

caillou calciné, & du talc, j'ai observé qu'entre la production de l'air phlogistique & celle de l'air déphlogistique, il y a un intervalle considérable dans lequel rien ne monte que la pure *vapeur de l'acide* que l'eau absorbe à l'instant toute entière. Cette circonstance me donna une occasion favorable & inattendue, de faire quelques expériences sur cette vapeur. Le tube par lequel elle étoit transmise à travers l'eau avoit une courbure considérable, & son orifice étoit par ce moyen tourné vers le haut : ce qui me donnoit la facilité de placer au-dessus des phioles remplies de toutes les espèces d'air que l'eau peut renfermer. L'extrémité du tube se trouvant alors considérablement élevée dans la phiole, la vapeur devoit nécessairement venir en contact immédiat avec l'air qui y étoit contenu.

La première expérience que je fis de cette manière sur cette vapeur fut avec *l'air nitreux* ; elle parut faire sur cet air le même effet que le foie de soufre ; elle le diminua jusqu'à ce qu'il ne fût plus capable d'affecter l'air commun, & l'opération fut extrêmement rapide. Je

dois rapporter la marche entière de cette expérience qui a quelque chose d'assez remarquable. Dès l'instant où l'air nitreux fut exposé à cette vapeur, il devint blanc, ensuite transparent, ensuite rouge, & enfin il reprit sa transparence. Je pris une quantité de cet air au moment où la blancheur venoit de disparaître, & je trouvai qu'il étoit peu différent de l'air nitreux pur, diminuant l'air commun presque au même degré. Ayant mis en expérience une autre phiole d'air nitreux, que je retirai lorsqu'il fut tout-à-fait rouge, je trouvai qu'un tiers de la quantité avoit disparu, & que son pouvoir de diminuer l'air commun étoit environ la moitié moindre qu'auparavant. Je laissai ensuite une autre phiole exposée à cette vapeur, jusqu'à ce que je m'aperçusse que la diminution ne pouvoit pas aller plus loin; il ne resta que la vingtième partie de la quantité primitive d'air nitreux, & ce résidu n'affecta pas du tout l'air commun.

Lorsque ce procédé est très-rapide, c'est-à-dire, lorsque la vapeur nitreuse vient très-vîte, la blancheur, qui dans le

mélange de cette vapeur avec l'air nitreux précède la rougeur , peut à peine s'appercevoir ; & le vaisseau qui contient l'air devient excessivement chaud , de même que le tube par lequel passe la vapeur. J'observai que le vaisseau contenant l'air nitreux demeurait extrêmement rouge pendant environ une minute , sans qu'il y eût d'altération dans les dimensions de l'air ; après quoi il fut subitement diminué à environ un quart de sa quantité primitive : ce qui est analogue au procédé de l'effervescence de la limaille de fer & du soufre , dont j'ai rendu compte , vol. I. page 153.

J'exposai de *l'air commun* ; de *l'air inflammable* , & de *l'air fixe* , & tous pendant un tems considérable , à cette vapeur acide nitreuse , sans qu'aucun d'eux en souffrît la moindre altération. Il se peut qu'une plus longue continuation du procédé les eût affectés ; mais il fallut beaucoup moins de tems pour qu'il produisît son plus grand effet sur l'air nitreux. Il sembleroit donc que cette vapeur acide , quoiqu'elle contienne assez de phlogistique pour phlogif-

tiquer promptement & complètement une quantité d'air nitreux, n'en contient pas assez pour phlogistiquer l'air commun, ou que du moins elle exige, pour produire cet effet, ou plus de tems, ou un différent mode d'application.

Comme le phlogistique n'avoit produit aucun effet sur l'air fixe, excepté dans un cas particulier : savoir, celui de l'effervescence de la limaille de fer & du soufre (vol. I. page 52,) je ne m'attendois pas qu'il fût affecté dans l'expérience dont il s'agit. D'ailleurs, lorsque j'exposai l'air fixe à cette vapeur, je ne me servis que de la flamme d'une chandelle pour échauffer la phiole; & par ce moyen la vapeur n'est pas aussi abondante que lorsqu'on la dégage par un feu de sable violent, dont on entoure toute la phiole placée dans un creuset.

Dans le cours de ces expériences, j'ai cru voir des raisons suffisantes pour me faire conclure que l'air acide nitreux est naturellement *sans couleur* comme les autres airs acides; car j'ai observé que quoique l'intérieur de la phiole & du tube fut très-rouge pendant le passage, tant

de l'air phlogistique que de l'air déphlogistique: lorsque, dans l'état intermédiaire, l'acide pur s'élevoit, tout l'intérieur de la phiole étoit transparent, ou s'il y avoit quelque couleur sensible elle étoit blanchâtre; en même-tems, on pouvoit s'appercevoir que si cette vapeur acide se mêloit avec quelque autre espece d'air, elle produisoit une couleur rouge. Comme cette rougeur dans l'air inflammable, & dans d'autres airs, duroit encore quelque tems après qu'on y avoit introduit cette vapeur, & qu'ensuite ils redevenoient transparens, je m'attendois qu'ils auroient souffert quelque altération; mais mon attente fut vaine.

J'observerai ici que les personnes qui n'ont pas encore beaucoup travaillé sur ces matieres, doivent être très-circonspectes en conduisant ce procédé, & surtout avoir soin que le tube qui porte la vapeur acide soit d'une grosseur suffisante; je veux dire que son diamètre intérieur doit avoir à peu-près un dixieme ou un douzieme de pouce. Je fus une fois assez peu avisé pour me servir d'un tube beaucoup moindre, & presque capillaire; il vint à être bouché, &

je suppose que ce fut par quelques particules de cailloux élevées avec la vapeur : quoi qu'il en soit , il se fit une explosion qui fit voler en éclats la phiole & tout ce qu'elle contenoit , ce qui m'exposa à quelque danger. Mais graces à la Providence , j'en fus quitte pour la peur , comme dans beaucoup d'autres occasions. Au reste , il ne faut pas s'attendre qu'on puisse parvenir à quelque chose dans ces sortes de travaux , sans s'exposer à des risques pareils.

J'ai rapporté dans mon premier volume , page 163 , que je n'obtins que peu ou point d'air de la dissolution du *plomb* dans l'esprit de nitre. J'ai fait depuis dans le même genre une autre tentative qui m'a un peu mieux réussi. Je versai de l'esprit de nitre fumant dans une phiole à bouchon tubulé , fig. c, de la contenance d'une mesure & demie , remplie de petit plomb ; en sorte que je ne laissai point du tout d'air commun , ni dans la phiole ni dans le tube , & je la plaçai de maniere que je pusse recevoir dans l'eau l'air qui seroit produit.

Après avoir laissé passer une heure

pendant laquelle il ne s'éleva que peu ou point d'air, j'approchai la flamme d'une chandelle à une certaine distance de la phiole, j'obtins alors environ une mesure d'air; mais l'eau ayant reflué dans la phiole après que j'eus retiré la chandelle, il y eut de l'air produit très-abondamment. J'en recueillis en tout environ un quart de chopine, & probablement j'en aurois pu recueillir beaucoup plus; mais le sel formé par la dissolution du plomb étoit si près de boucher entièrement le tube, que je jugeai à propos de discontinuer le procédé. Les diverses portions du produit étoient de la même qualité (c'étoit de l'air tellement nitreux, que deux parties d'air commun & une de cet air n'occupèrent que l'espace de deux parties), avec cette seule différence, que la première & la dernière de ces portions occupèrent, avec l'air commun, un peu plus d'espace que celles que j'avois retirées dans le milieu du procédé. Lorsque l'air s'élevoit très-rapidement, il étoit extrêmement trouble, comme s'il eût été rempli d'une poudre blanche.

Le

Le Lecteur aura vu dans mon premier volume, le résultat de plusieurs procédés dans lesquels l'air nitreux, après avoir été phlogistiqué avec le fer & avec le foie de soufre, permettoit à une chandelle de brûler, soit naturellement, ainsi que dans l'air commun, soit avec une belle flamme agrandie. Comme cet air, quoique nuisible, ressemble à l'air commun, à quelques égards; il me vint en idée qu'il seroit possible, en y ajoutant quelques ingrédients, d'en faire de l'air commun à tous égards; & ce fut autant dans cette vue que pour d'autres desseins, que je remplis à diverses fois plusieurs phioles d'air nitreux dans lequel je mettois du fer ou du foie de soufre, pour le phlogistiquer, comme aussi des morceaux de craie, ou de l'air fixe même, pour lui fournir cet ingrédient, qui comme on fait est contenu dans l'atmosphère. Je diversifiai aussi à d'autres égards ces appareils, pour augmenter la probabilité de la réussite, relativement à l'objet que je me proposois. Le Lecteur n'aura pas de peine à croire que ces projets étoient antérieurs à ma dé-

couverte de la vraie constitution de l'atmosphère , que j'ai exposée dans une des Sections précédentes ; cependant comme ces procédés m'occupèrent pendant long-tems , & comme il se peut que des personnes qui travaillent sur ces matieres souhaitent d'en savoir les résultats , quelque infructueux qu'ils aient été relativement à leur objet principal , je rapporterai ici les particularités des principaux de ces procédés dans l'ordre où je les ai exécutés.

On aura observé aussi (vol. I. page 283) que dans un cas particulier , une quantité d'air nitreux , qui avoit été exposé pendant deux mois à des cloux de fer dans le mercure , fut diminuée par de nouvel air nitreux. Je trouve ce fait écrit dans mon registre dans le tems où j'en fis l'observation , & par conséquent, je ne saurois douter que je n'aie réellement observé ce phénomène, qui indique que l'air est pur à un degré considérable, & qu'il est propre à la respiration ; mais n'ayant pu dans aucune des expériences subséquentes obtenir le même effet , je soupçonne que je dois m'être trompé de maniere ou d'autre dans la premiere

observation: toutefois il est bon d'observer que de l'impossibilité où l'on se trouve dans une suite d'expériences de produire une seconde fois un phénomène, dans ce qui *paroît* être les mêmes circonstances, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'on se soit trompé à l'égard de l'existence même du phénomène; parce que rien n'est plus commun que de se tromper relativement à l'identité qu'on *s' imagine* voir dans les circonstances des expériences.

Le 4 Juin 1774, deux quantités d'air nitreux, qui étoient restées plus de quatre mois en contact avec du fer sous l'eau, éteignirent simplement une chandelle.

Le 25 Juillet, une chandelle brûla avec une flamme agrandie, mais seulement doublée, dans de l'air nitreux qui avoit été en contact avec du fer dans le mercure environ six mois. Le phénomène qu'il présentait, lorsque j'y plongeais la chandelle, fut le même avant & après que j'eus fait passer l'air une fois à travers l'eau. Dès que j'eus introduit de l'eau dans ce qui resta de cet air,

elle commença à l'absorber comme de coutume.

Le 2 Mars 1775, de l'air nitreux, qui avoit été renfermé en contact avec du fer sous l'eau pendant plus d'un an, ressembloit, à tous égards, à l'air commun phlogistique; il ne diminuoit l'air commun, ni n'étoit diminué par l'air nitreux, & il éteignoit la chandelle; il avoit aussi l'odeur foible de l'air phlogistique; plus le fer est rouillé, plus il diminue promptement l'air nitreux: d'où il sembleroit qu'il reçoit du phlogistique de l'air nitreux, plutôt qu'il ne lui en communique.

Le 4 Mars, dans l'espace d'un jour ou environ, & sans le secours de la chaleur, le foie de soufre absorba à peu près le tiers d'une quantité donnée d'air nitreux. Une chandelle brûla avec une flamme agrandie dans le résidu; mais il ne fut point du tout diminué par de nouvel air nitreux.

Le 6 Mars, de l'air nitreux exposé au foie de soufre, & à la craie, présentait les mêmes phénomènes que s'il n'y avoit point eu de craie. Il entretenit &

agrandit la flamme d'une chandelle ; il ne fut point diminué par l'air nitreux , & après avoir essuyé très-peu d'agitation dans l'eau , il éteignit une chandelle.

Le 10 Mars, un mélange de moitié d'air nitreux & moitié d'air fixe , qui avoit été en contact avec du fer , fut réduit à un tiers de ses dimensions , & le restant entretint & agrandit la flamme d'une chandelle ; mais il ne fut pas diminué par l'air nitreux.

Le 7 Mai, j'examinai plusieurs quantités, soit d'air nitreux seul, soit de mélanges d'air nitreux & d'air fixe , qui étoient restés exposés dans le mercure environ deux mois à du fer non rouillé, ou à du fer qui s'étoit rouillé dans l'air nitreux ; aucune ne fut diminuée par l'air nitreux , ni ne diminua l'air commun , & toutes en général éteignoient la chandelle. Mais une chandelle brûla naturellement dans un de ces mélanges lorsque l'air fixe en eut été enlevé par le lavage. Une quantité d'air nitreux , après avoir été exposée à du fer qui s'étoit rouillé précédemment dans de l'air nitreux , se trouva diminuée d'en-

viron un dixieme ; mais l'air étoit très-peu altéré ; car il diminua presque autant l'air commun qu'auroit pu faire de l'air nitreux récemment fait. Une autre quantité d'air nitreux, qui avoit été exposée à des cloux de fer, diminuoit l'air commun ; mais moins que n'avoit fait le précédent.

SECTION X.

Observations sur l'Air commun.

ON suppose en général , & peut-être avec raison , que l'usage de certains métaux est moins à craindre que celui de certains autres , parce qu'on suppose qu'il sort des *effluves* nuisibles de ces derniers. Le cuivre & le plomb sont dans ce cas. Au lieu qu'on regarde le fer comme parfaitement innocent , sous quelque forme qu'il soit , si ce n'est , comme l'observe en badinant le Docteur Franklin , sous celle d'arme offensive. On a interprété en faveur de cette opinion mes expériences sur la di-

minution de l'air , & sur la qualité parfaitement nuisible qu'il contracte lorsqu'il est exposé à de la peinture faite avec du blanc de plomb & de l'huile ; & moi-même , en rendant compte de ces expériences , j'avois attribué tout ce mauvais effet au phlogistique qui se trouvoit encore dans le blanc de plomb.

J'avois cependant observé dès-lors , que l'air est autant diminué , & par conséquent rendu aussi complètement nuisible par la calcination de l'*étain* que par celle du plomb ; cependant je ne crois pas que l'usage de l'*étain* ait jamais été regardé comme suspect. Or , si mon hypothèse , que c'est le phlogistique qui diminue l'air & qui le rend nuisible , est bien fondée (mes observations m'ont fourni tant de faits pour la soutenir , que je ne vois pas comment on pourroit la mettre en question) , il doit être indifférent que le phlogistique soit émané d'un métal ou d'un autre ; & la calcination de chacun des métaux en particulier doit rendre également nuisible l'air dans lequel on l'opere. Il s'est présenté dans le cours de mes der-

nieres observations d'autres faits qui fortifient encore davantage cette opinion.

Pendant que je faisois des expériences sur l'extraction de l'air inflammable du fer, je trouvai que si la quantité d'air commun étoit considérable, le foyer de la lentille dirigé sur la limaille de fer enfermée dans cet air n'avoit point d'autre effet que de diminuer l'air, & de le rendre nuisible au même degré que l'avoit fait la calcination du plomb & de l'étain; car après cela, cet air ne faisoit point d'effervescence, & n'étoit pas davantage diminué lorsque j'y mêlois de l'air nitreux. Je ne doute nullement que si j'eusse continué ensuite le procédé pendant un tems suffisant, il n'y eût eu une augmentation de l'air occasionnée par la production de l'air inflammable. Mais le premier effet du dégagement du phlogistique du fer étoit de phlogistiquer & de diminuer l'air commun.

Je trouvai même que l'air étoit vicié s'il restoit renfermé avec du fer pendant un tems considérable. Pour en faire l'épreuve, j'avois rempli de cloux une

phiole qui contenoit de l'air commun, le 18 Décembre 1773, & elle étoit restée dans l'eau jusqu'au 2 Mars 1775. A cette époque je le trouvai diminué d'un cinquieme de son volume, & il ne le fut point du tout par l'air nitreux, enforte qu'il devoit être parfaitement nuisible.

J'ai eu lieu de penser aussi que ma premiere opinion, concernant la cause de la diminution de l'air par la peinture (j'attribuois cet effet au phlogistique dégagé du *blanc de plomb*), n'étoit pas bien fondée; car pendant que je faisois mes expériences sur le *minium*, je me souvins que j'avois observé (vol. I. page 234) qu'une composition, dont la térébenthine faisoit partie, avoit diminué l'air commun; & soupçonnant en conséquence que ce pouvoit bien être l'huile de térébenthine, & non pas le blanc de plomb, qui contribuoit le plus à la diminution de l'air, je me procurai une petite quantité de *peinture faite avec le minium*, broyée de la maniere usitée. J'en barbouillai des morceaux de papier, & les ayant couverts d'une jarre placée dans l'eau, je trouvai que

l'air étoit diminué précisément comme auparavant; enforte que c'étoient probablement les effluves phlogistiques des *huiles*, & non ceux du *plomb*, qui produisoient cet effet.

Dans mon premier volume j'ai observé, page 236, que le *ciment rouge* ordinaire avoit vicié l'air qui avoit été exposé à ses effluves. Pour faire cette expérience, j'avois enduit de ce ciment tout l'intérieur d'une phiole, que j'avois ensuite renversée dans un vaisseau plein d'eau. J'ai répété depuis, ou plutôt continué cette expérience, en laissant le même vaisseau dans cette situation pendant environ neuf mois; au bout de ce tems, lorsque j'examinai l'air, je le trouvai diminué d'un cinquieme de son volume, & il ne fut point du tout affecté par l'air nitreux.

Après avoir tant travaillé sur le *minium* dans le cours de mes dernières expériences, j'eus la curiosité d'éprouver quel seroit, relativement à l'air, l'effet du procédé par lequel la *chaux grise de plomb* est convertie en *minium*. Je savois que la calcination du plomb n'étant que le dégagement du phlogisti-

que diminue l'air ; & autant que j'ai eu occasion de l'observer , le procédé qui convertit la chaux grise en *minium* est de la même nature que le précédent , dont il n'est que la continuation ; c'est-à-dire , qu'il ne consiste qu'en un dégagement ultérieur du phlogistique , & qu'il opère conséquemment aussi la diminution de l'air. Je fis tomber le foyer de la lentille sur une petite quantité de chaux grise de plomb , que j'avois mise sous un récipient placé dans l'eau ; cette opération n'en fit pas absolument du *minium* ; mais elle lui donna une teinte rougeâtre. Je trouvai que l'air dans lequel j'avois fait cette expérience , étoit considérablement vicié ; car il ne fut pas , à beaucoup près , aussi affecté par l'air nitreux que l'air commun.

Comme l'air commun contient naturellement une portion considérable d'air fixe , je cherchai , dès le tems où je commençai mes expériences sur l'air , à extraire l'air fixe d'une quantité donnée d'air atmosphérique , afin de voir ce que seroit ce dernier lorsque je l'aurois privé de cet ingrédient. Je trouvai bientôt , à la vérité , que l'air fixe est

précipité de l'air commun dans les procédés phlogistiques, & sur-tout par l'étincelle électrique; mais il y a complication dans ce procédé; car en même-tems que l'air fixe est précipité de l'air commun, celui-ci reçoit le phlogistique; & je n'ai pu rien imaginer encore qui m'ait réussi pour extraire simplement l'air fixe.

D'après la grande affinité de la chaux vive avec l'air fixe, je pensai qu'il seroit possible qu'une grande quantité de chaux vive renfermée dans une petite quantité d'air y produisît, avec le tems, quelque effet analogue à ce que je cherchois. Mais l'événement ne répondit pas à mes vues, quoique j'eusse accumulé un grand nombre de petits morceaux de la meilleure chaux vive, dans une phiole que je laissai renversée dans un bassin de mercure pendant une semaine entière. Il ne parut pas que l'air fût sensiblement affecté. S'il l'eût été le mois du monde, j'aurois répété ce procédé, & j'y aurois donné plus de tems.

Lorsque j'eus découvert que la végétation rétablit à un degré de pureté considérable l'air vicié par la respiration ou

par la putréfaction , & que l'agitation dans l'eau produit le même effet , je conjecturai que , dans la nature , la matière phlogistique absorbée par les eaux pouvoit bien être reçue par les plantes aquatiques , & se combiner aussi avec d'autres substances qui se trouvent sous les eaux : Un fait curieux qu'on m'a communiqué depuis favorise beaucoup cette supposition.

C'est M. Garrick qui me fit le plaisir de m'en donner le premier avis , & M. Walker , savant Auteur d'un nouveau Dictionnaire Anglois , de qui il tenoit le fait , voulut bien se donner la peine de prendre sur cela de nouvelles informations en ma faveur. Voici ce qu'il m'apprit. « M. Bremner , qui tient un » magasin de Musique à Londres, dans » le Strand , vis-à-vis *Sommerfet-house*, » étant à Harwich à attendre le paquebot, » observa dans l'auberge principale un » réservoir dont tous les parois étoient » très-mal-propres intérieurement. Il » demanda à l'Hôte pourquoi il ne le » nettoyoit pas ; celui-ci répondit qu'il » l'avoit fait autrefois ; mais que cela » ne lui arriveroit plus , parce qu'après

„ que le réservoir avoit été nettoyé ,
 „ l'eau qu'on y tenoit devenoit puante ,
 „ & ne pouvoit plus servir à son usage
 „ ordinaire , & qu'elle ne recouvroit
 „ pas sa douceur jusqu'à ce que les
 „ côtés & le fond du réservoir fussent
 „ redevenus très-sales „. M. Walker
 ayant demandé à M. Bremner , s'il
 croissoit quelques végétaux aux côtés &
 au fond de ce réservoir , ce dernier ne
 pût répondre positivement sur cela.
 Mais comme il dit que le réservoir
 étoit tapissé d'une *substance verte* , qui
 n'est qu'une matiere végétale , (nulle
 autre matiere en effet n'auroit pu
 adhérer aux *parois* , aussi-bien qu'au
 fond du réservoir) , je pense qu'on
 trouvera probable que c'étoit cette ma-
 tiere en végétation , qui conservoit la
 douceur de l'eau , en absorbant l'effluve
 phlogistique qui s'en dégageoit lors-
 qu'elle tendoit à la putréfaction.

Je m'estimerai fort heureux , si en
 faisant mention de ce fait , je puis
 engager les Physiciens à faire attention
 aux choses de cette nature. Quelque
 frivoles qu'elles paroissent , elles sont de
 la dernière importance , si on les conside-

re d'un œil philosophique , puisqu'elles peuvent aider à expliquer quelques-uns des phénomènes de la nature les plus frappans , relatifs au plan général & à la constitution du système, & au rapport qui se trouve entre ses différentes parties.

SECTION XI.

Expériences & Observations sur le charbon de bois , déjà publiées dans le LX^e volume des Transactions Philosophiques.

PARMI les expériences nouvelles que j'ai publiées à la fin de mon histoire de l'Électricité , j'ai rendu compte de mes observations sur la vertu conductrice du charbon. Les Électriciens n'avoient regardé cette substance que comme du bois plus parfaitement cuit ; & l'on fait que celui-ci (le bois passé au four) n'est point un conducteur de l'Électricité. J'ai même ouï-dire qu'on avoit fait des tentatives pour exciter le charbon , &

quoiqu'elles eussent été infructueuses ; on n'avoit pas pensé que le défaut de succès, qu'on attribuoit à d'autres causes, pouvoit venir de ce que le charbon n'est pas une substance électrique : tant on étoit persuadé que l'eau & les métaux étoient les seules substances conductrices qu'il y eût dans la nature. L'examen des propriétés chymiques du charbon qui, à plusieurs égards, sont très-différentes de celles du bois dont il est tiré, auroit dû conduire les Physiciens à soupçonner que puisque le bois réduit en charbon est devenu *toute autre chose* que ce qu'il étoit auparavant, il peut différer encore de son premier état, relativement à l'Électricité. Mais on n'avoit pas réfléchi assez attentivement sur ce sujet.

Lorsque je rapportai mes premières expériences sur le charbon, j'observai qu'il y avoit de très-grandes différences dans la puissance conductrice du charbon en général, & du charbon de bois en particulier, quoique je ne pusse déterminer de quelle circonstance dans la préparation, &c. ces différences pouvoient dépendre. Je témoignai en con-

séquence combien je desirois que quelque personne, qui auroit la commodité de faire des expériences chymiques, poursuivît cette recherche, qui promettoit non-seulement de déterminer la cause de la propriété conductrice du charbon; mais peut-être encore celle de la *puissance conductrice en général*. N'ayant pas appris qu'aucun Chymiste ou Électricien se soit occupé de cette matiere, j'ai enfin repris ce sujet, quoique je n'eusse pas tous les avantages que j'aurois souhaités. J'ai cependant réussi en grande partie quant au principal objet de ma recherche, & je vais mettre sous les yeux de la Société Royale le résultat de mes expériences & observations.

Je commencerai par relever une erreur dans laquelle j'étois lorsque je publiai mes premières expériences. Ayant été informé par des personnes qui assistent à la préparation du *charbon de terre*, qu'il se trouvoit considérablement augmenté de volume après le procédé, je m'étois imaginé que toutes les autres substances recevoient une augmentation de volume lorsqu'elles étoient réduites

en charbon. Mais les premières expériences que je fis depuis me convinquirent que c'étoit une erreur. Toutes les substances végétales sont considérablement contractées dans toutes leurs dimensions par le procédé qui les réduit en charbon ; & plus ce procédé est parfait (c'est-à-dire , ainsi que je l'expliquerai ci-dessous , plus la chaleur qu'on applique dans le cours du procédé est grande), plus la diminution est considérable. J'ai même réduit des pièces de bois presque à un quart de leur longueur & de leur largeur primitives , dans un feu ordinaire , en me servant seulement d'un soufflet pour l'animer. La diminution a été la même avec le bois du tissu le plus solide , comme l'ébène ; avec celui d'un tissu moyen , comme le chêne ; & avec celui du tissu le plus lâche , comme le sapin , &c.

L'humidité , & , à ce que je crois , de légers degrés de chaud ou de froid affectent le bois beaucoup plus sensiblement *au travers* de ses fibres que dans *le sens de leur longueur* ; ce qui pourroit faire supposer qu'il en est de même lorsque , par l'application d'un plus grand

dégré de chaleur, le bois est réduit en charbon ; mais j'ai trouvé très-peu de différence à cet égard. Pour déterminer cette circonstance , je pris dans la même planche deux pieces de deux pouces & demi de longueur chacune. Dans l'une les fibres étoient en travers, elles étoient en long dans l'autre ; & après les avoir entièrement réduites en charbon toutes deux à la fois dans le même creuset , je trouvai que la premiere avoit deux pouces & un vingtieme , & l'autre deux pouces & trois vingtiemes ; la puissance conductrice qu'elles avoient acquise étoit la même dans l'un & dans l'autre , & ne pouvoit servir à les distinguer.

Je donnerai plus bas un détail plus particulier du degré auquel le bois se raccourcit lorsqu'il se réduit en charbon, en comparant les variations qu'il éprouve à cet égard , avec celles qui se trouvent dans le pouvoir qu'il acquiert de conduire l'électricité.

Je trouvai , à mon grand étonnement, que les *substances animales* n'étoient point contractées dans leurs dimensions par le procédé qui les réduit en charbon ; c'est du moins ce que j'ai observé

à l'égard de quelques morceaux d'*ivoire* de quelques pouces de longueur, & d'une piece d'*os* ; ils supporterent une chaleur très-intense pendant plusieurs heures, & lorsque je les tirai du creuset, ils étoient considérablement diminués de poids ; mais leur forme n'étoit pas même altérée ; au lieu que l'altération est remarquable sur le bois, & à ce que je crois sur toutes les substances végétales, en pareille circonstance.

Lorsque j'examinai les substances minérales, je trouvai que le rapport qu'on m'avoit fait, & dont j'ai parlé ci-dessus, étoit exact à leur égard. Les charbons de terre augmentent considérablement de dimensions par le *charbonnage*. Mais il faut faire l'expérience avec beaucoup de soin pour juger de cette circonstance ; car à moins que l'opération ne se fasse très-lentement, le charbon ne conserve rien de sa première forme, ayant été en quelque sorte liquéfié par la chaleur. L'intérieur de tous les morceaux de charbon de terre est plein de cavités, & il y en a communément une très-grande au centre de chaque piece, enforte que la dilatation

qu'il éprouve n'est rien moins qu'une extension des fibres ; mais elle est produite par l'élasticité de la vapeur nouvellement formée, qui cherche à s'échapper pendant que la substance est molle.

A l'égard de l'objet principal de ma recherche , je m'assurai bientôt que la vertu conductrice du charbon ne dépend d'aucune autre circonstance que du *dégré de chaleur* qu'on y applique dans le procédé du charbonnage. Je n'avois pas même soupçonné cette vérité ; mais des expériences sans nombre me l'ont clairement prouvée. Toutes les fois que j'ai mis dans un pot de fer rempli de sable , plusieurs pieces de bois prises dans la même planche , en ayant soin de les marquer , & de noter la place qu'elles occupoient respectivement dans le pot , j'ai toujours trouvé que celles qui avoient été exposées à la plus grande chaleur étoient devenues les meilleurs conducteurs. Le résultat fut le même lorsque je réduisis en charbon des morceaux de bois placés l'un sur l'autre dans un canon de fusil , dont je fis rougir au feu

une extrémité , laissant le reste dans différens degrés de chaleur.

Je pris des morceaux de charbon qui ne conduisoient que très-imparfaitement , ou point du tout ; & je ne manquai jamais de leur donner la puissance conductrice la plus forte , en répétant le procédé du charbonnage , soit dans un creuset , soit dans un canon de fusil avec du sable , & à une très-forte chaleur.

J'ai trouvé que la seule continuation du même degré de chaleur ne produit aucun effet ultérieur , relativement à la puissance conductrice du charbon.

M. Macquer & les autres Chymistes définissent le charbon , *bois qui s'est brûlé sans s'être enflammé*. Mais il est indifférent qu'il flambe ou non pour qu'il acquiere le pouvoir de conduire l'électricité , & je ne doute pas qu'il n'en soit de même par rapport à toutes ses autres propriétés essentielles. J'ai charbonné des morceaux de bois légèrement couverts de sable dans des canons de fusil & dans des creusets ; & j'ai laissé s'enflammer , à différentes distances , la

vapeur inflammable qui s'en exhale. J'ai mis aussi des pieces de bois dans un feu ouvert que j'ai animé avec un soufflet, & j'ai trouvé que le charbon étoit un également bon conducteur dans tous les cas. Il est vrai que dans le dernier, il reste bien peu de la substance ; mais le peu qui reste après qu'elle a cessé de flamber, soit qu'on l'éteigne tout de suite ou non, conduit aussi-bien que tout autre charbon. Il est difficile, à la vérité, de s'assurer qu'on a donné le même degré de chaleur à toutes les parties d'un morceau de bois, à moins qu'il n'y soit exposé pendant quelque tems : or dans un feu ouvert animé avec un soufflet, le bois se réduit en cendres, à mesure qu'il devient rouge brûlant à l'extérieur, avant que le centre soit beaucoup affecté par la chaleur.

Lorsqu'on a donné une fois à un morceau de charbon quelque degré de puissance conductrice, je n'ai jamais trouvé qu'elle se soit affoiblie dans la suite. Si l'on en laisse consumer une partie dans un feu ouvert, cela n'affecte pas ce qui reste, ainsi que je l'ai fait remarquer

lorsque j'ai rendu compte de mes premières expériences *.

Je m'étois imaginé que la *solidité* des substances devoit beaucoup influencer sur la puissance conductrice qu'elles acquièrent en se réduisant en charbon ; mais cette conjecture ne fut pas confirmée par l'expérience. Les charbons des bois les plus légers conduisoient (autant que j'ai pu m'en appercevoir) aussi-bien que ceux des bois les plus solides , s'ils avoient été exposés au même degré de chaleur dans le procédé du charbonnage. Les copeaux déliés de sapin , les pelures d'oignon , la suie la plus légère , & toutes les autres substances végétales que j'ai éprouvées dans l'état de charbon , conduisent tout de même que des charbons de chêne ou d'ébene.

J'avois pensé aussi qu'au moment où un morceau de bois étoit devenu noir par la chaleur , il étoit à tous égards un vrai charbon qui , avec toutes les autres propriétés du charbon , devoit avoir

* Voyez l'Histoire de l'Électricité, Tom. III, Part. VIII, Sect. 3, pag. 226.

celle de conduire plus ou moins bien l'électricité. Mais en charbonnant très-lentement plusieurs morceaux de bois , je trouvai qu'ils ne conduisoient pas au moindre degré, non-seulement lorsqu'ils étoient noirs à la superficie , mais encore lorsqu'ils l'étoient dans toute leur substance , & quoiqu'ils fussent restés long-tems dans le degré de chaleur qui les avoit rendus tels ; en sorte que l'œil ne pouvoit les distinguer du charbon le plus parfait.

J'ai quelquefois trouvé le charbon dans un tel état, qu'il facilitoit le passage d'une explosion tout le long de sa surface , tandis qu'il ne pouvoit conduire un choc d'aucune autre manière.

Pour m'assurer dans quelles proportions la *diminution de poids* , le *décroissement de volume* , & la *puissance conductrice* du bois & du charbon correspondoient ensemble, je pris plusieurs pièces dans la même planche , & les ayant pesées & mesurées avec soin , je les réduisis en charbon très-lentement , & à une chaleur que j'augmentai par degrés , sur un plat de fer que je tenois sur le feu ; j'eus soin de les tourner constamment

pour les empêcher de prendre feu. Les résultats furent tels que dessous.

Un morceau de chêne très-vieux & très-sec, pesant douze grains, qui étoit un conducteur imparfait, comme l'est pour l'ordinaire le bois à cause de l'humidité qu'il contient, n'étoit plus du tout conducteur, après qu'il eut perdu environ un grain; & il continua de ressembler en ce point au bois passé au four, jusqu'à ce qu'il ne pesât plus que quatre grains, & qu'il fût entièrement noir dans toute sa substance; & même alors, il n'étoit encore conducteur que par un coin où il avoit pris feu.

Je pesai & je mesurai avec soin plusieurs fois, dans le cours du procédé, un autre morceau de bois. Au commencement il pesoit

Grains.		long. larg. épais.		
12. Ses dimensions		Pouces.	Pouces.	Pouces.
étoient de . . .		2	$\frac{45}{100}$	$\frac{12}{100}$
à 8,	elles étoient de . . .	2	$\frac{4}{10}$	$\frac{12}{100}$
à 5 $\frac{5}{10}$,	_____ . . .	1	$\frac{91}{100}$	$\frac{4}{100}$
à 3 $\frac{5}{10}$,	_____ . . .	1	$\frac{8}{10}$	$\frac{35}{100}$

Il étoit devenu alors un conducteur imparfait. Je

le pouffai ensuite à une forte chaleur dans un creuset. Lorsque je le retirai il pesoit

<i>Grains</i>		<i>long. larg.</i>	
		<i>Pouces.</i>	<i>Pouces</i>
I	$\frac{75}{100}$	I	$\frac{6}{10}$ $\frac{3}{10}$

Il étoit pour lors un parfait conducteur ; & quoique je le tinsse ensuite pendant plusieurs heures dans une chaleur très-intense , par laquelle il fut réduit à un grain de poids , sa puissance conductrice ne fut pas sensiblement augmentée ; mais il étoit devenu très-fragile , ou même friable.

Il paroît par ces expériences , que ces morceaux de bois furent réduits à environ un quart de leur poids , avant de devenir conducteurs au moindre degré , quoique dans le même-tems ils ne fussent diminués en longueur (c'est-à-dire dans le sens des fibres) que d'un dixieme. On ne pouvoit mesurer avec assez d'exactitude la largeur & l'épaisseur dans de si petits morceaux. Pour les rendre de parfaits conducteurs , il fallut les réduire à environ un dixieme de leur poids , & à la moitié de leur longueur.

Différentes circonstances me portent à conclure que la cause de la *noirceur* & de la *puissance conductrice* du charbon, c'est l'huile du bois devenue empyreumatique & brûlée à un certain degré. D'où je conclus que ces propriétés dépendent, en quelque manière, de cette partie du principe inflammable, autrement dit phlogistique, qui est fixée & unie à la terre de la plante, lorsque cette union est fortifiée par une chaleur intense.

Le *sable* avec lequel je couvrois les substances que je voulois réduire en charbon, de même que la *terre à pipe* dont je me servois quelquefois pour le même usage, contractoient une *noirceur* pareille à celle du charbon, & conduisoient souvent assez bien. Ils conduisoient quelquefois un choc; ce qui provenoit sans doute, de ce qu'ils recevoient l'huile que la chaleur faisoit sortir des substances qui se charbonnoient. Dans l'expérience du canon de fusil rempli de morceaux de bois que j'ai rapportée ci-dessus, les morceaux qui se trouvoient le plus près de l'embouchure ne furent point du tout brûlés;

à peine s'étoient-ils échauffés. Cependant ayant contracté une noirceur superficielle par la vapeur de l'huile qui s'étoit élevée des morceaux qui étoient au-dessous, ils conduisoient même un choc, quoique ce ne fût pas de la manière la plus parfaite.

Quelquefois ces substances qui n'avoient point de phlogistique par elles-mêmes, mais qui en avoient reçu parce qu'elles s'étoient trouvées auprès d'autres corps dont il étoit chassé, ne conduisoient pas tout de suite; mais elles acqueroient la vertu conductrice si on les exposoit à une plus grande chaleur, qui brûlât plus complètement l'huile dont leurs pores étoient remplis.

Je mis un morceau de *pipe* dans un creuset, dans lequel je brûlois de la *térébenthine* (c'étoit pour une expérience dont je rendrai compte plus bas), & je l'en retirai entièrement noir comme une pipe dans laquelle on a long-tems fumé du tabac. Dans cet état, il ne conduisoit pas du tout; mais l'ayant mis dans un creuset, & l'ayant couvert de sable, je le traitai de la même manière que si c'eût été un morceau de bois à réduire

en charbon, & il en sortit très-bon conducteur. Si je l'eusse brûlé à feu ouvert, le phlogistique se seroit échappé, & la pipe auroit recouvré sa premiere blancheur.

Etant convaincu que la puissance conductrice du charbon dépend de l'huile, ou plutôt du phlogistique contenu dans l'huile, & du degré de chaleur qui la brûle, j'employai différentes méthodes pour donner aux substances végétales une plus grande quantité de ce principe; ou du moins je tâchai de leur en faire retenir plus qu'ils n'en retiennent d'ordinaire dans le procédé du charbonnage; mais je ne réussis pas d'une manière sensible dans mes tentatives.

Je commençai par plonger un morceau de vieux chêne sec dans l'huile, & ayant mis le vaisseau sous un récipient de machine pneumatique, je fis le vuide, & je laissai le vaisseau dans cet état un jour & une nuit. Dans cet intervalle, il parut donner une grande quantité d'air. Après cela, je rendis l'air au récipient, & par ce moyen, je forçai l'huile d'entrer dans les pores du bois. Mais le

charbon qui provint de ce bois ne fut pas sensiblement meilleur que les autres. L'application de la chaleur chasse peut-être le phlogistique de telle manière, qu'il n'en peut rester dans le résidu de la substance qu'une certaine portion qui suffit pour le saturer pleinement. J'ai converti en charbon d'autres pièces de bois que j'avois couvertes de ciment. J'ai charbonné aussi plusieurs morceaux de bois ensemble, afin qu'ils pussent recevoir le phlogistique les uns des autres. Mais il n'y a eu dans ces deux cas aucune amélioration sensible dans la qualité du charbon.

Pour empêcher la fuite du phlogistique des substances que je réduisois en charbon, je mis des morceaux de bois dans un canon de fusil, & je le bouchai aussi exactement qu'il me fût possible avec un bouchon de liége que je recouvris de ciment. Dans ce procédé, la raréfaction de la vapeur qui se dégage n'a jamais manqué de faire partir le bouchon; mais ce n'étoit sans doute, qu'après avoir éprouvé une résistance considérable & s'être accumulée dans le canon; cependant je ne me suis pas ap-

perçu que le charbon fait de cette manière ait eu quelque avantage particulier.

Je ne connois, à la vérité, aucune méthode par laquelle on puisse déterminer avec exactitude les différences qui peuvent se trouver entre des substances qui conduisent aussi bien que celles dont il est question, du moins je n'en connois aucune qui soit applicable dans le cas dont il s'agit. Je ne puis distinguer le charbon, que je fais à l'aide d'un soufflet dans un feu ordinaire, des métaux les plus parfaits tels que l'or & l'argent, soit par la longueur, soit par la couleur de l'étincelle électrique, soit par le son de l'explosion. Je ne doute pas qu'on ne puisse communiquer facilement au bois, dans le procédé du charbonnage, un degré de puissance conductrice qui surpasse celui du plomb, du fer, ou des autres métaux plus imparfaits.

Ce qui pourroit nous guider dans nos conjectures sur ce sujet, ce seroit un examen attentif du *dégré de chaleur* qui est nécessaire, soit pour unir le phlogistique à sa base, soit pour l'en séparer.

dans le cas du bois, & dans celui des différens métaux. Le plomb se calcine très-aisément, & l'on fait aussi qu'il conduit l'électricité très-imparfaitement. Le fer se rouille facilement, & j'ai trouvé aussi que sa puissance conductrice est très-foible en comparaison de celle du cuivre, ou des métaux plus parfaits. Par conséquent, si en faisant le charbon, on applique un degré de chaleur plus grand que celui qui est nécessaire pour calciner ou pour revivifier un métal, peut-être pourrons-nous conclure que la puissance conductrice du charbon sera supérieure à celle de ce métal; & comme il est possible d'appliquer au charbon, lorsqu'il n'a aucune communication avec l'air extérieur, un plus grand degré de chaleur que celui que l'argent & l'or pourroient supporter sans se dissiper en vapeurs: il se peut aussi qu'on parvienne à faire du charbon qui conduise mieux que les métaux les plus parfaits.

S'il y avoit eu du phlogistique dans l'eau, j'aurois conclu qu'il n'y a de puissance conductrice dans la nature, qu'en conséquence d'une union de ce

principe avec quelque base. Les métaux & le charbon s'accordent parfaitement, en ce que tant qu'ils contiennent le phlogistique, ils conduisent l'électricité; dès qu'ils en sont privés, ils ne la conduisent plus *.

Quoi qu'il en soit, je crois que toutes les substances végétales ou animales qui contiennent du phlogistique peuvent être réduites en charbon; & si la chaleur qu'on y applique pour le faire est suffisante, ce charbon conduira l'électricité. La chair, le *gluten*, les os, & les autres parties d'un corps animal se réduisent en un charbon, qui est un bon conducteur.

Le seul moyen qui m'ait réussi, du moins en apparence, pour retenir plus de phlogistique qu'à l'ordinaire dans du

* J'ai trouvé depuis qu'une longue agitation dans l'eau la plus pure vicie l'air au point qu'il ne peut plus entretenir la flamme d'une chandelle, ce qui est précisément l'effet de tous les *procédés phlogistiques*; d'où je conclus que la maxime proposée dans ce paragraphe est universellement vraie. Voyez le premier volume, page 368.

bois réduit en charbon, ç'a été la *lenteur du procédé*; car j'ai toujours trouvé que si j'appliquois la chaleur par une gradation très-ménagée, il se dégageoit moins de phlogistique volatil, c'est-à-dire, d'air inflammable, & par conséquent, je suppose qu'il y en avoit une plus grande quantité de fixé. Lorsque le charbon a été fait au moyen d'une chaleur lente, je ne puis jamais le rendre aussi léger qu'un autre charbon fait par une chaleur subite, quoique j'y applique dans la suite le même degré de chaleur.

Je pris deux morceaux contigus dans un bâton de bois de chêne sec. Ils pesoient chacun exactement quatorze grains. J'en chauffai un subitement; il fournit huit mesures d'air inflammable, & après cela il ne pesoit que deux grains. Je chauffai l'autre lentement; mais à la fin aussi fortement que le premier. Il ne donna qu'une mesure & demie d'air, & pesa trois grains après l'opération.

J'ai répété plusieurs fois la même expérience, & j'ai toujours eu à peu-près le même résultat.

Quand j'ai examiné la puissance conductrice des morceaux de charbon faits dans ces différentes circonstances, je n'ai pu distinguer quels étoient les meilleurs conducteurs; peut-être qu'une manière plus exacte de les essayer auroit montré que c'étoient ceux qui avoient été charbonnés lentement; à moins, ce qui n'est pas hors de vraisemblance, que la perfection de la puissance conductrice ne consiste dans la *perfection de l'union* qui se forme entre le principe inflammable & sa base: ce qui peut dépendre *du degré de chaleur* seulement, & non pas de la *quantité de phlogistique* qui peut s'unir à la terre.

N. B. Pour recueillir l'air inflammable qui se dégageoit des substances que je réduisois en charbon, je les mettois dans un canon de fusil, auquel je luttois un long tube de verre, & j'attachois à ce tube une vessie, dont j'avois eu soin d'exprimer l'air.

Comme les métaux & le charbon se ressemblent en ce qu'ils sont composés de phlogistique uni à une base terreuse, & en ce qu'ils conduisent l'électricité, je soupçonnai que ces deux fortes de

substances pourroient bien se ressembler aussi dans la propriété de se dilater par la chaleur. M. Smeaton eut la complaisance de m'aider dans les tentatives que je fis pour déterminer cette circonstance, par le moyen de son excellent pyromètre. Quoique nous n'ayons pu faire cette expérience avec toute l'exactitude que nous aurions désirée, le résultat uniforme de près de trente épreuves nous a prouvé que la chaleur produit une plus grande expansion dans le charbon, que dans l'espèce de bois dont on peut juger qu'il a été fait. L'expansion du charbon a été en général à peu près double de celle du bois.

Il est évident qu'un certain degré de chaleur fait dilater le bois & le charbon, & il l'est aussi qu'un plus grand degré de chaleur les fait contracter. Je voudrois qu'on pût avoir un instrument pour déterminer le degré précis de chaleur auquel l'expansion cesse, & la contraction commence; & pour reconnoître si ces deux effets sont produits dans la même gradation.

Dans le cours de mes expériences sur le charbon, j'ai rencontré une substance

dont la puissance conductrice est singulière, & présente un phénomène fort agréable. Ayant dessein de voir ce qui resteroit après la combustion d'une quantité de térébenthine dans un tube de verre, je le couvris de sable dans un creuset, de la même manière que je faisois le charbon ; je le laissai un tems suffisant dans un feu très-ardent, & la flamme ayant cessé depuis long-tems, j'examinai le tube, & je trouvai qu'il avoit été fondu ; mais loin qu'il y eût rien de semblable à du charbon, ou la moindre noirceur, j'observai que le tube étoit uniformément enduit d'une *matiere blanchâtre luisante*, que je ne pouvois faire sauter en le raclant. Ayant essayé de lui faire conduire l'électricité, je trouvai qu'il transmettoit les moindres chocs à une distance considérable ; & ce qui me paroît très-remarquable, la trace de l'explosion étoit lumineuse d'un bout à l'autre, & sembloit composée d'un nombre prodigieux de petites étincelles séparées & dispersées à une grande distance, qui faisoient le même effet que si on mettoit le feu à une traînée de poudre-à-tirer négligemment

arrangée; l'explosion ressembloit beaucoup au feu d'une fusée; & pour la comparer avec un autre phénomène électrique, elle étoit comme une explosion qui passe par une surface mince de dorure.

Quoique je ne pusse appercevoir, même à l'aide d'un microscope, aucune interruption dans cette couverture blanchâtre, je m'imagine qu'elle devoit, dans le fait, être remplie d'interstices; & les étincelles électriques ne pouvoient être visibles qu'en passant d'une particule conductrice à une autre.

En répétant cette expérience j'ai souvent obtenu des morceaux de verre couverts très-imparfaitement, avec des intervalles très-grands & très-visibles dans la couverture blanchâtre; mais quoique j'aie disposé les mêmes morceaux de verre de manière qu'ils pussent recevoir une plus grande quantité de cette matière, ils n'ont jamais pu recevoir une couverture assez épaisse, pour que l'explosion électrique, en passant au travers, ne présentât pas le phénomène lumineux qu'on voit lorsqu'il y a des interstices dans le circuit.

J'ai obtenu la même matière de l'huile de térébenthine & de l'huile d'olives ; mais non de la cire, ni de l'huile de baleine ; peut-être n'est-il possible de l'obtenir d'aucune substance animale.

Pour observer le progrès de cette incrustation , je versai de l'huile de térébenthine sur des morceaux de verre plats , & je les exposai à une chaleur modérée sur une plaque de fer que je mis au feu. Le résultat fut une couverture noire comme de la suie , qui ne conduisoit pas au moindre degré. Mais ayant mis ces mêmes pièces de verre ainsi couvertes de noir dans un creuset rempli de sable & poussé à une forte chaleur , je les en tirai blanches & conduisant exactement l'électricité comme on a vu ci-devant.

A un moindre degré de chaleur , la couverture noire prenoit une couleur blanche ; mais elle n'adhéroit pas aussi fortement au verre que lorsque la chaleur avoit été plus grande ; elle y adhéroit cependant avec plus de force que la couverture noire , que je pouvois enlever avec les barbes d'une plume ;

mais elle ne conduisoit point du tout.

Dans quelques occasions j'ai trouvé que cette matiere blanchâtre étoit dispersée par plusieurs explosions , comme le Docteur Franklin a observé que cela arrive à la dorure en feuilles.

De quelque maniere que les morceaux de verre eussent été couverts, la couverture s'évanouissoit lorsqu'on les faisoit rougir à feu nud ; & le verre qui restoit ne conduisoit pas plus qu'il n'avoit fait auparavant. Cette circonstance correspond exactement à la fuite du phlogistique du charbon & des métaux brûlés à l'air libre.

Vue au microscope , cette matiere blanchâtre ressembloit exactement à un métal , ou plutôt à un demi-métal , ayant un poli brillant qui cependant se ternissoit bien-tôt.

Pour éprouver si c'étoit du métal , je trempai les morceaux de verre qui en étoient couverts dans les *acides* ; mais je trouvai qu'ils ne faisoient que peu ou point d'effet sur cette matiere , quoiqu'elle ne fût nullement fixée dans les pores du verre , qui en étoit seulement couvert d'une maniere tout-à-fait su-

perficielle. Elle ne fut point du tout affectée par l'*aimant*. Tout bien considéré, la matiere qui forme cette couverture du verre paroît être une espece de charbon qui n'est que blanc au lieu d'être noir.

Après avoir observé que les métaux ressemblent au charbon en ce qu'ils sont composés d'une terre unie au phlogistique, & que d'un autre côté le charbon ne se consume point s'il n'est brûlé à l'air libre (parce qu'il y a probablement dans l'atmosphère quelque principe, avec lequel le phlogistique peut s'unir au moment où il est séparé de la base terreuse, suivant la doctrine des affinités chymiques) : je conjecturai que les métaux pourroient bien encore ressembler au charbon à cet égard, en n'étant capables de se calciner ou de se vitrifier que dans les mêmes circonstances; & l'événement vérifia ma conjecture.

Je pris une certaine quantité de *plomb* & l'ayant mise au feu dans un creuset ouvert, j'observai qu'elle étoit toute vitrifiée dans dix minutes. Mais j'eus beau tenir pendant plusieurs heures, dans un feu beaucoup plus ardent, la

même quantité de plomb couverte avec de la terre à pipe & du sable , à peine éprouva-t-elle quelque diminution ; le fond du creuset se trouva seulement couvert d'un émail léger. Mais il avoit été impossible d'interdire entièrement l'accès à l'air ; & d'ailleurs, il y en avoit nécessairement en contact avec le plomb, dès le commencement du procédé. En traitant le charbon de la même manière, je n'ai jamais pû éviter quelque déperdition de poids , lorsque j'ai tenu le creuset dans un feu très-ardent pendant plusieurs heures.

Comme dans ce procédé le plomb supporte un degré de chaleur beaucoup plus grand que celui auquel il se calcine ou se vitrifie à l'air libre, je croirois assez probable que le plomb ainsi préparé doit avoir son phlogistique plus intimement uni à sa base terreuse, & doit être par cette raison un meilleur conducteur que le plomb ordinaire ; puisque c'est-là ce qui arrive au charbon que l'on soumet à la même expérience. Peut-être le plomb & les autres métaux imparfaits pourroient-ils éprouver quelque altération dans leur *qualité* & se pre-

fectionner encore à d'autres égards dans ces circonstances ; sans être pour cela convertis en or. Mais j'ai trouvé que ce procédé ne change point la pèsanteur spécifique ; enforte que le plomb n'est au sortir de-là rien de plus que du plomb.

SECTION XII.

Observations sur la respiration & sur l'usage du sang, lues à la Société Royale de Londres, le 25 Janvier 1776.

IL est très-peu de questions dans la Physique, & il n'en est peut-être aucune dans la Physiologie, qui aient plus fixé l'attention des Savans que celle de l'usage de la *respiration*. Il est évident que la plupart des animaux mourroient s'ils cessent de respirer ; & l'on fait très-bien aussi, que le même air ne peut leur servir long-tems à cet usage, parce que lorsqu'il a été respiré un certain nombre de fois, il leur est aussi fatal que la privation entière d'air. Mais par quel moyen l'air contribue-t-il à con-

servir la vie, & pourquoi ce même air respiré plusieurs fois ne peut-il plus remplir cet objet? C'est ce qui paroît n'avoir été décidé par aucun des Physiciens & Médecins qui ont traité cette matiere *ex professo*. Et peut-être ce problème auroit-il continué à éluder toutes les recherches directes, tandis que sans y penser, j'en ai facilement trouvé la solution dans le cours de mes recherches sur les propriétés des différentes especes d'air.

On a vu clairement par mes expériences, que la respiration est un *procédé phlogistique*, qui affecte l'air précisément de la même maniere que tout autre procédé phlogistique (1) peut l'affecter : savoir, en le diminuant de volume jusqu'à un certain point; en altérant sa pesanteur spécifique; en le rendant incapable d'entretenir la vie des animaux & la flamme des chandelles; & en le laissant cependant en état d'être

(1) Comme la putréfaction, l'effervescence du fer & du soufre, la calcination des métaux, &c.

tre rétabli jusqu'à un certain degré de pureté par l'agitation dans l'eau, &c. Après toutes ces découvertes, je conclus, comme on peut le voir dans le premier volume de cet ouvrage (*pages 101 & 360*), que l'usage des poumons est d'évacuer un effluve putride, ou de décharger le corps animal de ce phlogistique qui s'étoit introduit dans le système avec les alimens, & s'y étoit pour ainsi dire *usé*; l'air qu'on respire faisant dans cette occasion l'office d'un *menstrue*.

Je ne connoissois alors que l'usage de *la respiration* en général; j'espère prouver maintenant que c'est le *sang* qui en est l'agent, au moyen de son contact presque immédiat avec l'air dans les poumons. On verra que le sang est un fluide formé pour absorber, & laisser échapper avec une facilité étonnante ce principe que les Chymistes nomment phlogistique; qu'il change de couleur selon qu'il en est chargé ou exempt; & qu'il affecte l'air de la même manière hors du corps que dans les poumons; & même, malgré l'interpo-

sition de plusieurs substances capables d'empêcher le contact immédiat du sang avec l'air.

Avant de rapporter mes expériences, il ne sera peut-être pas hors de propos d'exposer en peu de mots les principales opinions des Auteurs sur ce sujet. Je les ai extraites de l'excellente *Physiologie* de Haller, & de quelques autres ouvrages des plus célèbres Ecrivains qui ont traité cette matière.

Hippocrate comptoit l'air parmi les *alimens* du corps. Mais l'opinion la plus généralement reçue des Anciens étoit qu'il existe dans le cœur une espèce de *feu vital*, & que la chaleur qu'il communique au sang est tempérée dans les poumons. Galien suppose aussi qu'il y a dans le cœur quelque chose d'équivalent à un feu perpétuel, & que le principal usage des poumons est de donner issue à des vapeurs qu'il regardoit comme la fumée de ce feu (1). Descartes admettoit le même feu vital dans le cœur, & supposoit que l'air

(1) *Haller, tome III, p. 354.*

étoit nécessaire pour rafraîchir & condenser le sang (1).

Parmi les Physiologistes modernes, les uns ont cru que l'air s'introduit entier dans le sang par les poumons ; les autres prétendent qu'il n'y en passe qu'un extrait ; que cet extrait est la partie la plus subtile de l'air, un éther ou un nitre aérien. D'autres enfin supposent que c'est l'air même, mais dissous dans l'eau, & par conséquent privé de son élasticité (2).

La plupart de ceux qui pensent que l'air pénètre dans le sang, supposent qu'il s'y introduit par les poumons (3). Les uns regardent comme une fermentation l'effet de l'introduction de cet air dans le sang (4). Les autres pensent qu'il agit par son ressort, qu'il empêche le contact trop immédiat des globules du sang, & en conserve par ce moyen la fluidité, le mouvement intestin & la chaleur (5). Bertier supposoit que la

(1) *Haller, tome III. p. 343.*

(2) *Ibid. p. 321.*

(3) *Ibid. p. 330.*

(4) *Ibid. p. 332.* (5) *Ibid.*

circulation du sang étoit due en grande partie à l'introduction de l'air dans ce fluide. Van Helmont attribuoit à la même cause la volatilité que les principes fixes des alimens acquierent dans les animaux (1). Et Stevenson prétend que l'air qui a circulé trop long-tems dans le corps animal échauffe extrêmement le sang, & s'exhale par les poumons (2).

On a encore enseigné que le sang ne reçoit pas l'air même, mais seulement quelques particules actives, spiritueuses & éthérées ; que cet esprit vital passe des poumons au cœur & aux artères, & devient enfin ce que nous appelons esprits animaux. Ainsi, suivant ce système, les esprits animaux seroient engendrés de l'air (3). D'autres qui n'admettent pas que l'air produise les esprits animaux, disent du moins qu'il fournit quelqu'autre *principe vital*. C'est ce principe que Malpighi regardoit comme une vapeur saline *neutre* ; Lister, comme un esprit chaud, inflammable

(1) *Ibid.* p. 336.

(2) *Ibid.* p. 355.

(3) *Ibid.* p. 333.

& sulphureux : Vieussens, comme un sel acide volatil qui entretient la fermentation du sang : & Bryan Robinson, comme l'acide aérien qui empêche le sang de se putréfier, qui le condense, & qui fortifie les fibres animales. Il expliquoit ainsi comment nous nous sentons ranimés à l'air froid, qui contient cet acide en plus grande abondance (1). Les physiologistes qui supposent que le nitre passe de l'air dans le sang, attribuent à ce nitre la fermentation, la chaleur & la densité de ce liquide (2).

C'est une opinion reçue, qu'un des usages des poumons est d'atténuer le sang (3). Et Malpighi ajoute que par ce moyen les différentes particules du sang se mêlent parfaitement ensemble. Mais plusieurs Auteurs enseignent que le sang se condense dans les poumons ; & d'autres pensent que les globules & routes les humeurs les plus tenues reçoivent leur configuration dans cet organe (4). Il est des Auteurs qui sans

(1) *Ibid.* p. 334.

(2) *Ibid.*

(3) *Ibid.* p. 359.

(4) *Ibid.*

attribuer à l'air aucun autre usage que celui de mettre les poumons en mouvement , pensent que le frottement que le sang éprouve en passant dans les poumons y excite une grande chaleur (1). On a attribué la couleur rouge du sang au broiement qu'il éprouve dans les poumons ; mais Lower a réfuté cette doctrine , en observant principalement , que le broiement du sang est plus considérable dans les muscles , & que cependant le sang qui en revient est toujours noir (2).

Le Docteur Whitt soupçonne qu'il y a dans l'air un principe vital stimulant , qui mêlé avec le sang opere la contraction du cœur (3).

Boerhaave dit : « Ce n'est point à cause de la chaleur , ou de la raréfaction ,
ou de la densité , que l'air qui n'est pas
renouvelé devient mortel : cet effet
provient de quelque autre cause cachée (4) ».

(1) *Misc. Taurin. T. V. p. 132.*

(2) *Ibid. Tom. I. p. 74.*

(3) *Haller, T. III. p. 336.*

(4) *Misc. Taurin. T. V. p. 126.*

Le Docteur Hales , qui a répandu beaucoup plus de jour sur la doctrine de l'air que tous les prédécesseurs, en ignoroit comme eux l'usage relativement à la respiration. Il paroît même avoir eu en différens tems différentes opinions sur cette matiere.

Dans sa *statique des végétaux* (p. 373) il suppose que la respiration rend l'air alkalin , & qu'on peut le corriger jusqu'à un certain point par la vapeur du vinaigre.

D'accord avec Boerhaave (1), il dit : que le sang acquiert sa chaleur principalement dans les poumons , où il se meut avec beaucoup plus de rapidité que dans les vaisseaux capillaires des autres parties du corps (2) ; mais qu'un des usages de l'air est de rafraîchir le sang ; il fait même l'évaluation du degré de ce rafraîchissement (3). La couleur rouge des globules du sang prouve , dit-il (4) , qu'ils abondent en soufre ; ce qui fait

(1) Hales, *Statique des animaux*, p. 87.

(2) *Ibid.* p. 76.

(3) *Ibid.* p. 82. & 83.

(4) *Ibid.* p. 78.

qu'ils reçoivent & retiennent mieux la chaleur, que les corps qui ont peu de parties sulphureuses.

Il suppose aussi (1), qu'un autre principal usage des poumons est d'atténuer & de diviser les globules rouges ; & que si le sang des arteres est d'un rouge plus vif que celui des veines, cela peut venir en grande partie de la forte agitation, des frottemens multipliés, & de l'atténuation qu'il éprouve en passant par les poumons. Conformément à cette explication, il observoit que du sang fortement agité dans un vaisseau de verre exactement fermé devenoit très-vermeil, non-seulement à sa surface, mais dans toute sa substance intérieure, ainsi que l'est le sang artériel (2). J'observerai cependant que dans cette expérience, le sang a dû tirer sa couleur rouge vermeille de l'air avec lequel il étoit agité.

Il est probable, ajoute-t-il, que le sang peut recevoir dans les poumons quelque autre influence importante de l'air qui

(1) *Ibid.* p. 87.

(2) *Ibid.*

y est introduit en si grande abondance. Mais dans d'autres endroits, il rejette la doctrine de l'*esprit vivifiant* de l'air. C'a été, dit-il, pendant long-tems l'objet de bien des recherches, de trouver quel peut être l'usage de ce fluide dans la respiration ; & quoiqu'il puisse être connu quelques égards , il faut avouer qu'il a encore bien des ténèbres sur ce sujet (1).

« La suffocation, dit-il, (2) consiste
 » principalement dans l'applatiffement
 » des poumons occasionné par la grosseur des particules d'un air épais &
 » chargé de vapeurs qui contiennent
 » des parties sulphureuses , salines ,
 » non élastiques , & douées d'une attraction qui les oblige à s'approcher
 » & se joindre , comme l'on a vu dans
 » les expériences précédentes que se joignent les particules élastiques de
 » l'air aux particules du soufre ; mais
 » ces atômes ne sont pas plutôt rassemblés , qu'ils forment des corps trop

(1) *Ibid.* p. 88.

(2) Statique des végétaux, traduction de M. de Buffon, p. 230.

» grossiers pour pouvoir entrer dans
» les petites vésicules du poumon déjà
» contractées par les pointes acides &
» salines de ces particules , & affaissées
» par la perte de l'élasticité de l'air
» qu'elles contenoient ; & c'est sans
» doute pour les empêcher d'entrer
» dans ces vésicules , que la nature a
» eu soin de les travailler avec tant
» d'art & de leur donner une si grande
» petitesse ».

Enfin l'effet de la respiration est, selon cet Auteur, de diminuer & de détruire en partie l'élasticité de l'air ; mais les vapeurs sulphureuses produisent cet effet. Or, comme il pouvoit respirer pendant plus long-tems l'air qui avoit passé à travers des linges trempés dans une dissolution de sel de tartre, il concluoit que l'air avoit été corrigé parce que le sel de tartre avoit fortement absorbé les vapeurs aqueuses, acides & sulphureuses (1).

Haller, après avoir rendu compte des opinions de tous ceux qui l'ont pré-

(1) *Ibid.* p. 227.

cédé, suppose, avec le Docteur Hales, que comme l'air perd son ressort dans les poumons, ils ne peuvent rester dilatés, & qu'il faut par conséquent qu'ils s'affaissent, & que la circulation du sang éprouve des obstacles (1). Lorsqu'il établit plus en détail son opinion sur l'usage des poumons, il dit que leur véritable usage est d'*absorber* & d'*exhaler* (2). Qu'ils absorbent l'eau & l'air ; mais que dans les poumons, l'air perd sa propriété élastique, en sorte qu'il devient soluble dans l'eau ou dans les vapeurs (3). Et il pense qu'il est très-probable que cet air sert de ciment pour lier ensemble les élémens terreux. Il ne doute point aussi que les poumons n'absorbent diverses autres matieres miscibles avec l'eau ; il ne prétend même pas décider si l'air n'introduit pas en nous quelque vertu électrique. La principale exhalaison des poumons est, à son avis, de l'eau chargée de principes huileux, volatils &

(1) *Haller, T. III. p. 258.*

(2) *Ibid. p. 351.*

(3) *Ibid. p. 352.*

salins ; & ces vapeurs huileuses & fétides sont les *fuligines* de Galien & des autres anciens (1).

M. Cigna de Turin a donné beaucoup d'attention à cette matière intéressante , à ce qu'il paroît par deux mémoires de lui ; l'un inséré dans le premier volume des *Miscellanea Taurinensia* , où il explique très-bien la couleur rouge vermeille du sang ; l'autre intitulé de *Respiratione* est beaucoup plus travaillé , & l'Auteur a bien voulu me le communiquer avant la publication du cinquième volume du même ouvrage dans lequel il se trouve.

Il regarde comme accordé que l'air qui a été une fois respiré n'est plus propre à l'être de nouveau , parce qu'il est chargé de *vapeurs nuisibles* , qui se manifestent par une odeur fétide (2). Il suppose aussi que la respiration diminue l'élasticité de l'air ; mais ce n'est pas à cette cause qu'il en attribue la qualité nuisible. Il conclut que l'air , qui a été respiré , suffoque par

(1) *Ibid.* p. 354.

(2) *Misc. Taurin.* T. V. p. 126.

le moyen de l'irritation qu'il occasionne dans les poumons, & par laquelle les bronches & les poumons mêmes se contractent de maniere à résister à l'entrée de l'air ; & que par conséquent l'air respiré est nuisible de la même maniere que les vapeurs méphitiques ou celles du soufre enflammé (1). Que le même air fréquemment respiré devient si chargé de ces vapeurs qu'il excite une convulsion dans les poumons : ce qui les rend incapables de transmettre le sang (2).

Ce Physicien suppose que l'air entre dans les pores du sang, & y conserve son élasticité (3), & qu'il y demeure en repos, parce que l'effort continuel qu'il fait pour s'échapper est contrebalancé par la pression égale du *medium* dont il est environné (4). Il croit que cet air est introduit dans le sang par le moyen du chyle, & jamais par la voie des poumons ; si ce n'est lorsque par

(1) *Ibid.* p. 31.

(2) *Ibid.* p. 138.

(3) *Ibid.* p. 145.

(4) *Ibid.* p. 146.

une cause quelconque, l'équilibre entre l'air du sang & l'air extérieur est rompu (1). Si l'air extérieur est plus rare que l'air intérieur, celui-ci entrant en expansion enflera les animaux, & produira les mêmes symptômes que l'air introduit dans les veines (2).

Ce que nous devons principalement à M. Cigna, ce sont ses expériences décisives relativement à la couleur vermeille du sang ; il prouve clairement qu'elle provient du contact de l'air ; quoiqu'il paroisse vouloir ensuite abandonner cette hypothèse. Le sang examiné dans un verre paroît rouge à sa surface, & noir à sa partie inférieure ; on s'est long-tems imaginé que cette différence provenoit de ce que les particules noires étant plus pesantes que les autres doivent se déposer au fond du vase ; mais M. Cigna réfute clairement cette opinion. Il a trouvé que lorsqu'il mettoit un peu d'huile sur une quantité de sang, ce sang restoit noir dans toute son étendue ; mais que lorsqu'il enlevoit

(1) *Ibid.* p. 153.

(2) *Ibid.* p. 155.

la partie rouge, & qu'il exposoit à à l'air les *couches inférieures* qui étoient noires, elles devenoient rouges de même que la première, & ainsi successivement jusqu'à ce que la masse entière eût acquis cette couleur (1). Le R. P. Beccaria éprouva aussi, à la priere de M. Cigna, de mettre du sang dans le *vuide*, & il trouva que le sang y demeurait toujours noir; mais qu'il devenoit rouge lorsqu'on l'exposoit de nouveau à l'air (2).

M. Cigna termine sa première dissertation en observant qu'il n'est pas facile de décider comment la partie inférieure d'une masse de sang devient noire. Si c'est parce qu'il laisse échapper l'air qu'il avoit absorbé, ou parce qu'il dépose quelque principe salin qui lui étoit nécessaire pour conserver sa rougeur; ou si cette noirceur est produite par la pression de l'atmosphère. Il semble porté à croire que l'air mêlé avec le sang, & interposé parmi ses globules, lui conserve sa rougeur; mais

(1) *Misc. Taurin. T. I. p. 73.*

(2) *Ibid. p. 68.*

que lorsque le sang se coagule, cet air est obligé d'en sortir; ou s'il y reste, il devient tellement fixé qu'il ne peut plus opérer la rougeur. Ce qui rend cette opinion probable jusqu'à certain point, c'est, à son avis, l'augmentation de densité qu'acquiert le sang en se coagulant, & le dégagement d'air qu'on observe lorsque d'autres fluides passent dans l'état concret (1).

Nonobstant ce qu'avoit avancé M. Cigna dans son premier Mémoire, il doute dans le second, publié plusieurs années après, si le changement de couleur du sang a lieu dans les poumons; mais en accordant que le fait soit vrai, il est porté à l'attribuer à l'évaporation qu'éprouve le sang dans ce viscere. Et quoiqu'il ait trouvé que le contact de l'air change la couleur du sang, cependant faisant attention que les conditions qui favorisent ce contact doivent aussi favoriser, à ce qu'il croit, cette évaporation, il soupçonne que ces deux causes peuvent également concourir à

(1) *Ibid.* p. 74.

cet effet. Mais il reconnoît que cette hypothèse ne peut être reçue que lorsqu'elle sera confirmée par des expériences (1).

Après tout, il conclut que le principal usage de l'air dans le *sang* est de maintenir l'équilibre avec l'air extérieur, afin que les vaisseaux ne soient pas comprimés par le poids de l'atmosphère; que les fluides puissent se mouvoir dans leurs vaisseaux aussi librement que dans le vuide; & que les membranes & les viscères glissent l'un sur l'autre avec facilité (2).

Quant à l'usage des poumons, comme il pense que l'air ne s'introduit pas dans le sang par cette voie, il croit que puisqu'il n'y a que les animaux à sang chaud qui soient pourvus de poumons semblables à ceux de l'homme, le principal usage de la respiration est l'exhalation, & le rafraîchissement qui en est la conséquence (3).

Le dernier écrivain que je citerai sur

(1) *Misc. Taurin.* T. V. p. 157.

(2) *Ibid.* p. 158, 159.

(3) *Ibid.* p. 161.

ce sujet, est feu M. Hewson qui dit, dans ses *recherches expérimentales sur les propriétés du sang* (p. 9.): « Comme
» l'air change la couleur du sang hors
» du corps, on présume qu'il opere le
» même changement dans le corps par
» la voie des poumons ». Il est persuadé que ce changement se fait réellement dans les poumons, parce qu'il a vu dans ses expériences, que le sang est d'un rouge plus vermeil dans l'oreillette gauche du cœur que dans la droite. Mais comment cet effet est-il produit ? « C'est, dit-il, ce qui n'est pas encore déterminé ».

« Comme quelques-uns des sels
» neutres & sur-tout le nitre, changent la couleur du sang, il y a, dit-il,
» des personnes qui attribuent cette
» différence au nitre que le sang absorbe de l'air pendant qu'il est dans
» les poumons ; mais ce n'est », ajoute-t-il, « qu'une pure hypothèse, car
» l'air ne contient point de nitre, & la
» plupart des autres sels neutres produisent le même effet jusqu'à un
» certain point ».

Mais cependant, puisqu'une disso-

lution de nitre agit ainsi sur le sang, & de très-noir le rend du plus beau rouge, quoique cette propriété ne soit pas particulière au nitre (une dissolution de sel commun fait à-peu-près la même chose), j'avoue que je suis porté à attribuer cet effet à l'air. Sur-tout ayant prouvé, ainsi que je puis m'en flatter, que l'air atmosphérique est composé de terre & d'esprit de nitre. Il n'est donc pas impossible que l'air que nous respirons soit assez décomposé dans son passage à travers les poulmons, pour communiquer quelque chose de nitreux au sang.

Après avoir exposé les observations & les opinions des autres sur cette importante question, je vais rapporter la mienne. Il peut paroître extraordinaire que parmi tant d'opinions diverses sur l'usage de la respiration, la véritable n'ait pas même été avancée comme une simple conjecture. Mais à la vérité, cette fonction animale, & les procédés phlogistiques de la chymie, sur-tout celui de la calcination des métaux qui peut-être est le plus simple, sont en apparence des choses

très-différentes ; & par conséquent , il y a moins lieu d'être surpris que personne n'ait imaginé qu'elles puissent produire le même effet sur l'air dans lequel elles s'exécutent.

On ne peut cependant pas douter que la respiration ne soit un procédé phlogistique , lorsqu'on trouve que l'air qui a servi à cet usage est réduit précisément au même état que l'air qui a été exposé à tout autre procédé phlogistique. Or , puisque toute la masse du sang passe à travers les poumons , puisque suivant les observations de M. Hewson & des autres , c'est-là que se fait le changement remarquable dans la couleur du sang veineux & artériel , on ne peut douter que ce ne soit par le moyen du *sang* que l'air devient phlogistiqué en passant par les poumons ; & que par conséquent un des principaux usages du sang doit être d'absorber , dans le cours de sa circulation , le phlogistique dont le système animal abonde , & de s'en débarrasser en le communiquant à l'air , avec lequel il se trouve presque en contact immédiat dans les

poumons, & qui est le grand menstue destiné à cet usage.

Quoique je n'eusse aucun doute sur cette conclusion après mes premières expériences, j'ai pensé qu'un problème aussi important méritoit d'être éclairci autant qu'il est possible; c'est pourquoi j'ai voulu éprouver si la nature du sang est telle, que, lorsqu'il est coagulé; & hors du corps, il ait le même pouvoir d'affecter l'air, que lorsqu'il est fluide, & dans le corps : l'événement a pleinement répondu à mon attente.

J'ai pris le sang d'un mouton; je l'ai laissé coaguler, la partie séreuse s'en est séparée. On fait qu'après cela la surface du *coagulum*, qui est exposée à l'air commun, prend une couleur rouge vermeille, pendant que l'intérieur est d'un rouge beaucoup plus foncé tirant sur le noir. J'ai introduit des morceaux de ce *coagulum* contenus dans de la gaze claire ou dans un réseau de fil d'archal, tantôt à travers l'eau, tantôt à travers le mercure, dans différentes especes d'air; & j'ai toujours trouvé que les parties les plus noires

prennent une couleur rouge vermeille dans l'air commun, & sur-tout dans l'air déphlogistiqué, qui est plus pur & plus propre à la respiration, & dans lequel aussi le sang a toujours pris une couleur plus vermeille, & a éprouvé ce changement plutôt que dans l'air commun ; au lieu que le sang le plus vermeil est sur le champ devenu noir dans toutes les especes d'air qui ne sont pas propres à la respiration, comme l'air fixe, l'air inflammable, l'air nitreux, & l'air phlogistiqué. Et après être devenu noir dans ce dernier air, il a repris sa couleur rouge lorsque je l'ai exposé de nouveau à l'air commun ou à l'air déphlogistiqué : le même sang devenant alternativement noir & rouge en passant de l'air phlogistiqué dans l'air déphlogistiqué, & ainsi de suite *vice versa*.

Dans ces expériences, le sang doit avoir communiqué son phlogistique à l'air commun, & à l'air déphlogistiqué ; en avoir ensuite absorbé, & s'en être saturé lorsqu'il a été exposé à l'air phlogistiqué, à l'air nitreux, à l'air inflammable, ou à l'air fixe. La seule diffi-

culté est à l'égard de ce dernier ; car tous les autres contiennent certainement du phlogistique. Mais comme je l'ai remarqué en rapportant mes expériences sur l'air acide vitriolique, le phlogistique semble nécessaire à la constitution de toutes les especes d'air. Et d'ailleurs la noirceur du sang peut avoir d'autres causes que l'application du phlogistique. Gaber, par exemple, observe que le sang devient noir lorsqu'il commence à se putréfier, de même que lorsqu'il est séché & durci au feu. Le Pere Beccaria a aussi trouvé, ainsi que je l'ai observé, que le sang rouge est resté noir, (il n'a pas pu manquer d'observer aussi qu'il l'est devenu) dans le vuide, où il ne peut avoir absorbé de phlogistique. J'ai observé que la même chose arrive lorsque le sang est couvert de deux à trois pouces de *serum* ; mais il reprend sa couleur vermeille lorsqu'il est exposé à l'air libre.

Cependant en général, on ne peut pas s'attendre que lorsque le sang est devenu noir sans avoir reçu de phlogistique *ab extrâ*, il recouvre sa cou-

leur vermeille en étant exposé à l'air. Car la délicatesse de son tissu, & conséquemment sa disposition à être facilement affecté par le phlogistique, peuvent être essentiellement altérées par des causes de noirceur, ayant leur siège dans l'intérieur même de ce sang. Et cela arrive même lorsque le sang est devenu noir pour avoir été exposé à l'air nitreux ou à l'air inflammable, quoiqu'il soit probable que dans ce cas, il doit sa noirceur au phlogistique qu'il absorbe.

J'exposai des portions d'une même masse de sang rouge dans ces deux especes d'air, & en même-tems dans l'air fixe. Toutes devinrent noires : celle qui étoit dans l'air inflammable fut moins noircie que les autres ; mais aucune ne reprit sa couleur vermeille à l'air libre. Une autre fois, une portion de *coagulum* qui étoit devenue noire dans l'air fixe recouvra jusqu'à un certain point, & très-lentement, sa couleur vermeille dans l'air déphlogistiqué. Peut-être les autres portions qui avoient perdu leur couleur dans l'air nitreux, & dans l'air inflammable, auroient-elle pu la recou-

vrer par le moyen de ce menstree plus puissant que l'air commun.

Quoi qu'il en soit, puisque le sang après s'être noirci dans l'air phlogistique, est toujours capable de reprendre sa rougeur lorsqu'il est de nouveau exposé à l'air pur, on peut conclure que cette noirceur qui s'est évanouie dans l'air pur, & qui a produit, en dépravant cet air, l'effet constant du phlogistique, étoit due au phlogistique que le sang avoit absorbé dans le premier cas, & dont il s'est défait dans le second. Et c'est ce qui arrive d'une manière remarquable, lorsqu'on fait passer le sang, de l'air phlogistique dans l'air déphlogistique. La seule circonstance de *l'obscurcissement de la couleur* suffit à un chimiste, pour lui faire soupçonner que ce sang contient plus de phlogistique qu'un autre sang d'une couleur plus légère.

Lorsque j'eus observé avec quelle facilité le sang change de couleur, suivant la qualité de l'air auquel on l'expose, je voulus examiner l'état de cet air, afin de connoître l'altération qu'il avoit soufferte; comme l'air déphlogistique est

plus sensiblement affecté que l'air commun , ce fut à cet air que je m'attachai d'abord. Je mis donc une portion de *coagulum* à-peu-près grosse comme une noix dans environ cinq mesures de cet air.

Je continuai ce procédé pendant vingt-quatre heures , & je changeai le sang environ dix ou douze fois. Au bout de ce temps je trouvai l'air tellement vicié , qu'une partie de cet air , qui mêlée avec deux parties d'air nitreux n'occupoit au commencement du procédé que l'espace d'une demie partie , en occupoit alors le triple , lorsque j'en faisois l'épreuve avec la même quantité d'air nitreux. Or , puisque l'air est universellement dépravé par le phlogistique , & ne l'est même dans ce sens que par ce principe , il est évident que ce sang noir doit avoir communiqué le phlogistique à l'air ; & conséquemment son changement de noir en rouge vermeil doit avoir été occasionné par le dégagement du phlogistique.

Le lendemain , le sang étant nécessairement plus approchant de l'état de putréfaction , dans lequel toutes les sub-

stances sans exception dépravent l'air respirable, je mis une quantité de ce sang rouge, couvert en quelques endroits de taches noires dont je ne pouvois le nettoyer facilement, dans environ la même quantité du même air déphlogistiqué, & je l'y laissai sans la changer pendant le même espace de tems; après quoi cet air se trouva si peu vicié, que mêlé avec l'air nitreux dans la proportion dont j'ai parlé, il n'occupa que l'espace de deux tiers de partie.

Pour m'assurer si le sang a la faculté de s'emparer du phlogistique de l'air, comme il a celle de lui en communiquer, j'exposai du sang d'une très-belle couleur rouge vermeille à l'air nitreux, à l'air inflammable, & à l'air phlogistiqué. Les deux premiers furent considérablement diminués par ce procédé, que je continuai deux jours, pendant lesquels je changeai le sang cinq ou six fois.

Par ce moyen, l'air nitreux perdit beaucoup de sa faculté de diminuer, c'est-à-dire, de phlogistiquer l'air commun. Car alors deux parties d'air nitreux, & une de cet air, au lieu de
n'occuper

n'occuper que l'espace d'une partie & trois quarts , occuperent celui de deux & un quart. L'air inflammable , quoique toujours inflammable , devint salubre à un certain point dans ce procédé ; car il fut après cela considérablement diminué par l'air nitreux. C'est l'état auquel il est amené par l'agitation dans l'eau , avant que la continuation de cette opération l'ait dépouillé de son inflammabilité. Il est donc hors de doute que dans ces deux cas , le sang rouge en devenant noir a reçu du phlogistique de ces deux especes d'air.

A l'égard de l'air phlogistique , j'observai seulement que lorsqu'il eut été exposé pendant quelques heures à l'action du sang rouge , il fut diminué sensiblement , mais non pas beaucoup , par l'air nitreux , qui auparavant n'auroit pu le diminuer le moins du monde. Ce sang étoit cependant encore d'un rouge très-clair ; c'est-à-dire , suivant mon hypothèse , aussi exempt de phlogistique qu'aucun sang que j'eusse jamais vu. J'ai fait , sans succès , la même épreuve avec du sang moins vermeil , quoiqu'il le fût autant qu'il peut le

devenir dans *l'air commun*. Mais il faut considérer que la fonction propre du sang n'est pas de recevoir le phlogistique de *l'air*, ni de rencontrer de l'air phlogistiqué dans le cours de la circulation; mais de communiquer du phlogistique à l'air. Il ne faut donc nullement s'attendre que l'air soit corrigé par du sang rouge, comme il est vicié par du sang noir.

On peut objecter à mon hypothèse sur l'usage du sang, qu'il ne se trouve jamais en contact actuel avec l'air dans les poumons, & qu'il en est séparé; quoiqu'il n'en soit, selon le Docteur Hales, qu'à la distance d'un millieme de pouce. D'ailleurs, les globules rouges nagent dans une grande quantité de *serum*, & ce fluide est d'une nature toute différente des globules.

Pour déterminer l'effet de ces circonstances, je pris une grande quantité de sang noir, je le mis dans une vessie humectée avec un peu de *serum*, & l'ayant bien exactement fermée par une ligature, je la suspendis à l'air libre, où je la laissai sans mouvement. Je l'examinai le lendemain, & je trouvai

que toute la surface inférieure du sang qui avoit été séparée de l'air commun par l'interposition de la vessie (cette membrane animale est tout au moins aussi épaisse que celle qui constitue les vésicules des poumons), & d'un peu de *serum* , avoit acquis une couverture d'un rouge vermeil , qui , à ce que je crois , étoit aussi épaisse que celle qu'il auroit prise s'il eût été immédiatement exposé à l'air libre. Ensorte que cette membrane n'avoit point empêché l'action de l'air sur le sang. Dans cette occasion , on observe évidemment que le changement de couleur n'a pu provenir de l'évaporation comme le conjecture M. Cigna. J'ai répété cette expérience sans humecter d'avance la vessie , & j'ai obtenu précisément le même résultat.

J'ai observé aussi que lorsque j'ai emporté une partie du *coagulum* , & que j'ai laissé le reste dans le vaisseau avec le *serum* , non-seulement la surface de cette partie qui étoit exposée à l'air , mais encore celle de la partie qui étoit entourée de *serum* , & qui même en étoit couverte à la hauteur de quelques pouces , prenoit la couleur vermeille.

Enforte que cette couche épaisse de *serum*, qui devoit empêcher efficacement toute évaporation, n'étoit pas plus un obstacle que la vessie même, à l'action mutuelle du sang & de l'air. Le *serum* du sang paroît donc être aussi merveilleusement adapté pour remplir son office de véhicule des globules rouges, que les globules rouges le sont eux-mêmes à l'usage auquel ils sont destinés : car la plus légère couche d'eau ou de *salive*, empêche efficacement le sang d'acquérir sa couleur vermeille. M. Cigna a trouvé que l'huile produit le même effet.

L'expérience suivante prouve clairement que c'est réellement l'air agissant à travers le *serum*, & non pas le *serum* même, qui donne la couleur vermeille au sang. Je pris deux portions égales de sang noir, & je les mis dans deux vases pareils, contenant d'égales quantités de *serum*, qui couvrit le sang à la hauteur d'un demi-pouce. Je laissai un de ces vases à l'air libre, & je plaçai l'autre sous un récipient, dans lequel je fis le vuide. Le premier acquit bientôt une couleur vermeille, tandis que

l'autre au bout de douze heures étoit aussi noir qu'au commencement ; je le retirai du récipient , & je le laissai toute la nuit à l'air libre , sans qu'il devînt rouge. Il resta noir ensuite , même après que j'en eus séparé le *serum*.

Je m'assurai aussi plus complètement de l'influence de l'air sur le sang à travers une quantité de *serum* , par une expérience contraire à la première. Je trouvai que le sang rouge devenoit noir à travers une épaisseur de deux pouces de *serum* , lorsque je l'exposois à l'air phlogistique : en sorte que les globules rouges du sang acquierent & perdent le phlogistique par le moyen de l'air , nonobstant l'interposition d'une grande quantité du liquide dans lequel ils flottent naturellement.

Le *serum* excepté , de toutes les liqueur animales que j'ai éprouvées , le lait est la seule à travers laquelle l'air puisse agir sur le sang. Du sang noir , plongé dans du lait , devint rouge de la même manière que s'il eût été couvert de *serum*. A la vérité , si l'on plonge du sang noir dans l'urine , il devient rouge à l'instant ; mais cet effet n'est point

produit par l'action de l'air à travers l'urine ; il faut l'attribuer à la nature saline de ce fluide.

Il faut avoir soin de distinguer la couleur vermeille que prennent , dans certains cas , quelques portions détachées d'une quantité de sang , de celle qui en pénètre la masse solide. Dans la salive , par exemple , ou dans l'eau imprégnée de sel alkali , fixe ou volatil , ou dans l'esprit de vin , les angles & les bords des morceaux de *coagulum* qu'on emploie , & les petites particules détachées , qui flottent dans ces liqueurs , paroîtront d'un rouge très-vermeil , tandis que la masse compacte du sang reste noire. La couleur vermeille des parties saillantes & détachées , paroît dans ce cas le pur effet de la grande division des parties du *coagulum* dans le fluide où ces particules sont flottantes ; ce qui n'arrive pas aux parties qui restent compactes ; l'air , dans ce cas , n'a pas le moindre pouvoir d'agir sur le sang à travers la liqueur.

Je m'étois imaginé que puisque le sang noir contient plus de phlogistique que le sang rouge , cette différence se

feroit sentir dans *l'air* que produiroient ces deux sortes de sang , soit par leur simple dissolution dans l'esprit du nitre , soit lorsque je les aurois desséchés , & ensuite pétris avec cet acide ; mais la différence étoit trop petite pour être sensible par cette épreuve : cependant , je me procurai , pour cet effet , du sang tiré de la veine d'un mouton ; & j'en pris aussi de celui qui vint le premier , lorsque le Boucher coupa , comme à l'ordinaire , l'artere *carotide* du mouton. Mais quoique je fisse dissoudre la partie noire du premier , & la partie rouge du second , dans d'égales quantités du même esprit de nitre , je ne trouvai aucune différence entre les airs qu'elles me donnerent.

Les airs que je tirai de ces sangs desséchés & pétris avec l'esprit de nitre , ne présentoient non plus aucune différence entr'eux. La quantité d'air que me donna ce procédé fut très-grande , & la production fut très-irrégulière , de même qu'elle l'avoit été lorsque je tirai de l'air d'une dissolution de sang dans l'esprit de nitre sans dessiccation (voyez ci-dessus pag. 192). La moitié de ce

produit fut de l'air fixe , & le reste étoit phlogistique , avec cette seule différence , qu'une chandelle brûloit dans cet air avec une flamme bleue qui sembloit lécher la fienne. Il est cependant évident par cette expérience , que le sang même le plus vermeil contient une quantité considérable de phlogistique ; car sans cela cet air auroit été de l'air déphlogistique.

Jé terminerai ce Mémoire , en observant que j'ai trouvé une très-grande différence dans la constitution du sang , relativement à sa propriété d'être affecté par l'influence de l'air ; il en est qui devient bientôt d'une couleur claire & vermeille , & la *couche* de cette couleur devient bientôt fort épaisse. Au lieu que dans d'autres occasions , la couleur du sang dans les circonstances les plus favorables est restée beaucoup plus foncée , & la couleur plus claire n'a jamais pu pénétrer bien profondément.

Comme le principal usage du sang semble consister dans sa faculté de recevoir le phlogistique , & de s'en débarrasser , & que l'on peut aisément déterminer à la vue le degré auquel il pos-

fede cette faculté , cette circonstance n'est peut-être pas indigne de l'attention particuliere des Médecins. Pour juger de la bonté du sang par le moyen de cette épreuve , il ne faut qu'observer *l'éclaircissement* de la couleur , & l'épaisseur de la couche *éclaircie* , après qu'il a été exposé à l'air pendant un tems déterminé. Dans les cas où le sang seroit plus noir qu'à l'ordinaire , il semble qu'il seroit avantageux de prescrire l'usage d'un air plus pur.

En général , le sang que j'ai eu le moyen de me procurer dans la ville , n'étoit pas aussi bon que celui que j'ai tiré de la campagne ; ce qui vient peut-être de ce que le bétail a été échauffé & excédé de fatigue , avant d'être tué dans la ville.

F I N du Tome II.











